

## HERPETOLOGISCHE NOTIZEN. <sup>1)</sup>

Von

Dr. F. KOPSTEIN,

(Bandoeng, Java).

### III. Reptilien des östlichen Preanger (West-Java).

Zur Förderung der Kenntnis der vertikalen und horizontalen Verbreitung der Reptilien auf Java seien hier die Fundorte jener Reptilien mitgeteilt, die ich in den Jahren 1925/1929 in der weiteren Umgebung von Tasikmalaja und Garoet, den beiden Hauptorten der Residenz Ost-Preanger sammelte resp. beobachtete. Ost-Preanger (auf den holländischen Karten Oost-Priangan) liegt im äussersten Osten der Provinz West-Java, deren Süd-Ost-Ecke sie darstellt, wobei der Tjiantandoeij Fluss die Grenze gegenüber der Provinz Mittel-Java bildet. Als Fundorte werden bloss Namen angeführt, die in den meisten Karten im Masstabe von 1 : 250.000 aufgenommen sind. In jenen wenigen Fällen, wo es nötig schien, auch andere Namen zu nennen, wird in Klammern auf den am nächsten gelegenen Ort verwiesen, der wohl in den Übersichtskarten 1 : 250.000 zu finden ist (wobei noch bemerkt werden muss, dass oe der holländischen Schreibweise = u). In der Nomenklatur folge ich aus Utilitätsgründen bis zum Erscheinen meiner Revision dem Kataloge DE ROOY's "Reptiles of the Indo-Australian Archipelago".

#### OPHIDIA.

|   |   |
|---|---|
| <i>Typhlops lineatus</i> BOIE.                        | Tasikmalaja, 350 m;   |
| <i>Typhlops braminus</i> DAUD.                        | Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;  |
| <i>Python reticulatus</i> SCHNEIDER.                  | Tasikmalaja, 350 m; Rantjah, 450 m;   |
| <i>Python molurus</i> L. ( <i>bivittatus</i> WERNER). | Tasikmalaja, 350 m; Pameungpeuk, 10 m;  |
| <i>Dendrophis pictus</i> GMEL.                        | Tasikmalaja, 350 m; Tjibeber, 150 m;<br>Rantjah, 450 m; Kalipoetjang, 20 m;<br>Pangandaran, 2 m; Maroko, 50 m;<br>Tjisompet, 450 m; |
| <i>Dendrophis formosus</i> BOIE.                      | Tjikatomas, 250 m; Tjipatoedjah, 10 m;<br>Rantjah, 450 m;   |
| <i>Zaocis carinatus</i> GTHR.                         | Tjisompet, 450 m;   |
| <i>Tropidonotus piscator</i> SCHNEIDER.               | Tasikmalaja, 350 m; Tjiawi, 500 m;<br>Garoet, 700 m; Rantjah, 450 m;  |

<sup>1)</sup> Cfr. Treubia Vol. X, p. 467; Vol. XI, p. 301.

|  |  |
|--|--|
| <i>Tropidonotus trianguligerus</i> BOIE.   | Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;   |
| <i>Tropidonotus chrysargoides</i> GTHR.    | Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;   |
| <i>Tropidonotus vittatus</i> L.            | Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;<br>Rantjah, 450 m; Singaparna, 400 m;   |
| <i>Tropidonotus subminiatus</i> SCHLEGEL.  | Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;<br>Rantjah, 450 m; Kalipoetjang, 20 m;  |
| <i>Tropidonotus chrysargus</i> SCHLEGEL.   | Garoet, 700 m;   |
| <i>Zamenis korros</i> SCHLEGEL.            | Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;<br>Tjikatomas, 250 m; Tjiawi, 500 m;<br>Kalipoetjang, 20 m; Rantjah, 450 m;<br>Singaparna, 400 m; Tjidjoelang, 5 m; |
| <i>Coluber melanurus</i> SCHLEGEL.         | Tasikmalaja, 350 m; Rantjah, 450 m;<br>Garoet, 700 m; Kalipoetjang, 20 m;  |
| <i>Coluber radiatus</i> SCHLEGEL.          | Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;<br>Rantjah, 450 m; Singaparna, 400 m;   |
| <i>Coluber oxycephalus</i> BOIE.           | Kalipoetjang, 20 m; Rantjah, 450 m;<br>Tasikmalaja, 350 m;   |
| <i>Lycodon subcinctus</i> BOIE.            | Kawali, 450 m; Deudeul, 400 m; Tjiawi, 500 m; Garoet, 700 m; Sembawa, (Deudeul), 800 m; Kalipoetjang, 20 m;  |
| <i>Simotes purpurescens</i> SCHLEGEL.      | Karangnoengal, 250 m;  |
| <i>Oligodon bitorquatus</i> BOIE.          | Dajeuhmangoeng, (Garoet), 1000 m;  |
| <i>Elapoides fuscus</i> BOIE.              | Dajeuhmangoeng, (Garoet), 1000 m;  |
| <i>Ablabes baliodirus</i> BOIE.            | Dajeuhmangoeng, (Garoet), 1000 m;  |
| <i>Calamaria vermiformis</i> D.B.          | Dajeuhmangoeng, (Garoet), 1000 m;  |
| <i>Calamaria lumbricoidea</i> BOIE.        | Dajeuhmangoeng, (Garoet), 1000 m;  |
| <i>Calamaria virgulata</i> BOIE.           | Dajeuhmangoeng, (Garoet), 1000 m;  |
| <i>Calamaria linnaei</i> BOIE.             | Dajeuhmangoeng, (Garoet), 1000 m; Tji-soeroepan, 1300 m;   |
| <i>Hypsirhina enhydris</i> SCHNEIDER.      | Kalipoetjang, 20 m; Padaherang, 10 m;  |
| <i>Homalopsis buccata</i> L.               | Kalipoetjang, 20 m;  |
| <i>Dipsadomorphus multimaculatus</i> BOIE. | Tjikatomas, 250 m; Pameungpeuk, 10 m;  |
| <i>Dipsadomorphus dendrophilus</i> BOIE.   | Rantjah, 450 m; Parigi, 10 m; Tjisompet, 450 m; Kalipoetjang, 20 m;  |
| <i>Dipsadomorphus nigriceps</i> GTHR.      | Tjikatomas, 250 m; Tjikalong, 20 m;  |
| <i>Dipsadomorphus jaspideus</i> D.B.       | Soekaradja, 250 m;   |
| <i>Psammodynastes pulverulentus</i> BOIE.  | Garoet, 700 m; Bantarkalong, 200 m; Papandajan, 1400 m;  |
| <i>Dryophis prasinus</i> BOIE.             | Parigi, 10 m; Rantjah, 450 m; Kalipoetjang, 20 m;  |

- Dryophiops rubescens* GRAY. Pangandaran, 2 m;  
*Bungarus fasciatus* SCHNEIDER. Tasikmalaja, 350 m; Rantjah, 450 m;  
 Garoet, 700 m;  
*Bungarus candidus* L. Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;  
 Rantjah, 450 m;  
*Naja tripudians sputatrix*. Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;  
 Kalipoetjang, 20 m; Parigi, 10 m;  
 Tjiawi, 500 m; Bandjar, 40 m;  
*Doliophis intestinalis* Boie. Manondjaja, 300 m; Tjikatomas, 250 m;  
 Garoet, 700 m; Parigi, 10 m;  
*Amblycephalus carinatus* BOIE. Tjikatomas, 250 m; Kalipoetjang, 20 m;  
*Lachesis gramineus* SHAW. Parigi, 10 m; Rantjah, 450 m; Bandjar,  
 40 m; Tjiawi, 500 m; Singaparna,  
 400 m; Kalipoetjang, 20 m; Parigi,  
 10 m;  
*Lachesis puniceus* BOIE. Dajeuhmangoeng (Garoet), 1000 m;  
*Hydrus platurus* L. Pangandaran (Süd-Küste).
- LACERTILIA.
- Gymnodactylus marmoratus* KUHL. Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;  
*Gymnodactylus fumosus* F. MÜL. Kawah Kamodjan (Garoet), 1400 m;  
*Hemidactylus frenatus* D.B. von der Küste an überall bis 1300 m;  
 von der Küste an überall bis 1300 m;  
*Gehyra mutilata* WIEGM. Tasikmalaja, 350 m;  
*Hemiphyllodactylus typus* BLKR. Pameungpeuk (Küste).  
*Gecko verticillatus* LAUR. Tjipatoedjah, 10 m; Tasikmalaja, 350 m;  
*Gecko monarchus* Tasikmalaja, 350 m; Pendjaloe, 700 m;  
*Draco volans* L. Pangandaran (Küste);  
 Pamegatan (Garoet), 1300 m;  
*Gonyocephalus chamaeleontinus* LAUR. Kawah Kamodjan (Garoet), 1400 m;  
*Gonyocephalus kuhli* SCHLEGEL. Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;  
*Calotes jubatus* D.B. Kawah Kamodjan (Garoet), 1400 m;  
*Calotes tympanistriga* GRAY. 1 Ex. bei Tasikmalaja gekauft;  
*Varanus nebulosus* GRAY. Tasikmalaja, 350 m; Pangandaran  
 (Küste); Bandjar, 40 m; Tjibalong,  
 150 m; Pameungpeuk (Küste);  
*Varanus salvator* LAUR. Tasikmalaja, 350 m; Bandjar-Wangi  
 (Garoet), 650 m;  
 überall von 0 - 1300 m;  
*Tachydromus sexlineatus* DAUD. Kawah Kamodjan (Garoet), 1400 m;  
 Padoherang, 50 m;  
 Kawah Kamodjan (Garoet), 1400 m;  
 Garoet, 700 m;  
 Kawah Kamodjan, 1400 m;  
*Mabuia multifasciata* KUHLI.  
*Mabuia quinquecarinata* WERNER.  
*Lygosoma sanctum* D.B.  
*Lygosoma temmincki* D.B.  
*Lygosoma chalcides* L.

## CHELONIA.

*Cyclemys dhor* GRAY.Karangnoengal, 250 m; Bantarkalong,  
200 m;*Chelonia mydas* L.

Pangandaran, Pameungpeuk;

*Trionyx cartilagineus* BODD.

Tasikmalaja, 350 m; Garoet, 700 m;

## EMYDOSAURIA.

*Crocodylus porosus* SCHN.

Kalipoetjang, 10 m; Pameungpeuk, 2 m.