

Catalogue of the Neotropical
Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae).

Part III – Tribe Athysanini

Catálogo dos Deltocephalinae
(Hemiptera: Cicadellidae) neotropicais.
Parte III – Tribo Athysanini

KETI M. R. ZANOL

In the General Catalogue of the Homoptera (METCALF, 1967) are listed 64 genera and 310 species of Deltocephalinae, from the Neotropical region, arranged into 10 tribes (genera and species, respectively): Acinopterini = 3, 50; Athysanini = 21, 136; Cicadulini = 1, 1; Colladonini = 12, 49; Deltocephalini = 5, 10; Euscelini = 5, 17; Fieberiellini = 3, 3; Scaphoideini = 7, 19; Synophropsini = 2, 4; Thamnotettixini = 5, 22. There after many papers on Neotropical Deltocephalinae have been published dealing with classification, nomenclatural alterations, descriptions of new taxa and geographical distribution.

The complete bibliography on the leafhoppers until 1955 can be found in the General Catalogue of the Homoptera (METCALF, 1962–1967). OMAN *et al.* (1990) published a list of the world genera of Cicadellidae (107 Neotropical genera in Athysanini) and bibliography between 1956–1985. ZANOL (2006, 2007) published the catalogue of Deltocephalinae, Part I and Part II, respectively.

The present catalogue is an attempt to offer the names and bibliographic references for taxa of Athysanini described from Mexico to South America.

Each species group name is followed by the type locality and an abbreviation of the institution where the type is deposited.

The geographical distribution is based upon previously published records. Each species-group name is followed by the information including of the author(s), publication date, page and when the paper is not strictly taxonomical, an abbreviated indication of the matter treated such as: biol.=biology, cat.=catalogue, desc.=description, distr.=geographical distribution; ecol.=ecology, ill.=illustration, morph.=morphology, redesc.=redescription, rev.=revision, reval.=revalidation, syn.=synonymy, tax.=taxonomy.

ACRONYMS OF THE INSTITUTIONS

- AMNH — American Museum Natural History, New York, New York, USA.
- BMNH — The Natural History Museum, London, U. K.
- BYUC — Brigham Young University, Insect Collection, Department of Zoology and Entomology, Provo, Utah, USA.
- CASC — California Academy of Science, San Francisco, California, USA.
- CMNH — Carnegie Museum of Nature, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
- CUIC — Cornell University Insect Collection, Ithaca, New York, USA
- DZUP — Coleção de Entomologia Pe J.S. Moure, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brazil
- HNHM — Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary.
- HSPH — Hawaiian Sugar Planter's Association, Honolulu, Hawaii.
- IESC — Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba.
- INBio — Instituto Nacional de Biodiversidad, Santo Domingo, Herida, Costa Rica
- INHS — Illinois Natural History Survey Collection, Urbana, Illinois, USA.
- INPA — Colleção Sistemática de Entomologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM, Brazil.
- ISUI — Iowa State College Collection, Ames, USA.
- ISM — Instituto de Investigacion San Miguel.
- LACM — Natural History Museum of Los Angeles County, California, USA.
- MLPA — Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
- MPEG — Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA, Brazil.
- MRSN — Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, Italy.
- MUSM — Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru.
- MZSP — Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil.
- NHMW — Naturhistorisches Museum, Vienna, Austria.
- NNMH — Smithsonian Institution National Museum of Natural History, Washington, DC, USA. (USNM)
- NHRS — Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Sweden.
- OSUC — Ohio State University, Insect Collection, Columbus, USA.
- SMNH — Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden.
- SMNS — Staatlichen Museum für Naturkunde, Stuttgart, Germany.
- SNOW — Snow Entomology Collection, University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA.
- ZMUH — Zoologisches Institut und Zoologisches Museum, Universität Hamburg, Hamburg, Germany.
- ZSCM — Zoologische Staatssammlung des Bayerischen Staates, München, Germany (Zoological States Collection).

Tribe ATHYSANINI

Oman, 1936: 358 (in Jassinae); Evans, 1947: 226 (in Euscelini); Oman, 1949: 108 (in Deltoccephalini); Linnnavuori, 1959: 153 (in Euscelini); Metcalf, 1967: 336 (cat.); Linnnavuori & DeLong, 1978c: 204 (in Euscelini); Oman *et al.*, 1990: (cat.).

Genus *Aequcephalus* DeLong & Thambimuttu

Type species, *Aequcephalus gramineus* DeLong & Thambimuttu (original designation).
Aequcephalus DeLong & Thambimuttu, 1973: 172; Cwikla & Blocker, 1981: 170 (note);
Oman *et al.*, 1990: 186 (cat.); Zahniser & Webb, 2004: 670 (key).
gramineus DeLong & Thambimuttu.
Aequcephalus gramineus DeLong & Thambimuttu, 1973: 172. Type locality: Chile,
Santiago, Padre Hurtado (19km W) (OSUC).

Genus *Alaca* Oman

Type species, *Alaca longicauda* Oman, 1936 (original designation).
alaca Oman, 1936: 386; Evans, 1947: 228 (listed); Metcalf, 1967: 811 (in Thamnotettixini); Oman *et al.*, 1990: 180 (cat.); Kamitani, 1999: 79 (in Deltoccephalini).

longicauda Oman.

Alaca longicauda Oman, 1936: 386. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (NMNH). Distribution – Brazil, Argentina. Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).

Genus *Aligia* Ball

Type species, *Jassus jucundus* Ulher, 1877 (original designation).
Eutettix (Aligia) Ball, 1907: 53.
Aligia; Hepner, 1942: 145–185 (rev.); Evans, 1947: 228 (listed); Metcalf, 1967: 1724 (in Fieberiellini); Hamilton, 1975b: 497 (in Platymetopiina); Oman *et al.*, 1990: 188 (cat.).

alvona Kramer & DeLong

Aligia alvona Kramer & DeLong, 1968: 169–170. Type locality: Mexico, Guerrero, Taxco (OSUC).

bicolor Kramer & DeLong

Aligia bicolor Kramer & DeLong, 1968: 171. Type locality: Mexico, Distrito Federal (OSUC).

mexicana Kramer & DeLong

Aligia mexicana Kramer & DeLong, 1968: 169. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC).

Genus *Alladanus* DeLong & Harlan

Type species, *Alladanus cephalatus* DeLong & Harlan, 1968 (original designation).
Alladanus DeLong & Harlan, 1968: 147–148; Cwikla & Blocker, 1981: 170 (note);
Oman *et al.*, 1999: 188 (cat.).

cephalatus DeLong & Harlan

Alladanus cephalatus DeLong & Harlan, 1968: 148. Type locality: Mexico, Vera Cruz, Jalapa (OSUC).

mexellus DeLong & Harlan

Alladanus mexellus DeLong & Harlan, 1968: 147. Type locality: Mexico, Michoacan, Carapan (OSUC).

Genus *Ancudana* DeLong & Martinson

Type species, *Ancudana cinctus* DeLong & Martinson, 1974 (original designation).

Ancudana DeLong & Martinson, 1974b: 261; Linnavuori & DeLong, 1977b: 205 (note); Cwikla & Blocker, 1981: 170 (note); Oman et al., 1990: 190 (cat.).

cincta DeLong & Martinson

Ancudana cincta DeLong & Martinson, 1974b: 261–263. Type locality: Chile, Chiloe, Ancud (OSUC). Linnavuori & DeLong, 1977b: 205 (distr.).

Genus *Andanus* Linnavuori

Type species, *Andanus bimaculatus* Linnavuori, 1959 (original designation).

Andanus Linnavuori, 1959: 237; Oman et al., 1990: 190 (cat.); Zanol, 1993: 613, 615 (note, redesc.).

Adlaca Lozada, 1998: 114. Type species, *Adlaca dubiosa* Lozada, 1998 (original designation). Zanol, 2005: 89 (syn.).

bimaculatus Linnavuori

Andanus bimaculatus Linnavuori, 1959: 238. Type locality: Peru, Cuzco, Madre de Dios (HNHM). Distribution – Peru, Brazil. Linnavuori & Heller, 1961: 11 (distr.); Lozada, 1992: 28 (distr.); Zanol, 1993: 615 (redesc., distr.); Zanol, 2005: 90 (distr.).

Adlaca dubiosa Lozada, 1998: 116–117. Type locality: Peru, Madre de Dios, P.V. Pakitza, Reserva Del Manu (MUSM). Zanol, 2005: 89 (syn.).

Genus *Angubahita* DeLong

Type species, *Angubahita arta* DeLong, 1982 (original designation).

Angubahita DeLong, 1982a: 185; Oman et al., 1990: 190 (cat.).

Angubahita (Angubahita) DeLong

atra DeLong, 1982

Angubahita arta [sic] DeLong, 1982a: 185. Type locality: Panama, Las Cumbres (OSUC).

Angubahita atra; DeLong, 1982a: 184 (abstract); McKamey & Hicks, 2007: 934 (spelling).

Angubahita (Mairana) DeLong

Type species, *Angubahita nigrens* DeLong, 1984 (original designation).

Angubahita (Mairana) DeLong, 1984b: 117.

nigrens DeLong, 1984

Angubahita (Mairana) nigrens DeLong, 1984b: 117. Type locality: Bolivia, Santa Cruz, Mairana (OSUC).

Genus *Angulanus* DeLong

Type species, *Idiodonus incisurus* DeLong, 1946 (original designation).

Idiodonus (Angulanus) DeLong, 1946a: 30; Metcalf, 1967: 1304 (in Colladonini).

Angulanus; Nielson, 1988: 133.

incisurus DeLong

Idiodonus incisurus DeLong, 1946a: 30. Type locality: Mexico, Distrito Federal, La Guarda (OSUC).

Idiodonus (Angulanus) incisurus; Metcalf, 1967: 1304 (cat.); DeLong, 1984a: 10 (key).

Angulanus incisurus; Nielson, 1988: 133.

Genus *Antoniellus* Linnavuori

Type species, *Antoniellus irrorellus* Linnavuori, 1959 (original designation).

Antoniellus Linnavuori, 1959: 205; Oman et al., 1990: 190 (cat.).

irrorellus Linnavuori

Antoniellus irrorellus Linnauvori, 1959: 205–206. Type locality: Argentina, San Antonio (MLPA). Cheng, 1980: 64 (distr.).

Genus *Aplanatus* Cheng

Type species, *Aplanatus pallibandus* Cheng, 1980 (original designation).

Aplanatus Cheng, 1980: 87; Oman et al., 1990: 191 (cat.); Cwikla & Blocker, 1981: 170 (note).

pallibandus Cheng

Aplanatus pallibandus Cheng, 1980: 89. Type locality: Paraguay, N Cnel Bogado (SNOW). Distribution – Paraguay, Brazil.

Genus *Aricanus* Linnauvori

Type species, *Aricanus filigranus* Linnauvori, 1959 (original designation).

Aricanus Linnauvori, 1959: 206; Oman et al., 1990: 191 (cat.).

filigranus Linnauvori

Aricanus filigranus Linnauvori, 1959: 207. Type locality: Chile, Arica (AMNH).

Linnauvori & DeLong, 1977b: 204 (note, distr.).

Genus *Artucephalus* DeLong

Type species, *Artucephalus fasciatus* DeLong, 1943 (original designation).

Artucephalus DeLong, 1943b: 654; Evans, 1947: 229 (listed); Metcalf, 1967: 1740 (in Fieberiellini); Cwikla & Blocker, 1981: 170 (note); Oman et al., 1990: 191 (cat.).

fasciatus DeLong

Artucephalus fasciatus DeLong, 1943b: 654–655. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Evans, 1947: 229 (listed); Metcalf, 1967: 1741 (cat.).

Genus *Atanus* Oman

Type species, *Eutettix dentatus* Osborn, 1923 (original designation).

Atanus Oman, 1936: 381; Evans, 1947: 229 (listed); Oman, 1949: 135 (redesc.); Linnauvori, 1959: 296–297 (redesc., key); Metcalf, 1967: 1237 (in Deltcephalini); Hamilton, 1975b: 494 (in Platymetopiina); Linnauvori & DeLong, 1976: 36 (note; tax.); Linnauvori & DeLong, 1977b: 209 (= *Tubulanus*); Oman et al., 1990: 192 (cat.).

Alanus DeLong & Hersberger, 1947a: 231–232. Type species, *Alanus albidus* DeLong & Hersberger, 1947a (original designation). Linnauvori, 1959: 296 (syn.); Metcalf, 1967: 1237 (cat.); Cwikla & Blocker, 1981: 170 (note); Oman et al., 1992: 192 (cat.).

Tubulanus Linnauvori, 1955: 109. Type species, *Tubulanus nitidus* Linnauvori, 1955 (original designation). Linnauvori, 1959: 303 (note, key); Metcalf, 1967: 1241 (cat.); Linnauvori & DeLong, 1976: 36 (syn.); Oman et al., 1992: 192 (cat.).

Fulvanus Linnauvori, 1955: 110–111. Type species, *Fulvanus curvilinea* Linnauvori, 1955 (original designation). Linnauvori, 1959: 296 (syn.); Metcalf, 1967: 1241 (cat.); Oman et al., 1992: 192 (cat.).

Linnatanus Menezes, 1973: 135 (*nom. nov. pro* *Tubulanus* Linnauvori, 1955: 109 non Reinier, 1804); Cwikla & Blocker, 1981: 170 (note); Oman et al., 1992: 192 (cat.).

Nerminia Kocak, 1981: 124 (*nom. nov. pro* *Tubulanus* Linnauvori, 1955: 109 non Reinier, 1804); Oman et al., 1990: 192 (cat.).

acutus Linnauvori & Heller

Atanus acutus Linnauvori & Heller, 1961: 13. Type locality: Peru, Hacienda Mascoitania (SMNS).

albidus (DeLong & Hershberger)

- Alanus albidus* DeLong & Hershberger, 1947a: 231. Type locality: Mexico, Sinaloa, Los Mochis (OSUC). Distribution – Mexico, Costa Rica, Panama. Metcalf, 1967: 1237 (cat.).
- Atanus albidus*; Linnnavuori, 1959: 300.
- angustus* Linnnavuori
- Atanus angustus* Linnnavuori, 1959: 302. Type locality: Argentina, Tucuman (HNHM). Distribution – Brazil, Argentina.
- baianus* Zanol
- Atanus baianus* Zanol, 2000: 28. Type locality: Brazil, Bahia, Encruzilhada (DZUP).
- bicornis* Linnnavuori & DeLong
- Atanus bicornis* Linnnavuori & DeLong, 1976: 36. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49 km N. Sta Cruz (OSUC).
- bifidus* Linnnavuori
- Atanus bifidus* Linnnavuori, 1959: 300. Type locality: Panama, Tucumen (NMNH). Distribution – Panama, Brazil. Cavichioli & Zanol, 1991: 58 (distr.).
- bos* Linnnavuori & DeLong
- Atanus bos* Linnnavuori & DeLong, 1976: 36. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49km N. Sta Cruz (OSUC).
- cinchus* DeLong
- Atanus cinchus* DeLong, 1982b: 479. Type locality: Peru, Cinchona (OSUC). Lozada, 1992: 28 (distr.).
- cineratus* (Linnnavuori)
- Tubulanus cineratus* Linnnavuori, 1959: 305. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Jacare (CMNH). Distribution – Colombia, Venezuela, Brazil, Peru. Cavichioli & Zanol, 1991: 58 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).
- Linnatanus cineratus*; Menezes, 1973: 1325; Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.).
- Atanus cineratus*; Zanol, 2006b: 163.
- contrarius* Linnnavuori
- Atanus contrarius* Linnnavuori, 1959: 299. Type locality: Brazil, Rio Grande (HNHM). Distribution – Brazil, Peru. Zanol & Menezes, 1982: 37(distr.).
- coronatus* (Berg)
- Athysanus coronatus* Berg, 1879: 261. Type locality: Argentina, Buenos Aires (MLPA). Distribution — Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina, Chile. Metcalf, 1967: 59 (cat.).
- Atanus coronatus*; Linnnavuori, 1959: 297; Cheng, 1980: 65 (distr.).
- Eutettix dentatus* Osborn, 1923b: 57. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Linnnavuori, 1959: 297 (syn.).
- Atanus dentatus*; Linnnavuori, 1955:101; Metcalf, 1967: 1238 (cat.).
- Athysanus inconspicuus* Jensen-Haarup, 1922: 14. Type locality: Argentina Mendoza. (col. Jensen-Haarup). Linnnavuori, 1959: 297 (syn.)
- coxinus* Zanol
- Atanus coxinus* Zanol, 2000: 32. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Coxim (DZUP).
- cristatus* Linnnavuori & DeLong
- Atanus cristatus* Linnnavuori & DeLong, 1976: 36. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49km N. Sta Cruz (OSUC).
- curvilinea* (Linnnavuori)
- Fulvanus curvilinea* Linnnavuori, 1955: 110–111. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHW). Distribution – Brazil, Argentina. Metcalf, 1967: 1241 (cat.).
- Atanus curvilinea*; Linnnavuori, 1959: 303; Cheng, 1980: 65 (distr.); Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).

declivatus Linnavuori

Atanus declivatus Linnavuori, 1959: 300–301. Type locality: Ecuador, Loja (ZMUH).
denticulatus Zanol

Atanus denticulatus Zanol, 2000: 31. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Botucatu (DZUP).
furcifer (Linnavuori)

Tubulanus furcifer Linnavuori, 1959: 306. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto
(MLPA). Distribution – Brazil, Argentina.

Linnatanus furcifer; Menezes; 1973: 135.

Atanus furcifer; Zanol, 2006b: 163.

gracilis Cheng

Atanus gracilis Cheng, 1980: 89–90. Type locality: Paraguay, 2 km W Eusebio Ayala
(SNOW).

horridus Linnavuori & DeLong

Atanus horridus Linnavuori & DeLong, 1976: 36–37. Type locality: Bolivia, San Esteban,
49 km N. Sta Cruz (OSUC).

impictus Linnavuori & DeLong

Atanus impictus Linnavuori & DeLong, 1979a: 132–133. Type locality: Bolivia, San
Esteban (OSUC).

joaquinus (Linnavuori)

Tubulanus joaquinus Linnavuori, 1973b: 14–15. Type locality: Peru, Ica, San Joaquin
(AMNH). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Atanus joaquinus; Zanol, 2006b: 163.

lagunae (Linnavuori)

Tubulanus lagunae Linnavuori, 1959: 304. Type locality: Argentina, Formosa, Laguna
Oca (MLPA).

Linnatanus lagunae; Menezes, 1973: 135.

Atanus lagunae; Zanol, 2006b: 163.

lobatus (Osborn)

Thamnotettix lobatus Osborn, 1923b: 71–72. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara
(CMNH). Distribution – Brazil, Bolivia.

Atanus lobatus; Oman, 1936: 381; Metcalf, 1967: 1239 (cat.); Linnavuori & DeLong,
1977a: 568 (note).

loriatus Cheng

Atanus loriatus Cheng, 1980: 92. Type locality: Paraguay, 5 km E and 2 km N of San
Lorenzo on Luque road (SNOW).

luqueatus Cheng

Atanus luqueatus Cheng, 1980: 90. Type locality: Paraguay, nr Parque and International
airport (SNOW).

luqueatus equalis Cheng

Atanus luqueatus equalis Cheng, 1980: 92. Type locality: Paraguay, Fortuna ranch, nr
Pedro Juan Caballero (SNOW).

mexicanus DeLong

Atanus mexicanus DeLong, 1978: 490. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).
nitidus (Linnavuori)

Tubulanus nitidus Linnavuori, 1955: 110. Type locality: Brazil, Rio de Janeiro (NHW).
Distribution – Brazil, Argentina. Linnavuori, 1956: 9 (distr.); Metcalf, 1967:
1241 (cat.).

Linnatanus nitidus; Menezes, 1973: 135; Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.).

Atanus nitidus; Zanol, 2006b: 163.

perplexus Linnavuori & DeLong

- Atanus perplexus* Linnnavuori & DeLong, 1979a: 133–134. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Varginha (OSUC).
- picchuanus* Linnnavuori & DeLong
Atanus picchuanus Linnnavuori & DeLong, 1976: 36. Type locality: Peru, Machu Picchu (OSUC). Lozada, 1992: 28 (distr.).
- rhopalus* (Cheng)
Tubulanus rhopalus Cheng, 1980: 106. Type locality: Paraguay, nr Luque & International airport (SNOW).
- Atanus rhopalus*; Zanol, 2006b: 163.
- runguenus* Linnnavuori & DeLong
Atanus runguenus Linnnavuori & DeLong, 1977b: 209. Type locality: Chile, Santiago, 6km W. Rungue (OSUC).
- sagittifer* Linnnavuori & DeLong
Atanus sagittifer Linnnavuori & DeLong, 1979a: 134–135. Type locality: Bolivia, San Esteban (OSUC).
- serratus* Zanol
Atanus serratus Zanol, 2000: 30. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Paracatu (DZUP).
- serricauda* (Linnnavuori)
Tubulanus serricauda Linnnavuori, 1959: 306. Type locality: Argentina, Santa Fe, Silva. (MLPA). Distribution – Venezuela, Argentina.
- Linnatanus serricauda*; Menezes, 1973: 135.
- Atanus serricauda*; Zanol, 2006b: 163.
- serrulatus* Zanol
Atanus serrulatus Zanol, 2000: 29. Type locality: Brazil, Rio de Janeiro, Represa Rio Grande. (DZUP).
- tesselatus* (Osborn)
Eutettix tessellatus Osborn, 1923b: 56–57. Type locality: Brazil, Chapada (CMNH). Distribution – Trinidad and Tobago, Brazil.
- Atanus tessellatus*; Oman, 1936: 381; Metcalf, 1967: 1240 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).
- trifurcatus* (Cheng)
Tubulanus trifurcatus Cheng, 1980: 108. Type locality: Paraguay, 128.5 km W Pto Pte Stroessner, between Camp 8 y Caaguazu (SNOW).
- Atanus trifurcatus*; Zanol, 2006b: 163.
- variatus* Zanol
Atanus variatus Zanol, 2000: 32–33. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Botucatu (DZUP).
- viridis* Linnnavuori
Atanus viridis Linnnavuori, 1955: 109. Type locality: Argentina, Mendoza (NHW). Distribution – Brazil, Peru, Uruguay. Metcalf, 1967: 1241 (cat.); Ruffinelli, 1970: 17 (distr.).
- xanthopus* Linnnavuori
Atanus xanthopus Linnnavuori, 1959: 301–302. Type locality: Panama, Nueva Gorgano (NMNH). Distribution – Nicaragua, Panama. Maes *et al.*, 1999: 14 (distr.).

Genus *Bahita* Oman

- Type species, *Eutettix infuscatus* Osborn, 1923 (original designation).
- Bahita* Oman, 1936: 379; Evans, 1947: 229 (listed); Metcalf, 1967: 543 (cat.); Oman et al., 1990: 193 (cat.); Zanol, 1999: 73–145 (rev., tax.).
- Guaporea* Linnnavuori & DeLong, 1978a: 123. Type species, *Eutettix laticeps* Osborn, 1923 (original designation). Cwikla & Blocker, 1981: 174 (listed); Oman et al., 1990: 215 (cat.); Zanol, 1999: 75 (syn.).

aguasina Zanol

Bahita aguasina Zanol, 1996a: 729, 732. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Aguas Vermelhas (DZUP).

alvarengai Zanol

Bahita alvarengai Zanol, 1999: 78. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

amapana Linnauori & DeLong

Bahita amapana Linnauori & DeLong, 1978a: 126. Type locality: Brazil, Amapa, Serra do Navio (OSUC). Distribution – Guayana, Brazil. Zanol, 1999: 79 (redesc., distr.).

amoena Zanol

Bahita amoena Zanol, 1999: 79–80. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

antonina Zanol

Bahita antonina Zanol, 1996a: 729. Type locality: Brazil, Parana, Antonina (Reserva Sapitanduva) (DZUP). Zanol, 1999: 80–81 (redesc., distr.).

bicrura Zanol

Bahita bicrura Zanol, 1999: 81. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

capixaba Zanol

Bahita capixaba Zanol, 1999: 82. Type locality: Brazil, Espirito Santo, Linhares (DZUP).

caracana Linnauori & DeLong

Bahita caracana Linnauori & DeLong, 1978a: 126. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Serra do Caraça (OSUC). Zanol, 1999: 83 (redesc., distr.).

curtula Linnauori & DeLong

Bahita curtula Linnauori & DeLong, 1978a: 126. Type locality: Brazil, Para, Santarem (OSUC). Zanol, 1999: 83–84 (redesc., distr.).

denticulata Zanol

Bahita denticulata Zanol, 1999: 84. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

femorata (Osborn)

Eutettix femoratus Osborn, 1923b: 53. Type locality: Bolivia, Las Juntas (CMNH).

Bahita femorata; Oman, 1936: 380; Linnauori, 1959: 164 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 544 (cat.); Linnauori & DeLong, 1978a: 125 (note, distr.); Zanol, 1999: 85 (redesc.).

fenica Zanol

Bahita fenica Zanol, 1996a: 727. Type locality: Brazil, Parana, Fenix (Reserva Est. ITCF) (DZUP).

fratercula Linnauori

Bahita infuscata var. *fratercula* Linnauori, 1959: 163. Type locality: Panama, Tocumen (NMNH). Distribution – Panama, Colombia, Guyana, Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina.

Bahita fratercula; Linnauori & DeLong, 1978a: 124–125; Cavichioli & Zanol, 1991: 55 (distr.); Zanol, 1999: 86–87 (redesc., distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).

furcifer Linnauori

Bahita furcifer Linnauori, 1959: 164–165. Type locality: Brazil, Santa Catarina, Nova Teutonia (ZMUH). Zanol & Menezes, 1982: 7 (distr.); Zanol, 1999: 87–88 (redesc., distr.).

infuscata (Osborn)

Eutettix infuscatus Osborn, 1923b: 52–53. Type locality: Brazil, Chapada (CMNH). Distribution – Brazil, Peru, Bolivia, Paraguay.

Bahita infuscata; Oman, 1936: 380; Linnauori, 1955: 101 (distr.), 112 (ill.); Linnauori, 1956: 10 (distr.); Linnauori, 1959: 163 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 544 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.); Cavichioli & Zanol, 1991: 58 (distr.).

- inornata* (Linnauori & DeLong)
Guaporea inornata Linnauori & DeLong, 1978b: 232. Type locality: Peru, Huanuco, Yurac (CASC). Lozada, 1992: 29 (distr.).
Bahita inornata; Zanol, 1999: 88-89.
- interjecta* Linnauori & Delong
Bahita interjecta Linnauori & Delong, 1978a:124. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49 km N Sta Cruz (OSUC). Zanol, 1999: 89-90 (redesc., distr.).
- joseana* Zanol
Bahita joseana Zanol, 1996a: 735. Type locality: Brazil, Parana, Sao Jose dos Pinhais(Serra do Mar, BR 277 km 54) (DZUP).
- laticeps* (Osborn)
Eutettix laticeps Osborn, 1923b: 54. Type locality: Brazil, Rondonia, along rio Guapore below rio S. Miguel (CMNH).
Bahita laticeps; Oman, 1936: 380; Metcalf, 1967: 545 (cat.); Zanol, 1999: 91-92 (redesc., distr., tax.).
Menosoma laticeps; Linnauori, 1959: 184; Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.).
Guaporea laticeps; Linnauori & DeLong, 1978a: 123.
- lobata* Zanol
Bahita lobata Zanol, 1999: 92. Type locality: Brazil, Rio de Janeiro, Resende (DZUP).
manqueirana Linnauori & DeLong
Bahita manqueirana Linnauori & DeLong, 1978a: 125. Type locality: Brazil, Rio de Janeiro, Est. Mangueira (OSUC). Zanol, 1999: 93 (redesc., distr.).
- maracana* Zanol
Bahita maracana Zanol, 1997a: 113-115. Type locality: Brazil, Roraima, Ilha de Maraca, rio Uraricoera (INPA). Zanol, 1999: 94 (redesc., distr.).
mimica Linnauori & DeLong
Bahita mimica Linnauori & DeLong, 1978a: 125. Type locality: Bolivia, La Paz, Coroico (OSUC). Zanol, 1999: 95 (redesc., distr.).
- mineira* Zanol
Bahita mineira Zanol, 1999: 95-96. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Pedra Azul (DZUP).
ourensis Zanol
Bahita ourensis Zanol, 1999: 96-97. Type locality: Brazil, Rondonia, Ouro Preto do Oeste (DZUP).
palliditarsis (Stål)
J[assus] (Athysanus) palliditarsis Stål, 1862: 52. Type locality: Brazil, Rio de Janeiro (SMNH).
Euscelis palliditarsis; Osborn, 1924: 413.
Bahita palliditarsis; Oman, 1936: 380; Linnauori, 1954b: 140 (redesc., distr.); Linnauori, 1956: 10 (distr.); Linnauori, 1959: 165 (redesc.); Metcalf, 1967: 545 (cat.); Linnauori & DeLong, 1978a: 126 (distr.); Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.); Zanol, 1999: 97-98 (redesc., distr.).
- sinopia* Zanol
Bahita sinopia Zanol, 1999: 98-99. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).
spatulata Zanol
Bahita spatulata Zanol, 1999: 99-100. Type locality: Brazil, Rondonia, Ouro Preto do Oeste (DZUP).
spiralis Zanol
Bahita spiralis Zanol, 1999: 100. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

truncata Zanol

Bahita truncata Zanol, 1999: 101. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Botucatu (DZUP).
variabilis Zanol

Bahita variabilis Zanol, 1996a: 732. Type locality: Brazil, Rio de Janeiro, Silva Jardim
(DZUP). Zanol, 1999: 102–103 (redesc., distr.).

vilhena Zanol

Bahita vilhena Zanol, 1999: 103. Type locality: Brazil, Rondonia, Vilhena (DZUP).

Genus *Bandara* Ball

Type species, *Eutettix johnsoni* Van Duzee, 1894 (original designation).

Bandara Ball, 1931b: 93; Oman, 1936: 380 (redesc., tax.); DeLong & Caldwell, 1937: 21
(cat.); Knoll, 1946: 259–264 (rev.); Evans, 1947: 229 (listed); Oman, 1949: 134
(redesc.); Linnnavuori, 1959: 192 (redesc.); Metcalf, 1967: 494 (cat.); Hamilton,
1975b: 4 (in Platymetopiina); Oman *et al.*, 1990: 194 (cat.).

***Bandara (Bandara)* Ball**

hyalina (Osborn)

Mesamia hyalina Osborn, 1923b: 48. Type locality: Colombia, Cacagualito (CMNH).
Distribution – Dominican Republic, Trinidad and Tobago, Granada, Panama,
Colombia, Guyana, Brazil.

Bandara hyalina; Oman, 1936: 380; Linnnavuori, 1956: 9 (distr.); Linnnavuori, 1959: 292–
293 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 496 (cat.); Freytag & Sharkey, 2002: 266
(distr.).

lyrata DeLong

Bandara lyrata DeLong, 1980: 64. Type locality: Mexico, Chiapas Vergel (OSUC).
B[andara] lyrata; DeLong, 1980: 64 (note).

Bandara lyrata; Mackamey & Hicks, 2007: 934.

procera DeLong

Bandara procera DeLong, 1980: 64. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).
similis DeLong

Bandara similis DeLong, 1980: 63. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

spinella DeLong

Bandara spinella DeLong, 1980: 63. Type locality: Mexico, Guerrero, Chilpancingo
(OSUC).

***Bandara (Bandarana)* DeLong**

Type species, *Bandara mimica* DeLong, 1980 (original designation).

Bandara (Bandarana) DeLong, 1980: 64; Oman *et al.*, 1990: 194 (cat.).

mimica DeLong, 1980

Bandara (Bandarana) mimica DeLong, 1980: 64. Type locality: Mexico, Vera Cruz,
Orizaba (OSUC).

Genus *Bandaromimus* Linnnavuori

Type species, *Bandaromimus fulvopictus* Linnnavuori, 1959 (original designation).

Bandaromimus Linnnavuori, 1959: 291; Oman *et al.*, 1990: 194 (cat.).

australis Linnnavuori

Bandaromimus australis Linnnavuori, 1959: 292. Type locality: Argentina, Misiones,
Loreto(NMNH). Distribution – Brazil, Argentina.

fulvopictus Linnnavuori

Bandaromimus fulvopictus Linnavuori: 1959: 291–292. Type locality: Peru, Madre de Dios (HNHM). Linnavuori & Heller, 1961: 12 (distr.); Lozada, 1992: 28 (distr.).
insularis Zanol

Bandaromimus insularis Zanol, 2002a: 195. Type locality: Brazil, Parana, Paranagua (Ilha do Mel) (DZUP).

matogrossensis Zanol

Bandaromimus matogrossensis Zanol, 2002a: 193. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

parvicauda Linnavuori & Heller

Bandaromimus parvicauda Linnavuori & Heller, 1961: 12. Type locality: Peru, Hacienda Mascoitania (SMNS). Distribution – Peru, Brazil. Lozada, 1992: 28 (distr.); Zanol, 2002a: 191–193 (redesc., ill. distr.).

Genus *Bardana* DeLong

Type species, *Bardana depressa* DeLong, 1980 (original designation).

Bardana DeLong, 1980: 65; Oman et al., (1990): 194 (cat.).

depressa DeLong

Bardana depressa DeLong, 1980: 65. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC).

Genus *Baroma* Oman

Type species, *Baroma reticulata* Oman, 1936 (original designation).

Baroma Oman, 1936: 377; Evans, 1947: 230 (listed); Metcalf, 1967: 546 (cat); Oman et al., 1990: 194 (cat.).

reticulata Oman

Baroma reticulata Oman, 1936: 378; Metcalf, 1967: 547 (cat). Type locality: Argentina, Misiones, Loreto. (NMNH).

Genus *Benibahita* Linnavuori

Type species, *Benibahita furcillata* Linnavuori, 1959 (original designation).

Benibahita Linnavuori, 1959: 179–180; Oman et al., 1990: 195 (cat.).

furcillata Linnavuori

Benibahita furcillata Linnavuori, 1959: 180–181. Type locality: Bolivia, Rurrenabaque (NMNH). Distribution – Colombia, Bolivia, Brazil. Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.); Zanol, 2006f: 123 (desc. female).

Genus *Bergolix* Linnavuori

Type species, *Bergolix signatipennis* Linnavuori, 1959 (original designation).

Bergolix Linnavuori, 1959: 288; Oman et al., 1990: 195 (cat.).

dimorphus (Berg)

Athysanus dimorphus Berg, 1884a: 30–31. Type locality: Argentina, Buenos Aires (MLPA). Distribution – Brazil, Argentina. Metcalf, 1967: 360 (cat.).

Bergolix dimorphus; Linnavuori, 1959: 290.

signatipennis Linnavuori

Bergolix signatipennis Linnavuori, 1959: 289–290. Type locality: Brazil, Mato Grosso do Sul, Corumba (NMNH). Distribution – Brazil, Argentina. Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

Genus *Bonneyana* Oman

Type species, *Thamnotettix schwartzi* Ball, 1911 (original designation).

Bonneyana Oman, 1949: 127; Metcalf, 1967: 1328 (in Colladonini); Hamilton, 1975b: 494 (in Platymetopiina); Oman et al., 1990: 196 (cat.).

caldwelli (DeLong)

Idiodonus caldwelli DeLong, 1946a: 16. Type locality: Mexico, Hidalgo, Jacala (OSUC).
DeLong 1984a: 10 (key); Metcalf, 1967: 1288 (cat).

Bonneyana caldwelli; Nielson, 1988: 132.

Idiodonus apertus DeLong, 1946a: 14–15. Type locality: Mexico, Puebla (OSUC).
Metcalf, 1967: 1287 (cat); DeLong, 1984a: 10 (key); Nielson, 1988: 132 (syn).

schwartzii (Ball)

Thamnotettix Schwartzii [sic] Ball, 1911: 197. Type locality: USA, Utah, Dewey
(NMNH). Distribution – USA, Mexico.

Idiodonus schwartzii; DeLong, 1946a: 14; DeLong, 1984a: 10 (key).

Bonneyana schwartzii; Oman, 1949: 128; Metcalf, 1967: 1328 (cat).

Genus *Brasilanus* Linnauvori

Type species, *Brasilanus flagellaris* Linnauvori, 1959 (original designation).

Brasilanus Linnauvori, 1959: 287; Oman et al., 1990: 19 (cat.).

Brasilanus (Brasilanus) Linnauvori

flagellaris Linnauvori, 1959

Brasilanus flagellaris Linnauvori, 1959: 288. Type locality: Brazil, Santa Catarina,
Nova Teutonia (AMNH). Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

Brasilanus (Mascoitanus) Linnauvori & Heller

Type species, *Brasilanus lateralis* Linnauvori & Heller, 1961 (original designation).

Brasilanus (Mascoitanus) Linnauvori & Heller, 1961: 12; Cwikla & Blocker, 1981: 173
(note); Oman et al., 1990: 196 (cat.).

lateralis Linnauvori & Heller

Brasilanus (Mascoitanus) lateralis Linnauvori & Heller, 1961: 12. Type locality: Peru,
Hacienda Mascoitania (SMNS). Lozada, 1992: 28 (distr.).

Genus *Brazosa* Oman

Type species, *Thamnotettix picturellus* Baker, 1923 (original designation).

Brazosa Oman, 1936: 386; Evans, 1947: 230 (listed); Metcalf, 1967: 810 (in
Thamnotettixini); Oman et al., 1990: 196 (cat.).

appendiculata Linnauvori & DeLong

Brazosa appendiculata Linnauvori & DeLong, 1976: 36. Type locality: Bolivia, San
Esteban, 49km N. Sta Cruz (OSUC).

caesarea Linnauvori & Heller

Brazosa caesarea Linnauvori & Heller, 1961: 11. Type locality: Peru, Hacienda
Mascoitania (SMNS). Lozada, 1992: 28 (distr.).

distincta Zanol

Brazosa distincta Zanol, 1989b: 3–4. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

larocai Zanol

Brazosa larocai Zanol, 1989b: 5. Type locality: Brazil, Santa Catarina, Nova Teutonia
(DZUP).

picturella (Baker)

Thamnotettix picturellus Baker, 1923: 532 (*nom. nov. pro Thamnotettix pictus*
Osborn, 1923b, non Lethierry, 1875). Type locality: Brazil, Chapada (CMNH).
Distribution – Brazil, Peru, Bolivia. Evans, 1947: 230 (listed).

Brazosa picturella; Oman, 1936: 386; Linnauvori, 1959: 246 (redesc.); Metcalf 1967:
811 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.); Lozada, 1992: 28 (distr.).

Brazosa picta; Linnavuori, 1954b: 140 (= *Thamnotettix pictus* Osborn, 1923b); Linnavuori, 1956: 9 (distr.).

Genus *Brincadorus* Oman

Type species, *Brincadorus laticeps* Oman, 1936 (original designation).

Brincadorus Oman, 1936: 361; Evans, 1947: 230 (in Selenocephalini); Linnavuori, 1959: 158 (in Euscelni); Metcalf, 1966: 183 (in Iassidae); Oman et al., 1990: 196 (cat.).

laticeps Oman

Brincadorus laticeps Oman, 1936: 361–362. Type locality: Brazil, Chapada (NMNH). Distribution – Brazil, Bolivia. Metcalf, 1967: 183 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

Genus *Cahya* Linnavuori

Type species, *Thamnotettix pulchellus* Osborn, 1923 (original designation).

Cahya Linnavuori, 1959: 276; Oman et al., 1990: 97 (cat.).

chapadensis Menezes

Thamnotettix chapadensis Baker, 1923: 532 (*nom. nov. pro Thamnotettix pulchellus* Osborn, 1923b, non Melichar, 1907). Type locality: Brazil, Chapada (CMNH). Distribution – Brazil, Argentina. Metcalf, 1967: 738 (cat.).

Cahya pulchella; Linnavuori, 1959: 277. (*comb. nov. pro Thamnotettix pulchellus* Osborn, 1923b).

Cahya chapadensis; Menezes, 1973: 135; Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

spinosa Linnavuori & DeLong

Cahya spinosa Linnavuori & DeLong, 1979a: 131–132. Type locality: Brazil, Amapá, rio Anicohí (OSUC).

variabilis (DeLong)

Chlorotettix variabilis DeLong, 1945a: 27. Type locality: Mexico, Tabasco, Pcviuç (OSUC). Distribution – Mexico, Guatemala, Panama, Venezuela.

Cahya variabilis; Linnavuori, 1959: 278.

Genus *Caphodus* Oman

Type species, *Caphodus maculatus* Oman, 1936 (original designation).

Caphodus Oman, 1936: 375; Evans 1947: 241 (in Platymetopiini); Metcalf, 1967: 2175 (in Scaphoideini); Oman et al., 1990: 198 (cat.).

maculatus Oman

Caphodus maculatus Oman, 1936: 376. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (CMNH). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina. Metcalf, 1967: 2175 (cat.).

obliquus (Osborn)

Scaphoideus obliquus Osborn, 1923b: 40–41. Type locality: Brazil, Chapada (CMNH).

Caphodus obliquus; Oman, 1936: 376; Metcalf, 1967: 2176 (cat.). Zanol & Menezes 1982: 38 (distr.).

panamensis Linnavuori & DeLong

Caphodus panamensis Linnavuori & DeLong, 1977a: 564. Type locality: Panama, Las Cumbres (OSUC).

Genus *Caranavia* Linnavuori

Type species, *Caranavia cruentata* Linnavuori, 1959 (original designation).

Caranavia Linnavuori, 1959: 278; Oman et al., 1990: 198 (cat.).

cruentata Linnavuori

Caranavia cruentata Linnauvori, 1959: 278. Type locality: Bolivia, Nor Yungas, Caranavi (MLPA).

separata Linnauvori & Heller

Caranavia separata Linnauvori & Heller, 1961: 13. Type locality: Peru, Caras, 2200m (SMNS). Lozada, 1992: 28 (distr.).

Genus *Carelmapu* Linnauvori

Type species, *Carelmapu scutellaris* Linnauvori, 1959 (original designation).

Carelmapu Linnauvori, 1959: 220; Oman et al., 1990: 198 (cat.).

Carelmapu (Carelmapu) Linnauvori

mexicanus Zanol

Carelmapu mexicanus Zanol, 1989f: 368. Type locality: Mexico, Guerrero, Amula (BMNH).

ramosi Linnauvori

Carelmapu ramosi Linnauvori, 1959: 222. Type locality: Chile, Llanquihue, Carelmapu (AMNH). Linnauvori & DeLong, 1977b: 206 (distr.).

scutellaris Linnauvori

Carelmapu scutellaris Linnauvori, 1959: 221. Type locality: Chile, Llanquihue, Carelmapu (AMNH). Linnauvori & DeLong, 1977b: 206 (distr.).

Carelmapu (Nahuelbuta) Linnauvori & DeLong

Type species, *Carelmapu aureonitens* Linnauvori & DeLong, 1977 (original designation).

Carelmapu (Nahuelbuta) Linnauvori & DeLong 1977b: 207; Cwikla & Blocker, 1981: 172–173 (note); Oman et al., 1990: 232 (cat.).

aureonitens Linnauvori & DeLong

Carelmapu (Nahuelbuta) aureonitens Linnauvori & DeLong, 1977b: 207. Type locality: Chile, Chepu, 19km E. Chiloe Isl. (OSUC).

Genus *Caruya* Linnauvori & DeLong

Type species, *Caruya brevicauda* Linnauvori & DeLong, 1978 (original designation).

Caruya Linnauvori & DeLong, 1978b: 230; Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note); Oman et al., 1990: 198 (cat.).

aculeata Zanol

Caruya aculeata Zanol, 2006d: 65–66. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Nova Xavantina (DZUP).

brevicauda Linnauvori & DeLong

Caruya brevicauda Linnauvori & DeLong, 1978b: 230–231. Type locality: Peru, Yurac, 67mi E of Tingo Maria (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Chaparea* Linnauvori

Type species, *Chaparea albigena* Linnauvori, 1959 (original designation).

Chaparea Linnauvori, 1959: 240–241.

albigena Linnauvori

Chaparea albigena Linnauvori, 1959: 241. Type locality: Bolivia, Yungas, Chapare (ISM).

alta (Osborn)

Thamnotettix altus Osborn, 1924: 417. Type locality: Bolivia, Yungas, Corioco (CMNH). Metcalf, 1967: 733 (cat.).

Chaparea alta; Linnauvori, 1959: 241.

Genus *Chlorotettix* Van Duzee

Type species, *Bythoscopus unicolor* Fitch, 1851 (original designation).

Chlorotettix Van Duzee, 1892b: 306; DeLong, 1918: 1-29 (rev.); Brown, 1933: 235-241 (note, key); Oman, 1936: 389 (redesc., tax.); DeLong & Caldwell, 1937: 53 (cat.); DeLong, 1945a: 1-3 (rev., key); Evans, 1947: 230 (listed); Oman, 1949: 133 (redesc.); Caldwell & Martorell, 1952: 71-71 (redesc., key); Metcalf, 1954: 27 (in Acinopterni); Linnnavuori, 1959: 250-272 (redesc., key, tax); Metcalf, 1967: 26 (in Acinopterini); DeLong & Martinson, 1974a: 261 (note); Hamilton, 1975b: 490 (in Athysanina); Oman et al., 1990: 200 (cat.).

Celsanus Linnnavuori, 1954b: 137. Type species, *Jassus (Thamnotettix) serius* Stål, 1862 (original designation). Linnnavuori, 1959: 250 (syn.); Metcalf, 1967: 710 (cat.).

Chlorotettix (Chacotettix) Linnnavuori

Type species, *Chacotettix appendiculatus* Linnnavuori, 1955 (original designation).

Chacotettix Linnnavuori, 1955: 106; Linnnavuori, 1959: 270 (redesc., key); Metcalf, 1967: 1077 (in Acinopterini); Oman et al., 1990: 200 (cat.).

Chlorotettix (Chacotettix); Linnnavuori, 1959: 270.

languidus Linnnavuori

Chlorotettix (Chacotettix) languidus Linnnavuori, 1959: 271. Type locality: Panama, Tocumen (NMNH).

lugens Linnnavuori

Chlorotettix (Chacotettix) lugens Linnnavuori, 1959: 271-272. Type locality: Bolivia, Huachi Beni (NMNH).

nigromaculatus DeLong

Chlorotettix nigromaculatus DeLong, in Wolcott, 1923: 265. Type locality: Puerto Rico (OSUC). Distribution – Mexico, Puerto Rico, Jamaica, Guatemala, Panama, Colombia, Brazil, Paraguay. Osborn, 1935: 166 (redesc., tax.); DeLong, 1945a: 25 (redesc.); Caldwell & Martorell, 1952: 72 (distr.), 75 (ill.); Metcalf 1967: 1051 (cat.); Linnnavuori, 1986: 154 (distr.); Cavichioli & Zanol, 1991: 59 (distr.); Freytag & Shakey, 2002: 266 (distr.).

Chlorotettix (Chacotettix) nigromaculatus; Linnnavuori, 1959: 270.

Chacotettix appendiculatus Linnnavuori, 1955: 107. Type locality: Paraguay, Chaco (NHMW). Linnnavuori, 1959: 270 (syn.); Metcalf, 1967: 1077 (cat.).

Chlorotettix (Chlorotettix) Van Duzee

Chlorotettix (Chlorotettix); Linnnavuori, 1959: 251.

albidus (Walker)

Bythoscopus albidus Walker, 1851: 872. Type locality: Honduras (BMNH). Metcalf, 1966: 44 (cat.).

Chlorotettix albidus; Linnnavuori, 1973a: 97

Chlorotettix curvidens Osborn, in DeLong, 1918: 16. Type locality: Guatemala (OSUC).

Distribution – USA, Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panama, Venezuela, Brazil. DeLong & Caldwell, 1937: 54 (cat.); DeLong, 1945a: 21 (redesc., distr.); DeLong & Knull, 1945: 62 (cat.); Oman, 1949: 124 (distr.); Metcalf, 1967: 1034 (cat.); Linnnavuori, 1973a: 97 (syn.); Maes et al., 1999: 22 (distr.).

Chlorotettix serratus DeLong, 1937a: 54. Type locality: USA., Texas (INHS). DeLong, 1945a: 21 (listed); Oman, 1949: 124 (syn.); Linnnavuori, 1959 (listed); Metcalf, 1967: 1034 (cat.); Linnnavuori, 1973a: 97 (syn.).

atriceps Linnauvori

Chlorotettix (Chlorotettix) atriceps Linnauvori, 1959: 256. Type locality: Paraguay, Toldo Cue (NHMW).

bakeri Sanders & DeLong

Chlorotettix bakeri Sanders & DeLong, 1922: 97. Type locality: Brazil, Mato Grosso do Sul, Corumba (NMNH). Osborn, 1923b: 74 (redesc., tax.); Oman, 1936: 389 (listed); DeLong & Caldwell, 1937: 54 (cat.); DeLong, 1945a: 29 (redesc.); Linnauvori, 1955: 104 (note); Metcalf, 1967: 1030 (cat.).

Chlorotettix (Chlorotettix) bakeri; Linnauvori, 1959: 264; Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

bergi Linnauvori

Chlorotettix (Chlorotettix) bergi Linnauvori, 1959: 267–268. Type locality: Argentina, Santa Fe, Reconquista (MLPA).

berryi DeLong

Chlorotettix berryi DeLong, 1945a: 26. Type locality: Brazil, Para, Santarem (OSUC).

Chlorotettix (Chlorotettix) berryi; Linnauvori, 1959: 267; Metcalf, 1967: 1032 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

bicoloratus DeLong

Chlorotettix bicoloratus DeLong, 1945a: 7. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Vicos (OSUC). Metcalf, 1967: 1032 (cat.).

Chlorotettix (Chlorotettix) bicoloratus; Linnauvori, 1959: 253; Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

bimaculatus DeLong & Linnauvori

Chlorotettix bimaculatus DeLong & Linnauvori, 1978: 119. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Piracicaba (OSUC).

bipartitus DeLong

Chlorotettix bipartitus DeLong, 1945a: 1–18. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 1032 (cat.).

boliviellus DeLong & Martinson

Chlorotettix boliviellus DeLong & Martinson, 1974a: 264. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49 Km N. Sta Cruz (OSUC).

breviceps Baker

Chlorotettix breviceps Baker, 1898a: 220. Type locality: Brazil, Chapada (NMNH). DeLong,

1918: 28 (redesc.); Osborn, 1923b: 72 (redesc.); Oman, 1936: 389 (listed); DeLong & Caldwell, 1937: 55 (cat.); DeLong, 1945a: 30 (redesc.); Metcalf, 1967: 1033 (cat.).

Chlorotettix (Chlorotettix) breviceps; Linnauvori, 1959: 268; Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

brunneus DeLong

Chlorotettix brunneus DeLong, 1945a: 9–10. Type locality: Mexico, Guerrero, Chilpancingo (OSUC). Metcalf, 1967: 1033 (cat.).

canolaterus Cwikla & Freytag

Chlorotettix canolaterus Cwikla & Freytag, 1982: 634–635. Type locality: Costa Rica, Cocos Island (LACM).

caudata DeLong & Linnauvori

Chlorotettix caudata DeLong & Linnauvori, 1979: 170. Type locality: Mexico, Tuxtla Gutierrez (OSUC).

delicatus Osborn

- Chlorotettix delicatus* Osborn, 1923b: 73. Type locality: Brazil, Bahia (CMNH). Distribution – Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina. Oman, 1936: 389 (listed); DeLong, 1945a: 11 (redesc.); Metcalf, 1967: 1035 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) delicatus*; Linnauori, 1959: 269; Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).
- duospinus* DeLong & Martinson
- Chlorotettix duospinus* DeLong & Martinson, 1974a: 262. Type locality: Argentina, Tucuman, Villa Padre Monti (SNOW).
- emarginatus* Baker
- Chlorotettix emarginata* Baker, 1898a: 219. Type locality: Mexico, Vera Cruz, Medellin (NMNH). Distribution – Mexico, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Brazil.
- Chlorotettix emarginatus*; DeLong, 1918: 28 (redesc.); DeLong & Caldwell, 1937: 55 (cat.); DeLong, 1945a: 18 (redesc.); Metcalf, 1967: 1036 (cat.); Maes & Godoy, 1993: 27 (distr.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) emarginatus*; Linnauori, 1959: 258–259.
- essbejus* Zanol
- Chlorotettix essbejus* Zanol, 2001c: 387–388. Type locality: Peru, Huanuco, Tingo Maria (CASC).
- excultus* Sanders & DeLong
- Chlorotettix excultus* Sanders & DeLong, 1922: 97. Type locality: USA, Florida (CASC). Distribution – USA, Jamaica, Haiti, Trinidad and Tobago, Brazil. DeLong & Caldwell, 1937: 54 (cat.); Oman, 1949: 124 (distr.); Metcalf, 1967: 1037 (cat.).
- floridanus* DeLong
- Chlorotettix floridanus* DeLong, 1924: 66. Type locality: USA, Florida (OSUC). Distribution – USA, Bahamas. DeLong & Caldwell, 1937: 54 (cat.); DeLong, 1945a: 17 (redesc.); DeLong & Knoll, 1945: 62 (cat.); Oman, 1949: 124 (distr.); Metcalf, 1954: 26–27 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 1038 (cat.).
- Chlorotettix rubidus* Brown, 1933: 246–247. Type locality: USA, Florida, Plant City (SNOW). DeLong, 1937b: 54 (syn); Oman, 1949: 124 (listed); Linnauori, 1959: 266 (listed).
- Chlorotettix (Chlorotettix) floridanus*; Linnauori, 1959: 266.
- forcipata* DeLong & Linnauori
- Chlorotettix forcipata* DeLong & Linnauori, 1979: 171. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Piracicaba (OSUC).
- frameus* DeLong & Linnauori
- Chlorotettix frameus* DeLong & Linnauori, 1978: 122. Type locality: Brazil, Goias, Aragarças (OSUC).
- fraterculus* (Berg)
- Athysanus fraterculus* Berg, 1879: 262. Type locality: Argentina (MLPA). Distribution - Puerto Rico, Virgin Island., Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, Trinidad and Tobago, Panama, Colombia, Surinam, Brazil, Peru, Paraguay, Argentina. Metcalf, 1967: 362 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) fraterculus*; Linnauori, 1959: 264; Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).
- Chlorotettix fraterculus*; Ruffinelli, 1970: 17 (distr.); Cheng, 1980: 65 (distr.); Lozada, 1982: 29 (distr.); Linnauori, 1986: 153 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).
- Chlorotettix cognitus* Caldwell, in Caldwell & Martorell, 1952: 73. Type locality: Puerto Rico, Arecibo, Marcelloneta (NMNH). Linnauori, 1959: 264 (syn.); Metcalf, 1967: 1034 (cat.); Bonfils & Delpanque, 1971: 145 (distr.).

- Chlorotettix longispina* Linnauvori, 1955: 103. Type locality: Paraguay, Chaco (NHMW).
Linnauvori, 1959: 264 (syn.); Metcalf, 1967: 1044 (cat.).
- fulvicus* Cheng
Chlorotettix fulvicus Cheng, 1980: 98, 99. Type locality: Paraguay, nr Filadelfia,
Mennonite Exp. Sta (SNOW).
- fuscifasciatus* Cheng
Chlorotettix fuscifasciatus Cheng, 1980: 95–96. Type locality: Paraguay, Encarnacion
(SNOW).
- giganteus* Linnauvori
Chlorotettix (Chlorotettix) giganteus Linnauvori, 1959: 255. Type locality: Argentina,
Tucuman (HNHM). Distribution – Brazil, Argentina.
- grandis* Linnauvori
Chlorotettix (Chlorotettix) grandis Linnauvori, 1959: 267. Type locality: Colombia,
Aracataca (HNHM).
- Chlorotettix grandis*; Linnauvori, 1986: 153 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 266
(distr.).
- guerrerus* DeLong & Martinson
Chlorotettix (Chlorotettix) guerrerus DeLong & Martinson, 1974a: 265. Type locality:
Mexico, Guerrero, Buena Vista (OSUC).
- hamiltoni* Zanol
Chlorotettix hamiltoni Zanol, 2002b: 1221 (*nom. nov. pro Chlorotettix dentatus* Zanol,
2001c non Sanders & DeLong, 1923). Type locality: Colombia, Valle, 6mi w Calli
(CASC). Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).
- hamula* DeLong & Linnauvori
Chlorotettix hamula DeLong & Linnauvori, 1979: 170. Type locality: Mexico, El Mante,
Tamaul (OSUC).
- harmodios* Linnauvori
Chlorotettix (Chlorotettix) harmodios Linnauvori, 1973a: 97. Type locality: Cuba, Havana,
Guanimar (AMNH).
- inscriptus* DeLong
Chlorotettix inscriptus DeLong, 1945a: 4. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico
City (OSUC). Metcalf, 1967: 1042 (cat.).
- kassiphone* Linnauvori
Chlorotettix (Chlorotettix) kassiphone Linnauvori, 1959: 256. Type locality: Paraguay,
Toldo Cue (NHMW). Distribution – Brazil, Paraguay. Zanol & Menezes, 1982:
38 (distr.).
- latocinctus* DeLong
Chlorotettix latocinctus DeLong, 1945a: 5-7. Type locality: Brazil, Vicos (OSUC).
Metcalf, 1967: 1043 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) latocinctus*; Linnauvori, 1959: 253; Zanol & Menezes, 1982:
38 (distr.).
- Celsanus modestus* Linnauvori, 1955: 107. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul
(NHMW) Linnauvori, 1956: 9 (distr.); Linnauvori, 1959: 253 (syn.); Metcalf,
1967: 711 (cat.).
- latocinctus paraguayensis* Cheng
Chlorotettix latocinctus paraguayensis Cheng, 1980: 98. Type locality: Paraguay, Parque
Nacional Guiyaque, between Caaguazu y Cnel Oviedo, 159,5 km E Asuncion
(SNOW).
- lingulus* DeLong & Martinson

- Chlorotettix lingulus* DeLong & Martinson, 1974a: 265, 267. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Piracicaba. (OSUC).
- Chlorotettix (Chlorotettix) lingulus*; Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).
- liquarus* DeLong & Martinson
- Chlorotettix liquarus* DeLong & Martinson, 1974a: 262. Type locality: Argentina, Santa Fe, Villa Guillermina (SNOW).
- lobatus* Osborn
- Chlorotettix lobatus* Osborn, in DeLong, 1918: 17–18. Type locality: Guatemala, Gualan (OSUC). Distribution – Mexico, Guatemala, Nicaragua. Jensen-Haarup, 1922: 15 (note); DeLong & Caldwell, 1937: 54 (cat.); DeLong, 1945a: 19 (redesc.); Metcalf, 1967: 1044 (cat.); Maes *et al.*, 1999: 22 (distr.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) lobatus*; Linnauori, 1959: 259–260.
- longibrachium* Cheng
- Chlorotettix longibrachium* Cheng, 1980: 96. Type locality: Paraguay, NW Asuncion 2 km E Limpo (SNOW).
- luteosus* (Baker)
- Thamnotettix luteosus* Baker, 1925: 347 (*nom. nov. pro Thamnotettix luteus* Osborn, 1924: 425, *non* Sahlberg, 1871). Type locality: Uruguay, St. Isabel. (CMNH). Distribution – Brazil, Argentina, Uruguay. Oman, 1936: 389 (listed); Metcalf, 1967: 1046 (cat.).
- Chlorotettix luteolus* [sic] DeLong, 1945a: 23 (redesc.). Ruffinelli 1970: 18 (distr.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) luteolus* [sic] Linnauori, 1959: 266. Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.).
- malevius* DeLong & Martinson
- Chlorotettix malevius* DeLong & Martinson, 1974a: 264. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49 Km N. Sta Cruz (OSUC).
- mansuetus* DeLong
- Chlorotettix (Chlorotettix) mansuetus* DeLong, 1983a: 333. Type locality: Bolivia, Puerto Villarall (OSUC).
- maximus* (Berg)
- Athysanus maximus* Berg, 1879: 261-262. Type locality: Argentina, Buenos Aires (MLPA). Distribution – Brazil, Argentina.
- Chlorotettix maximus*; Linnauori, 1955: 100 (distr.); Metcalf, 1967: 1047 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) maximus*; Linnauori, 1959: 254; Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.).
- minimus* Baker
- Chlorotettix minima* Baker, 1898a: 220. Type locality: Brazil, Chapada (NMNH). Distribution – USA, Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Cuba, Jamaica, Haiti, Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, Puerto Rico, Virgin Isl., Trinidad and Tobago, Guatemala, Colombia, Venezuela, Guyana, Brazil, Bolivia, Paraguay. Van Duzee, 1907: 71 (note); Crumb, 1915a: 191 (note).
- Chlorotettix minimus*; Van Duzee, 1916: 75 (listed); Van Duzee, 1917: 687 (cat.); Sanders & DeLong, 1922: 96-97 (redesc., note); Osborn, 1923b: 74 (redesc., note); Brown, 1933: 238 (key); Osborn, 1935: 118, 164 (ecol., redesc., ill.); Oman, 1936: 389 (listed); DeLong & Caldwell, 1937: 54 (cat.); DeLong, 1945a: 26 (redesc.); Oman, 1949: 124 (distr.); Caldwell & Martorell, 1952: 73 (note, distr.), 75 (ill.); Linnauori, 1955: 104 (note); Linnauori, 1956: 9 (distr.); Metcalf, 1967: 1048 (cat.); Bonfils & Delplanque, 1971: 14 (distr.); Linnauori, 1973a: 95 (distr.); Cheng, 1980: 65 (distr.); Linnauori, 1986: 153 (distr.); Cavichioli & Zanol, 1991: 58 (distr.); Freytag & Maes, 1997: 36 (distr.); Maes *et al.*, 1999: 23

- (distr.); Hidalgo-Gato & Rodrígues-León, 2000: 96 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) minimus*; Linnauori, 1959: 262; Zanol & Menezes, 192: 39 (distr.).
- Chlorotettix lineatus* Osborn, in DeLong, 1918: 5. Type locality: Guatemala, Los Amates (OSUC). DeLong & Caldwell, 1937: 53 (cat.); DeLong & Knull, 1945: 62 (syn.); Linnauori, 1959: 262 (listed).
- Chlorotettix truncatus* Osborn, 1923b: 75. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Oman, 1936: 389 (listed); DeLong, 1945a: 13 (note); Linnauori, 1955: 100 (distr.); Linnauori, 1956: 9 (distr.); Linnauori, 1959: 262 (syn.); Metcalf, 1967: 1065 (cat.).
- montanus* Caldwell
- Chlorotettix montanus* Caldwell, in Caldwell & Martorell, 1952: 74. Type locality: Puerto Rico, Ponce, Ponce-Adjuntas road, km 12.6 800ft (NMNH). Metcalf, 1967: 1049 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) montanus*; Linnauori, 1959: 265.
- nauticus* DeLong
- Chlorotettix (Chlorotettix) nauticus* DeLong, 1983a: 333. Type locality: Bolivia, Buena Vista (OSUC).
- necopinus* Van Duzee
- Chlorotettix necopina* Van Duzee, 1893: 182. Type locality: Mexico. DeLong, 1918: 8 (ISUI).
- Chlorotettix necopinus*; DeLong, 1918: 8; DeLong, 1945a: 3 (redesc.); Metcalf, 1967: 1049 (cat.).
- neotropicus* Jensen-Haarup
- Chlorotettix neotropicus* Jensen-Haarup, 1922: 15. Type locality: Argentina, Mendoza, Santa Rosa (BMNH). Oman, 1936: 389 (listed); Linnauori, 1955: 100 (distr.); Metcalf, 1967: 1051 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) neotropicus*; Linnauori, 1959: 265.
- nigrolabes* DeLong
- Chlorotettix nigrolabes* DeLong, 1945a: 15–16. Type locality: Mexico, Morelos, Jiutepec (OSUC). Metcalf, 1967: 1051 (cat.).
- nimbuliferus* (Berg)
- Athysanus nimbuliferus* Berg, 1884a: 28. Type locality: Argentina, Buenos Aires (MLPA). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina. Metcalf, 1967: 369 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) nimbuliferus*; Linnauori, 1959: 262; Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.).
- Chlorotettix nimbuliferus*; Cheng, 1980: 65 (distr.).
- Chlorotettix recurvatus* DeLong, 1945a: 27, 29. Type locality: Argentina, Misiones (OSUC). Linnauori, 1959: 262 (syn.); Metcalf, 1967: 1054 (cat.).
- Chlorotettix taeniaticeps* Linnauori, 1955: 105. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul. (NHW). Linnauori, 1959: 262 (syn.); Metcalf, 1967: 1061 (cat.).
- nudatus* Ball
- Chlorotettix nudata* Ball, 1900a: 340. Type locality: USA, Iowa, Ames (NMNH). Distribution – USA, Mexico.
- Chlorotettix nudatus*; DeLong, 1918: 5 (key), 27 (redesc.). DeLong & Caldwell, 1937: 55 (cat.); DeLong, 1945a: 19 (redesc.); Oman, 1949: 124 (distr.).
- obscurus* DeLong
- Chlorotettix obscurus* DeLong, 1945a: 7–8. Type locality: Mexico, Michoacan, Carapan (OSUC). Metcalf, 1967: 1052 (cat.).

ogloblini Linnnavuori

Chlorotettix (Chlorotettix) ogloblini Linnnavuori, 1959: 257. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (NMNH).

orbicula DeLong & Linnnavuori

Chlorotettix orbicula DeLong & Linnnavuori, 1979: 170. Type locality: Mexico, Hacienda Potrero (OSUC).

pinus DeLong

Chlorotettix pinus DeLong, 1945a: 8. Type locality: Mexico, Distrito Federal, 43 km south of Mexico City (OSUC). Metcalf, 1967: 1054 (cat.).

polymaculatus Cheng

Chlorotettix polymaculatus Cheng, 1980: 93. Type locality: Paraguay, NW Asuncion, 2 km E Limpio (SNOW).

protensus Linnnavuori

Chlorotettix (Chlorotettix) protensus Linnnavuori, 1959: 255–256. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (NMNH).

Chlorotettix protensus; Cheng, 1980: 65 (distr.).*redimiculus* DeLong

Chlorotettix redimiculus DeLong, 1945a: 4–5. Type locality: Mexico, Vera Cruz, Orizaba (OSUC). Distribution – Mexico, Costa Rica, Nicaragua. Metcalf, 1967: 1054 (cat.); Maes *et al.*, 1999: 23 (distr.).

Chlorotettix (Chlorotettix) redimiculus; Linnnavuori, 1959: 256.*scutellatus* Osborn

Chlorotettix scutellatus Osborn, *in* DeLong, 1918: 18. Type locality: USA, Texas, Brownsville (OSUC). Distribution – USA, Mexico. Oman 1949: 124 (listed); DeLong, 1945a: 22 (redesc.); Metcalf, 1967: 1055 (cat.).

Chlorotettix (Chlorotettix) scutellatus; Linnnavuori, 1959: 261.

Chlorotettix pallidus Brown, 1933: 245. Type locality: USA, Texas, Cameron Co (SNOW). DeLong & Caldwell, 1937: 53 (cat.); DeLong, 1945a: 22 (syn.); Oman 1949: 124 (listed); Linnnavuori, 1959: 261 (listed); Metcalf, 1967: 1055 (cat.).

septempunctus Linnnavuori & DeLong

Chlorotettix (Chlorotettix) septempunctus Linnnavuori & DeLong, 1979a: 129–130. Type locality: Brazil, Roraima, Surumu (OSUC).

serius (Stål)

J[assus] (Thamnotettix) serius; Stål, 1862: 52. Type locality: Brazil, Rio de Janeiro (NHRS).

Celsanus serius; Linnnavuori, 1954b: 138; Metcalf, 1967: 711 (cat.).

Chlorotettix (Chlorotettix) serius; Linnnavuori, 1959: 253; Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.).

sexvarus DeLong

Chlorotettix sexvarus DeLong, 1959: 326. Type locality: Mexico (OSUC).

sinchona DeLong & Linnnavuori

Chlorotettix sinchona DeLong & Linnnavuori, 1978: 120. Type locality: Peru, Sinchonoa (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

spinellus DeLong & Martinson

Chlorotettix spinellus DeLong & Martinson, 1974a: 267. Type locality: Mexico, Michoacan, Hidalgo (OSUC).

spiniloba Linnnavuori

Chlorotettix (Chlorotettix) spiniloba Linnnavuori, 1986: 154. Type locality: Colombia, Villa Vicencio (AMNH).

Chlorotettix spiniloba; Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).*spinosus* DeLong

- Chlorotettix spinosus* DeLong, 1945a: 10–11. Type locality: Mexico, Guerrero, Buena Vista (OSUC). Metcalf, 1967: 1059 (cat.).
- striatus* DeLong
Chlorotettix striatus DeLong, 1945a: 23. Type locality: Mexico, Chiapas, Vergel (OSUC). Metcalf, 1967: 1060 (cat.).
- subfuscus* DeLong
Chlorotettix subfuscus DeLong, 1945a: 8–9. Type locality: Mexico, Michoacan, Carapan (OSUC). Metcalf, 1967: 1060 (cat.).
- sycophanthus* Linnauori
Chlorotettix sycophanthus Linnauori, 1955: 106. Type locality: Paraguay, Chaco (NHW). Metcalf, 1967: 1061 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) sycophanthus*; Linnauori, 1959: 269.
- tessellatus* DeLong
Chlorotettix Tessellatus [sic] DeLong, 1980: 70–71. Type locality: Brazil, Sao Paulo (OSUC).
- torqus* DeLong & Linnauori
Chlorotettix torqus DeLong & Linnauori, 1978: 122. Type locality: Brazil, Roraima, Surumu (OSUC).
- undatus* DeLong
Chlorotettix undatus DeLong, 1945a: 29. Type locality: Mexico, Oaxaca, Loma Bonita (OSUC). Metcalf, 1967: 1067 (cat.).
- valenciae* Linnauori
Chlorotettix (Chlorotettix) valenciae Linnauori, 1973b: 15. Type locality: Peru, Ica, Had Huamani (AMNH).
- Chlorotettix valenciae*; Lozada, 1992: 29 (distr.).
- venosus* DeLong
Chlorotettix venosus DeLong, 1945a: 9. Type locality: Mexico, Michoacan, Tuxpan (OSUC). Metcalf, 1967: 1073 (cat.).
- virgus* Linnauori & DeLong
Chlorotettix (Chlorotettix) virgus Linnauori & DeLong, 1979a: 130–131. Type locality: Brazil, Roraima, Surumu (OSUC).
- viridius* Van Duzee
Chlorotettix viridius Van Duzee, 1892a: 309. Type locality: USA, New York City (ISUI). Distribution – USA, Cuba, Puerto Rico, Jamaica. DeLong, 1918: 15 (redesc.); Brown, 1933: 236 (distr.); DeLong, 1945a: 10 (redesc.); Metcalf, 1967: 1073 (cat.); Linnauori, 1973a: 95 (distr.).
- Chlorotettix viridia*; Van Duzee, 1894b: 304 (distr.); Van Duzee, 1907: 71 (note).
- Chlorotettix (Chlorotettix) viridius*; Linnauori, 1959: 260.
- vittatus* Osborn
Chlorotettix vittatus Osborn, 1909: 465. Type locality: Guatemala, Los Amates (OSUC). Distribution – Mexico, Guatemala. DeLong, 1918: 10 (redesc.); DeLong, 1945a: 22 (redesc.); Metcalf, 1967: 1077 (cat.).
- Chlorotettix (Chlorotettix) vittatus*; Linnauori, 1973a: 95.

Genus *Chonosina* Linnauori & DeLong

Type species, *Chonosina flavocostata* Linnauori & DeLong, 1978a (original designation)
Chonosina Linnauori & DeLong, 1978a: 134; Cwikla & Blocker, 1981: 73 (note); Oman et al., 1990: 200 (cat.).

flavocostata Linnauori & DeLong

Chonosina flavocostata Linnnavuori & DeLong, 1978a: 134–135. Type locality: Peru, Sinchono (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Clorindaia* Linnnavuori

Type species, *Clorindaia hecaloides* Linnnavuori, 1975 (original designation).

Clorindaia Linnnavuori, 1975a: 51; Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note); Oman *et al.*, 1990: 201 (cat.); Zahniser & Webb, 2004: 669 (key).

adama Blocker & Fang

Clorindaia adama Blocker & Fang, 1992: 342. Type locality: Paraguay, N Col. Bogado (SNOW).

brasileira Zahniser

Clorindaia brasileira Zahniser, in Zahniser & Webb, 2004: 673–674. Type locality: Brazil, Goias, Uruacu, Serra da Mesa (MZSP).

cyphora Blocker & Fang

Clorindaia cyphora Blocker & Fang, 1992: 344. Type locality: Paraguay, nr Luque & int. airport (SNOW).

hecaloides Linnnavuori

Clorindaia hecaloides Linnnavuori, 1975a: 51–52. Type locality: Argentina, Formosa, Clorinda (MLPA). Distribution – Paraguay, Argentina, Chile. Blocker & Fang, 1992: 342–344 (redesc., distr., note); Paradell & Remez-Lenivov, 2005: 134–136 (redesc., distr.).

latiabdoma Blocker & Fang

Clorindaia latiabdoma Blocker & Fang, 1992: 344. Type locality: Paraguay, 128.5 km W Pto Pte Stroessner, between Camp 8 y Caaguazu (SNOW).

Genus *Cocrassana* Blocker & Larsen

Type species, *Cocrassana riepmayi* Blocker & Larsen, 1991 (original designation).

Cocrassana Blocker & Larsen, 1991: 124.

riepmayi Blocker & Larsen

Cocrassana riepmayi Blocker & Larsen, 1991: 124–126. Type locality: Mexico, Jalisco, Zapopan (OSUC).

Genus *Colladonus* Ball

Type species, *Thamnotettix collaris* Ball, 1902 (original designation).

Colladonus Ball, 1936a: 57; DeLong & Caldwell, 1937: 46 (cat.); Evans, 1947: 230 (listed); Metcalf, 1967: 1242 (in Colladonini); Oman, 1949: 124–125 (redesc.; tax.); Nielson, 1957: 1–52 (rev.) Linnnavuori, 1959: 279–280 (redesc., key); Nielson, 1966: 333–335 (tax.); Nielson, 1988: 103–134 (rev., tax); Hamilton, 1975b: 494 (in Platymetopiina); DeLong, 1983b: 89 (tax.); DeLong, 1984a: 9–15 (key, ill.); DeLong & Knull, 1946: 263 (note); Oma *et al.*, 1990: 201(cat.).

Conodonotus Ball, 1936a: 58. Type species, *Thamnotettix flavocapitatus* Van Duzee, 1890 (original designation). DeLong & Caldwell, 1937: 47 (cat.); Evans, 1947: 231 (listed); Oman, 1946: 263 (note); Oman, 1949: 124 (syn.); Nielson, 1966: 333 (listed); Linnnavuori, 1959: 279 (listed); Metcalf, 1967: 1308 (cat.); Hamilton, 1975b: 494 (in Platymetopiina).

Friscananus Ball, 1936a: 60. Type species, *Thamnotettix intricatus* Ball, 1911 (original designation). Evans, 1947: 233 (listed); Oman, 1949: 125 (syn.); Nielson, 1966: 333 (listed); Linnnavuori, 1959: 279 (listed); Metcalf, 1967: 1280 (cat.).

Friscanus DeLong & Caldwell, 1937: 48; Oman, 1949: 125 (error for *Friscananus* Ball).

Hypospadianus Ribaut, 1942: 264. Type species, *Thamnotettix torneelus* Zetterstedt, 1839 (original designation). Evans, 1947: 234 (listed); Oman, 1949: 125 (syn.);

- Metcalf, 1967: 1243 (cat.); Nielson, 1966: 333 (listed); Linnauori, 1959: 279 (listed).
- Sequoiatettix* Bliven, 1955: 3. Type species, *Colladonus eurekae* Bliven, 1955 (original designation). Nielson, 1966: 333 (syn.); Metcalf, 1967: 1312 (cat.)
- Coniferadonus* Bliven, 1955: 4. Type species, *Colladonus holmesi* Bliven, 1955 (original designation). Nielson, 1966: 333 (syn.).
- albocinctus* (DeLong)
- Idiodonus albocinctus* DeLong, 1946a: 22. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Deserto de Los Leones (OSUC). Metcalf, 1967: 1286 (cat.); DeLong, 1984a: 10 (key).
- Colladonus albocinctus*; Nielson, 1957: 51; Nielson, 1988: 106 (redesc., tax., distr.).
- Idiodonus nigridens* DeLong, 1946a: 29. Type locality: Mexico, Distrito Federal, La Guarda (OSUC). Metcalf, 1967: 1301 (cat.); DeLong, 1984a: 10 (key); Nielson, 1988: 106 (syn.).
- Colladonus nigridens*; Nielson, 1957: 51 (*incertae sedis*).
- Idiodonus sexpunctatus* DeLong, 1983b: 90. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Rio Frio (OSUC). DeLong, 1984a: 10 (key); Nielson, 1988: 106 (syn.).
- anademus* (DeLong)
- Idiodonus anademus* DeLong, 1946a: 29. Type locality: Mexico, Distrito Federal, La Guarda (OSUC). Metcalf, 1967: 1286 (cat.); DeLong, 1983b: 90 (tax.); DeLong, 1984a: 10 (key).
- Colladonus anademus*; Nielson, 1957: 51; Nielson, 1988: 125–126 (redesc., tax., distr.).
- beamери* (Ball)
- Idiodonus beamери* Ball, 1937: 28. Type locality: USA, Arizona, Chiricahua Mountains (NMNH). Distribution – USA, Mexico. DeLong & Caldwell, 1937: 46 (cat.); DeLong, 1946a: 17 (redesc., distr.).
- Colladonus beamери*; Oman, 1949: 125; Nielson, 1957: 45 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 1244; Nielson, 1988: 122–123 (redesc., tax., distr.).
- Idiodonus marginatus* DeLong, 1983b: 90. Type locality: Mexico, Hidalgo, Tulancingo (OSUC). DeLong, 1984a: 10 (key); Nielson, 1988: 122 (syn.).
- Idiodonus beamerellus* DeLong, 1983b: 92; DeLong, 1984a: 10 (key); Nielson, 1988: 122 (invalid replacement name for nonexistent species, *Idiodonus beamери*: DeLong, 1946a: 17 nec *Idiodonus beamери* Ball, 1937: 28).
- belli* (Uhler)
- Jassus bellи* Uhler, 1877: 471. Type locality: USA (NMNH). Distribution – USA, Mexico.
- Thamnotettix bellи*; Van Duzee, 1892a: 306; Nielson, 1957: 38 (listed).
- Colladonus bellи*; Ball, 1936a: 58; DeLong & Caldwell, 1937: 47 (cat.); Oman, 1949: 125 (distr., tax.); Nielson, 1957: 38 (redesc., tax.); Metcalf, 1967: 1245 (cat.); Nielson, 1988: 107 (redesc., tax., distr.).
- Idiodonus bellи*; Medler, 1942: 105; DeLong & Knull, 1945: 56 (cat.); Nielson, 1957: 38 (listed). Metcalf, 1967: 1245 (cat.).
- Thamnotettix gillettei* Van Duzee, 1892a: 306. Type locality: USA, Colorado (ISUI). Nielson, 1957: 38 (listed).
- Thamnotettix Gillettii* [sic] Van Duzee, 1892b: 267. Nielson, 1957: 38 (listed).
- Thamnotettix gillettei*; Van Duzee, 1894b: 303; Oman, 1949: 125 (syn.); Nielson, 1957: 38 (listed).
- Thamnotettix bellи* var. *Gillettei*; Van Duzee, 1917: 679; Nielson, 1957: 38 (listed).
- Colladonus bellи* var. *gillettei*; DeLong & Caldwell, 1937: 47; Oman, 1949: 125 (tax.).
- Idiodonus bellи* var. *gillettei*; DeLong & Knull, 1945: 56.

- Thamnotettix semipullanus* Van Duzee, 1892a: 306; Oman, 1949: 125 (syn.); Nielson, 1957: 38 (listed); Metcalf, 1967: 1245 (*nom. nud.*).
- Thamnotettix sonorae* Gillette & Baker, 1895: 100. Type locality: USA (Colorado A. & M. College). Oman, 1949: 125 (syn.); Nielson, 1957: 38 (listed); Nielson, 1988: 107 (listed).
- bicinctus* (DeLong)
- Idiodonus bicinctus* DeLong, 1946a: 18. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC). Metcalf, 1967: 1287 (cat.); DeLong, 1984a: 10 (key).
- Colladonus bicinctus*; Nielson, 1957: 51; Nielson, 1988: 113 (redesc., tax., distr.).
- clathrus* (DeLong)
- Idiodonus clathrus* DeLong, 1946a: 28. Type locality: Mexico, Distrito Federal, La Guardia (OSUC). Metcalf, 1967: 1288 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key).
- Colladonus clathrus*; Nielson, 1957: 51; Nielson, 1988: 120 (redesc., tax., distr.).
- Idiodonus turpiter* DeLong, 1946a: 28. Type locality: Mexico, Distrito Federal, La Guardia (OSUC). Metcalf, 1967: 1303 (cat.); DeLong, 1984a: 10 (key); Nielson, 1988: 120 (syn.).
- clastrus* (DeLong)
- Idiodonus clastrus* DeLong, 1946a: 18. Type locality: Mexico, Vera Cruz, Orizaba (OSUC). Metcalf, 1967: 1289 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key).
- Colladonus clastrus*; Nielson, 1957: 51; Nielson, 1988: 115 (redesc., tax., distr.).
- dampfi* (DeLong)
- Idiodonus dampfi* DeLong, 1946a: 20. Type locality: Mexico, Vera Cruz, Cordoba (OSUC). Distribution – Mexico, Costa Rica. Metcalf, 1967: 1297 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key).
- Colladonus dampfi*; Nielson, 1957: 51; Nielson, 1988: 112 (listed).
- fasciaticollis* (Stål)
- Jassus fasciaticollis* Stål, 1864: 86. Type locality: Mexico (NHMW). Distribution – USA, Mexico, Costa Rica.
- Thamnotettix fasciaticollis*; Van Duzee, 1892a: 306; DeLong, 1946a: 13 (note).
- Colladonus fasciaticollis*; DeLong & Caldwell, 1937: 47; Nielson, 1957: 37 (listed).
- Idiodonus tubulus* DeLong, 1946a: 22. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Chapingo (OSUC). Nielson, 1957: 37 (syn.); Metcalf, 1967: 1303 (cat.); DeLong, 1984a: 10 (key).
- Idiodonus diserus* DeLong, 1946a: 24. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Chapingo (OSUC). Nielson, 1957: 37 (syn.); Metcalf, 1967: 1297 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key); Nielson, 1988: 109 (listed).
- Idiodonus pravus* DeLong, 1946a: 24. Type locality: Mexico, Michoacan, Zitacuaro (OSUC). Metcalf, 1967: 1301 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key); Nielson, 1988: 109 (syn.).
- Idiodonus dampfi* DeLong, 1946a: 20. Type locality: Mexico, Bella Vista (OSUC).
- Colladonus dampfi*; Linnauvori, 1959: 280; Nielson, 1988: 109 (misdetermined specimens).
- incidus* (DeLong)
- Idiodonus incidus* DeLong, 1946a: 29. Type locality: Mexico, Distrito Federal (OSUC). Metcalf, 1967: 1299 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key).
- Colladonus incidus*; Nielson, 1988: 126.
- Idiodonus pallidus* DeLong, 1983b: 90; DeLong, 1984a: 10 (key); Nielson, 1988: 126 (syn.).
- montanus montanus* (Van Duzee)
- Thamnotettix montanus* Van Duzee, 1892b: 268. Localidadetipo: USA, British Columbia, Mountains of northwestern Colorado (ISU); Metcalf, 1967: 1264 (cat.).

- Thamnotettix clitellaria* Gillette & Baker, 1895: 96. Type locality: USA, Colorado. Nielson, 1957: 34 (listed); Nielson, 1966: 335 (listed).
- Colladonus montanus*; DeLong & Caldwell, 1937: 46; Severin & Klostermeyer, 1950: 550 (ill.); 558–560 (biol.).
- Colladonus montanus montanus*; Nielson, 1957: 34.
- Colladonus delongi* Linnauvori, 1959: 281. Type locality: Panama, Mobile (NMNH). Nielson, 1966: 335 (syn.).
- serratus* Nielson
- Colladonus serratus* Nielson, 1988: 108–109. Type locality: Mexico, 7 miles east Amecameca 9,300ft (NMNH).
- singularius* Nielson
- Colladonus singularius* Nielson, 1988: 119. Type locality: Mexico, Guanajuato, 10 mi south San Luis de La Paz (BYUC).
- tessellatus* Nielson
- Colladonus tessellatus* Nielson, 1988: 124. Type locality: Mexico, Distrito Federal, 5 mi west of Tlamacas, P. N. Ixtapopo (10,000ft) (BYUC).
- titulus* (DeLong)
- Idiodonus titulus* DeLong, 1946a: 24. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC). Metcalf, 1967: 1302 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key).
- Colladonus titulus*; Nielson, 1957: 51; Nielson, 1988: 117–118 (redesc., tax., distr.).
- Idiodonus goodi* DeLong, 1946a: 27. Type locality: Mexico, Distrito Federal, La Guardia (OSUC). Metcalf, 1967: 1298 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key); Nielson, 1988: 119 (syn.).
- tolucensis* Nielson
- Colladonus tolucensis* Nielson, 1988: 111–112. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Toluca road (OSUC).
- trabilis* Nielson
- Colladonus trabilis* Nielson, 1988: 119–120. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Desierto de los Leones (SNOW).
- ultimus* Nielson
- Colladonus ultimus* Nielson, 1988: 111. Type locality: Panama, Chiriquí, Bambito (NMNH). Distribution – Costa Rica, Guatemala, Panama, Colombia. Freytag & Sarkey, 2002: 266 (distr.).
- verecundus* (DeLong)
- Idiodonus verecundus* DeLong, 1946a: 20. Type locality: Mexico, Distrito Federal, La Guardia (OSUC). Metcalf, 1967: 1304 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key).
- Colladonus verecundus*; Nielson, 1957: 51.
- Idiodonus acus* DeLong, 1946a: 20. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Rio Frio (OSUC).
- Colladonus acus*; Nielson, 1957: 51.
- Idiodonus mexicanus* DeLong, 1946a: 27. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Los Leones (OSUC). Metcalf, 1967: 1300 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key); Nielson, 1988: 117 (syn).

Genus *Comayagua* Linnauvori & DeLong

- Type species, *Comayagua taeniata* Linnauvori & DeLong, 1978 (original designation). *Comayagua* Linnauvori & DeLong 1978c: 206; Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note); Oman *et al.*, 1990: 202 (cat.).
- taeniata* Linnauvori & DeLong
- Comayagua taeniata* Linnauvori & DeLong 1978c: 208. Type locality: Honduras, Comayagua Rancho Chiquita (OSUC).

Genus *Concepciona* Linnnavuori & DeLong

Type species, *Concepciona asper* Linnnavuori & DeLong, 1977 (original designation).
Concepciona Linnnavuori & DeLong, 1977b: 208; Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note);
 Oman et al., 1990: 202 (cat.).
asper Linnnavuori & DeLong
Concepciona asper Linnnavuori & DeLong, 1977b: 208. Type locality: Chile, Concepcion (OSUC).

Genus *Consepusa* Linnnavuori & DeLong

Type species, *Consepusa crassistylus* Linnnavuori & DeLong, 1977 (original designation).
Consepusa Linnnavuori & DeLong, 1977b: 205; Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note);
 Oman et al., 1990: 202 (cat.).
crassistylus Linnnavuori & DeLong
Consepusa crassistylus Linnnavuori & DeLong, 1977b: 206. Type locality: Chile, Maipu (OSUC).

Genus *Conversana* DeLong

Type species, *Conversana reversa* DeLong, 1967 (original designation).
Conversana DeLong, 1967b: 266; Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note); Oman et al., 1990: 202 (cat.).
angustata DeLong
Conversana angustata DeLong, 1967b: 268–269. Type locality: Mexico, Hacienda Santa Engracia (OSUC).
conversa DeLong
Conversana conversa DeLong, 1967b: 266–267. Type locality: Mexico, Pueblo, Atencingo (OSUC).
reversa DeLong
Conversana reversa DeLong, 1967b: 267. Type locality: Mexico, Hacienda Santa Engracia (OSUC).

Genus *Copididonous* Linnnavuori

Type species, *Jassus (Thamnotettix) hyalinipennis* Stål, 1862 (original designation).
Copididonous Linnnavuori, 1954b: 318; Linnnavuori, 1959: 247 (in Euscelini); Metcalf, 1967: 1332 (in Colladonini); Linnnavuori, 1975b: 10 (note); Zanol & Sakakibara, 1984: 11–21 (rev.); Oman et al., 1990: 202 (in Deltcephalini); Kamitani, 1999: 80 (in Paralimnini).
aliceae Zanol & Sakakibara
Copididonous aliceae Zanol & Sakakibara, 1990: 577. Type locality: Brazil, Paraná, Curitiba (DZUP).
alvarengai Zanol & Sakakibara
Copididonous alvarengai Zanol & Sakakibara, 1984: 19. Type locality: Brazil, Amazonas, Fonte Boa (DZUP). Distribution – Brazil, Ecuador, Peru.
brunneus Zanol & Sakakibara
Copididonous brunneus Zanol & Sakakibara, 1990: 578–579. Type locality: Colombia, Cundinamarca, Fina Bella Vista nr Sasaima (CASC).
fasciatus Zanol & Sakakibara
Copididonous fasciatus Zanol & Sakakibara, 1984: 16. Type locality: Brazil, Paraná, Curitiba (DZUP).
hyalinipennis (Stål)

Jassus hyalinipennis Stål, 1854: 255. Type locality: Brazil, Brasilia (SMNH). Distribution – Peru, Colombia, Venezuela, Brazil, Paraguay, Argentina.

J[assus] (Thamnotettix) hyalinipennis; Stål, 1862: 52.

Thamnotettix hyalinipennis; Berg, 1884b: 117; Osborn, 1923b: 64 (redesc.); Osborn, 1924: 423 (note, pl.LVIII Fig. 1).

Copididonous hyalinipennis; Linnauori, 1954b: 139; Linnauori, 1955: 100 (distr.); Linnauori, 1956: 9 (distr.); Metcalf, 1967: 1332 (cat.); Linnauori, 1975b: 10 (distr.); Cheng, 1980: 65 (distr.); Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.); Zanol & Sakakibara, 1984: 12–14 (redesc., ill., distr.); Linnauori, 1986: 153 (distr.); Lozada, 1992: 29 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).

maracaensis Zanol & Sakakibara

Copididonous maracaensis Zanol & Sakakibara, 1990: 578. Type locality: Brazil, Roraima, Ilha de Maraca, rio Uraricoera (INPA).

maxi Zanol & Sakakibara

Copididonous maxi Zanol & Sakakibara, 1984: 19. Type locality: Brazil, Parana, Londrina (DZUP).

ramonensis Linnauori

Copididonous ramonensis Linnauori, 1975b: 10. Type locality: Peru, San Ramon (AMNH). Lozada, 1992: 29 (distr.).

vittulatus (Berg)

Athysanus vittulatus Berg, 1884b: 116. Type locality: Uruguay (MLPA). Distribution – Colombia, Surinam, Brazil, Peru, Argentina, Uruguay. Metcalf, 1967: 381 (cat.).

Copididonous vittulatus; Linnauori, 1954b: 139; Linnauori, 1959: 250 (redesc., distr.); Linnauori & Heller 1961: 12 (distr.); Ruffinelli, 1970: 18 (distr.); Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.); Zanol & Sakakibara, 1984: 14–16 (redesc., ill., distr.); Lozada, 1992: 29 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).

Thamnotettix brasiliensis Osborn, 1923b: 65–66. Type locality: Brazil, Chapada (CMNH).

Linnauori, 1955: 100 (distr.); Linnauori, 1956: 9 (distr.).

Copididonous brasiliensis; Linnauori, 1954b: 139; Linnauori, 1959: 250 (syn.); Metcalf, 1967: 1332 (cat.).

Genus *Costamia* DeLong

Type species, *Costamia venosa* DeLong, 1946 (original designation).

Costamia DeLong, 1946c: 82; Metcalf, 1967: 2089 (in Scaphoideini); Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note); Oman *et al.*, 1990: 203 (cat.).

venosa DeLong

Costamia venosa DeLong, 1946c: 82. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

Genus *Cozadonus* DeLong & Harlan

Type species, *Cozadonus globosus* DeLong & Harlan, 1968 (original designation).

Cozadonus DeLong & Harlan, 1968: 150; Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note); Oman *et al.*, 1990: 203 (cat.).

globosus DeLong & Harlan

Cozadonus globosus DeLong & Harlan, 1968: 150. Type locality: Mexico, Guerrero, Mazaclan (OSUC).

serratus DeLong & Harlan

Cozadonus serratus DeLong & Harlan, 1968: 150. Type locality: Mexico, Michoacan, Carapan (OSUC).

Genus *Crassana* DeLong & Hershberger

Type species, *Eutettix goniana* Ball, 1931 (original designation).

Crassana DeLong & Hershberger, 1947c: 76; Oman, 1949: 137 (redesc.); Metcalf, 1967: 465 (cat.). Hamilton, 1975b: 494 (in Platymetopiina); Oman *et al.*, 1990: 203 (cat.).

Crassana (Crassana) DeLong & Hershberger

goniana (Ball)

Eutettix goniana Ball, 1931a:1. Type locality: USA, Arizona, Patagonia (NMNH). Distribution – USA, Mexico. DeLong & Caldwell, 1937: 39 (cat.); DeLong & Knoll, 1945: 49 (cat.).

Crassana goniana; DeLong & Hershberger, 1947c: 76; Oman, 1949: 137 (distr.); Metcalf, 1967: 465 (cat.). Blocker & Larsen, 1991: 123 (distr.), 124 (key).

Crassana (Macrasana) DeLong & Hershberger

Type species, *Crassana marginella* DeLong & Hershberger, 1947 (original designation).

Crassana (Macrasana) DeLong & Hershberger, 1947c: 78; Metcalf, 1967: 466 (cat.). Oman *et al.*, 1990: 203 (cat.).

marginella DeLong & Hershberger

Crassana (Macrasana) marginella DeLong & Hershberger, 1947c: 78. Type locality: Mexico, Guerrero, Chilpancingo (OSUC). Metcalf, 1967: 466 (cat.); Blocker & Larsen, 1991: 123 (distr.), 124 (key).

Genus *Dampfiana* DeLong & Hershberger

Type species, *Dampfiana deserta* DeLong & Hershberger, 1948 (original designation).

Dampfiana DeLong & Hershberger, 1948b: 229; Metcalf, 1967: 503 (cat.); Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note); Oman *et al.*, 1990: 204 (cat.).

deserta DeLong & Hershberger

Dampfiana deserta DeLong & Hershberger, 1948b: 229–230. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

Genus *Dariena* Linnauvori & DeLong

Type species, *Dariena amabilis* Linnauvori & DeLong, 1977 (original designation).

Dariena Linnauvori & DeLong, 1977a: 561–562; Cwikla & Blocker, 1981: 173 (note); Oman *et al.*, 1990: 204 (cat.).

amabilis Linnauvori & DeLong

Dariena amabilis Linnauvori & DeLong, 1977a: 563. Type locality: Panama, Darien, Santa Fe (OSUC).

Genus *Desertana* DeLong & Martinson

Type species, *Desertana arida* DeLong & Martinson, 1973 (original designation).

Desertana DeLong & Martinson, 1973b: 125; Linnauvori & DeLong, 1977b: 201 (redesc.); Cwikla & Blocker, 1981: 174 (note); Oman *et al.*, 1990: 205 (cat.).

arida DeLong & Martinson

Desertana arida DeLong & Martinson, 1973b: 127. Type locality: Chile, Ovalle, 28 Km SW Coquimbo (OSUC).

martinsonae Linnauvori & DeLong

Desertana martinsonae Linnauvori & DeLong, 1977b: 202. Type locality: Chile, S. Pedro (OSUC).

renanca Linnauvori & DeLong

Desertana renanca Linnauvori & DeLong, 1977b: 202. Type locality: Chile, Santiago, Ranca (OSUC).

roblesana Linnauvori & DeLong

Desertana roblesana Linnnavuori & DeLong, 1977b: 202. Type locality: Chile, Santiago, Cerro Robles (OSUC).

sicca DeLong & Martinson

Desertana sicca DeLong & Martinson, 1973b: 127. Type locality: Chile, Valparaiso (OSUC).

Genus *Devolana* DeLong

Type species, *Devolana hemicycla* DeLong, 1967 (original designation).

Devolana DeLong, 1967a: 22; Cwikla & Blocker 1981: 174 (note); Oman et al., 1990: 205 (cat.).

hemicycla DeLong

Devolana hemicycla DeLong, 1967a: 23. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

Genus *Dolyobius* Linnnavuori

Type species, *Dolyobius lingulatus* Linnnavuori, 1959 (original designation).

Dolyobius Linnnavuori, 1959: 282; Oman et al., 1990: 206 (cat.); Zanol, 2004c: 163 (note, redesc.).

distinctus Linnnavuori

Dolyobius distinctus Linnnavuori, 1959: 282–283. Type locality: Paraguay, Toldo Cue (AMNH). Distribution – Brazil, Paraguay. Zanol, 2004c: 164 (desc. male; distr.)

lingulatus Linnnavuori

Dolyobius lingulatus Linnnavuori, 1959: 282. Type locality: Ecuador, Baños (AMNH).

Genus *Eusceloidea* Osborn

Type species, *Eusceloidea nitida* Osborn, 1923 (original designation).

Eusceloidia Osborn, 1923b: 46; Oman, 1936: 384 (redesc.); Metcalf, 1967: 101 (in Euscelini); Oman et al., 1990: 212 (cat.); Kamitani, 1999: 70 (in Deltcephalini).

delongi (Zanol)

Frequenamia delongi; Zanol, 1996b: 813 (nom. nov. pro *Frequenamia atrata* DeLong, 1982a, non Linnnavuori & DeLong, 1978a). Type locality: Panama, Canal Zone, Barro Colorado (OSUC).

Eusceloidia delongi; Zanol, 2004a: 581.

nitida Osborn

Eusceloidia nitida Osborn, 1923b: 46–47. Type locality: Bolivia, Las juntas (CMNH). Metcalf, 1967: 102 (cat.).

v-nigrum Linnnavuori

Eusceloidia v-nigrum Linnnavuori, 1954a: 62–63. Type locality: Argentina, Tocuman, La Higuera Choromoro (AMNH). Metcalf, 1967: 381 (cat.).

Genus *Eutettix* Van Duzee

Type species, *Thamnotettix lurida* Van Duzee, 1890 (original designation).

Eutettix Van Duzee, 1892a: 307; Evans, 1947: 233 (listed); Oman, 1949: 136 (redesc.); Metcalf, 1967: 466 (cat.); Hamilton, 1975b: 494 (in Platymetopiina); Oman et al., 1990: 212 (cat.).

Eutettix (Guadlera) DeLong

Type species, *Eutettix discapa* DeLong, 1980 (original designation).

Eutettix [sic] (*Guadlera*) DeLong, 1980: 65. Oman et al., 1990: 215 (cat.).
copula DeLong

Eutettix (Guadlera) copula DeLong, 1980: 65–66. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC).

discapa DeLong

Eutettix (Guadlera) discapa DeLong, 1980: 65. Type locality: Mexico, Guadalajara (OSUC).

placida DeLong

Eutettix (Guadlera) placida DeLong, 1980: 65. Type locality: Mexico, Michoacan, Carapan (OSUC).

Genus *Excavanus* DeLong

Type species, *Excavanus angustus* DeLong, 1946 (original designation).

Excavanus DeLong, 1946b: 446; Cwikla & Blocker 1981: 174 (note); Metcalf, 1967: 2177 (in Scaphoideini); Oman *et al.*, 1990: 212 (cat.).

angustus DeLong

Excavanus angustus DeLong, 1946b: 446. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 2177 (cat.).

Genus *Excultanus* Oman

Type species, *Jassus excultus* Uhler, 1887 (original designation).

Texananus (*Excultanus*) Oman, 1949: 142; Crowder, 1952: 358 (note, key); Metcalf, 1967: 698 (cat.).

Excultanus; Linnavuori, 1959: 197; Hamilton, 1975b: 494 (in Platymetopiina); Oman *et al.*, 1990: 213 (cat.); McKamey, 2000: 214 (note, tax.); McKamey, 2003a: 292 (rev.).

conus (DeLong)

Texananus conus DeLong, 1939a: 386. Type locality: Mexico, Chiapas, Santa Lucia (OSUC). Distribution – Mexico, Nicaragua. DeLong, 1944b: 234 (note); Metcalf, 1967: 698 (cat.); Freytag & Maes, 1997: 38; Maes *et al.*, 1999: 26 (distr.).

Texananus (*Excultanus*) *conus*; Oman, 1949: 142.

Excultanus conus; McKamey, 2000: 214; McKamey, 2003a: 296 (tax., distr.).

dorothyae (DeLong)

Texananus dorothyi [sic] DeLong, 1939a: 387. Type locality: USA, Arizona, Wickenburg (OSUC). Distribution – USA, Mexico. DeLong, 1944b: 234 (distr.); Crowder, 1952: 359 (redesc., distr.).

Texananus (*Texananus*) *dorothyae*; DeLong & Hershberger, 1949: 176.

Texananus (*Excultanus*) *dorothyae*; Oman, 1949: 142; Metcalf, 1967: 699 (cat.).

Texananus (*Excultanus*) *dorothyi*; Crowder, 1952: 360.

Excultanus dorothyae; McKamey, 2000: 214; McKamey, 2003a: 296 (tax., distr., note). *eugeneus* (Ball)

Phlepsius (*Texananus*) *eugeneus* Ball, 1918: 384. Type locality: Mexico, Guerrero, Acuguizotla (NMNH). Distribution – Mexico, Costa Rica. Osborn & Lathrop, 1923: 338 (redesc.).

Phlepsius eugeneus; Osborn & Lathrop, 1923: 315 (key).

Texananus eugeneus; DeLong & Caldwell, 1937: 43; DeLong, 1939a: 394 (distr.); DeLong, 1944b: 234 (distr.); Metcalf, 1967: 699 (cat.).

Texananus (*Excultanus*) *eugeneus*; Oman, 1949: 142.

Excultanus eugeneus; McKamey, 2000: 214; McKamey, 2003a: 296–297 (tax., distr., note).

excultus (Uhler)

- Jassus excultus* Uhler, 1877: 467. Type locality: USA (NMNH). Distribution – USA, El Salvador, Mexico, Belize, Nicaragua, Guatemala, Bahamas, Colombia, Argentina.
- Phlepsius excultus*; Southwick, 1892: 288.
- Phlepsius (Texananus) excultus*; Ball, 1918: 386; Osborn & Lathrop, 1923: 339 (redesc., ill., distr.).
- Phlepsius argillaceus* Van Duzee, 1923: 185. Type locality: Mexico, Chiapas, Santa Lucia (CASC). McKamey, 2003a: 297 (syn.).
- Texananus agrillaceus*; DeLong & Caldwell, 1937: 43.
- Texananus argillaceus*; Metcalf, 1967: 698.
- Texananus excultus*; DeLong & Caldwell, 1937: 43; DeLong, 1939a: 394 (distr.); DeLong, 1944b: 234 (distr.); Metcalf, 1967: 699 (cat.).
- Texananus (Texananus) excultus*; DeLong & Hershberger, 1949: 176.
- Texananus (Excultanus) agrillaceus* [sic] Oman, 1949: 142.
- Texananus (Excultanus) excultus*; Oman, 1949: 142; Crowder, 1952: 360 (redesc., distr.).
- Excultanus excultus*; Linnauvori, 1959: 198; McKamey, 2003a: 297 (tax., distr., note).
- Excultanus agrillaceus* [sic] McKamey, 2000: 214.
- hebraeus* (Ball)
- Phlepsius (Iowanus) hebraeus* Ball, 1918: 383. Type locality: Mexico, Guerrero, Amula (NMNH). Distribution – Mexico, Guatemala. Osborn & Lathrop, 1923: 348 (redesc., tax.).
- Texananus hebraeus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939a: 391 (redesc., distr.); DeLong, 1944b: 239 (distr.); Metcalf, 1967: 674 (cat.).
- Iowanus hebraeus*; DeLong & Hershberger, 1948a: 115.
- Excultanus hebraeus*; Linnauvori, 1959: 198; McKamey, 2003a: 297 (tax., distr., note).
- horridus* (DeLong)
- Texananus horridus* DeLong, 1944b: 234. Type locality: Mexico, Guerrero, Acapulco (OSUC). Metcalf, 1967: 661 (cat.).
- Excultanus horridus*; McKamey, 2000: 214; McKamey, 2003a: 297 (tax., distr.).
- incurvatus* (Osborn & Lathrop)
- Phlepsius (Iowanus) incurvatus* Osborn & Lathrop, 1923: 346. Type locality: USA (CASC). Distribution – USA, Mexico.
- Texananus incurvatus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939a: 388 (note, distr.); DeLong, 1944b: 235 (distr.); DeLong & Knull, 1945: 52; DeLong & Severin, 1950: 541–543 (redesc., distr.); Severin, 1950: 6–47 (biol.), 550 (ill.); Metcalf, 1967: 703 (cat.).
- Texananus (Texananus) incurvatus*; DeLong & Hershberger, 1949: 178.
- Texananus (Excultanus) incurvatus*; Oman, 1949: 142; Crowder, 1952: 361 (redesc., distr.).
- Excultanus incurvatus*; Nielson, 1968: 285; McKamey, 2003a: 298 (tax., distr., note).
- neomexicanus* (Baker)
- Phlepsius neomexicanus* Baker, 1895: 13. Type locality: USA, San Agustine (NMNH). Distribution – USA, Mexico. Van Duzee, 1916: 73 (listed); Van Duzee, 1917: 668 (cat.); Osborn & Lathrop, 1923: 346 (note).
- Phlepsius (Iowanus) neomexicanus*; Osborn & Lathrop, 1923: 346.
- Phlepsius (Texananus) neomexicanus*; Ball, 1931c: 85; Osborn & Lathrop, 1923: 346 (redesc., distr.).
- Texananus neomexicanus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong & Knull, 1945: 52 (cat.).
- Texananus (Texananus) neomexicanus*; DeLong & Hershberger, 1949: 176.

Texananus (Excultanus) neomexicanus; Oman, 1949: 142; Crowder, 1952: 362 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 704 (cat.).
Excultanus neomexicanus; McKamey, 2000: 214; McKamey, 2003a: 298 (tax., distr.).
paraconus McKamey
Excultanus paraconus McKamey, 2003a: 294–295. Type locality: Costa Rica, Puntarenas, Puntarenas (NMNH).
paralus (DeLong)
Texananus paralus DeLong, 1939a: 385–386. Type locality: Mexico, Guerrero, Zinicuaro (OSUC). DeLong, 1944b: 233 (note, distr.).
Texananus (Excutanus) paralus; Oman, 1949: 142; Metcalf, 1967: 705 (cat.).
Excutanus paralus; McKamey, 2000: 214; McKamey, 2003a: 298 (tax., distr.).
parrai (DeLong)
Phlepsius parrai DeLong, 1939a: 382. Type locality: Mexico, Guerrero, Jetla (OSUC).
Texananus parrai; DeLong, 1944b: 234; Metcalf, 1967: 662 (cat.).
Excutanus parrai; McKamey, 2000: 214; McKamey, 2003a: 298 (tax., distr.).
plummeri (DeLong)
Texananus plummeri DeLong, 1939a: 385. Type locality: Mexico, Nayarit, Ruiz (OSUC). DeLong, 1944b: 233 (note, distr.); Metcalf, 1967: 662 (cat.).
Texananus cassus DeLong, 1939a: 385. Type locality: Mexico, Chiapas, Santa Lucia (OSUC). DeLong, 1944b: 233 (syn.).
Excutanus plummeri; McKamey, 2000: 214; McKamey, 2003a: 298 (tax., distr.).

Genus *Exitianus* Ball

Type species, *Cicadula exitiosa* Uhler, 1880 (original designation).
Exitianus Ball, 1929: 5; Oman, 1936: 382 (redesc., tax. note); DeLong & Caldwell, 1937: 36 (cat.); DeLong & Hershberger, 1947b: 107–116 (rev.); Evans, 1947: 233 (listed); Oman, 1949: 153 (redesc., tax.); Caldwell & Martorell, 1952: 68 (note); Linnauvori, 1959: 313–315 (redesc., key); Emeljanov, 1966: 609 (in Stirellini); Metcalf, 1967: 308 (in Euscelini); Ross, 1968: 1–30 (rev.); Nast, 1972: 356 (cat.); Hamilton, 1975b: 483 (in Doraturina); Linnauvori & DeLong, 1977b: 198 (in Stirellini); Oman et al., 1990: 213 (cat.).
Mimodrylix Zachvatkin, 1935: 108. Type species, *Athysanus capicola* Stål, 1855 (monotypy). Evans, 1947: 235 (syn.); Oman, 1949: 153 (syn.); Linnauvori, 1959: 313 (listed); Metcalf, 1967: 308 (cat.).
abruptus DeLong & Hershberger
Exitianus abruptus DeLong & Hershberger, 1947b: 110, 112. Type locality: Mexico, Morelos, Jiutepec (OSUC). Metcalf, 1967: 310 (cat.).
angulatus DeLong & Hershberger
Exitianus angulatus DeLong & Hershberger, 1947b: 113–114. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC). Metcalf, 1967: 311 (cat.).
atratus Linnauvori
Exitianus atratus Linnauvori, 1959: 315–316. Type locality: Colombia, Magdalena, Aracataca (HNHM). Distribution – Costa Rica, Nicaragua, Panama, Colombia, Venezuela. Linnauvori, 1973a: 9 (distr.); Linnauvori, 1986: 154 (distr.); Maes & Godoy, 1993: 28 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).
brevis DeLong & Hershberger
Exitianus brevis DeLong & Hershberger, 1947b: 114. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC). Metcalf, 1967: 311 (cat.).
brunneopictus Zanol

- Exitianus brunneopictus* Zanol, 1987: 136. Type locality: Mexico, Jalisco, Guadalajara (CASC).
- capicola* (Stål)
Athysanus capicola Stål, 1855: 89. Type locality: África (SMNH). Distribution – Africa, Asia, Europe, Argentina.
- Exitianus capicola*; Oman, 1936: 382; Linnauori, 1959: 319 (redesc., distr.); Nast, 1972: 356 (tax., distr.).
- Euscelis transversus* Metcalf, 1946: 122–123. Type locality: Guam, Piti (HSPH).
Linnauori, 1959: 319 (syn.).
- excavatus* DeLong & Hershberger
Exitianus excavatus DeLong & Hershberger, 1947b: 110. Type locality: Mexico, Guerrero, Taxca (OSUC). Metcalf, 1967: 314 (cat.).
- exitiosus* (Uhler)
Cicadula exitiosus Uhler, 1880: 72. Distribution – USA, Mexico, Costa Rica, Belize, Cuba, Nicaragua, Bahamas, Bermudas, Jamaica, Puerto Rico, Virgins Isl., Vieques Isl., Saint-Thomas, Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante.
- Athysanus exitiosus*; Van Duzee, 1907: 68; Ball, 1929: 5 (= *obscurinervis*).
Euscelis exitiosus; Van Duzee, 1923: 183.
Cicadula exitiosa; Oman, 1936: 382 (= *obscurinervis*).
Exitianus exitiosus; Osborn & Ball, 1902: 234; DeLong & Hershberger, 1947b: 112 (redesc.); Oman, 1949: 153 (distr.); Caldwell & Martorell, 1952: 69–70 (redesc., distr.); Metcalf, 1954: 24–25 (redesc., distr.); Linnauori, 1956: 10 (distr.); Metcalf, 1967: 314 (cat.); Bonfils & Delplaqué, 1971: 143 (distr.); Maes & Godoy, 1993: 28 (distr.); Hidalgo-Gato & Rodrígues-León, 2000: 56 (distr.).
- Euscelis pallida* Osborn, 1926a: 348. Type locality: Cuba, Camaguay (NMNH).
Linnauori, 1959: 315 (syn.).
Exitianus pallidus; Oman, 1936: 382; Linnauori, 1956: 10 (distr.).
- exitiosus angustatus* DeLong & Hershberger
Exitianus exitiosus var. *angustatus* DeLong & Hershberger, 1947b: 113. Type locality: Mexico, Santa Engracia (OSUC). Metcalf, 1967: 321 (cat.).
- exitiosus pallidens* DeLong & Hershberger
Exitianus exitiosus var. *pallidens* DeLong & Hershberger, 1947b: 113. Type locality: Mexico, San Luis Potosí, Valles (OSUC). Metcalf, 1967: 321 (cat.).
- fasciolatus* (Melichar)
Athysanus fasciolatus Melichar, 1911: 107. Type locality: Mont Nyro (ZSCM). Distribution – Africa, Ecuador (Galapagos Isl.), Chile.
- Exitianus fasciolatus*; Oman, 1936: 382; Nast, 1972: 356 (tax., distr.).
- Athysanus digressus* Van Duzee, 1933: 32. Type locality: Chatham Island (CASC). Metcalf, 1967: 361 (cat.).
- Exitianus digressus*; Oman, 1936: 382; DeLong & Caldwell, 1937: 36 (cat.); DeLong & Hershberger, 1947b: 115 (redesc.); Linnauori, 1959: 316 (redesc.); Metcalf, 1967: 314 (cat.); Linnauori & DeLong, 1979b: 192 (syn.).
- luctuosus* (Stål)
Thamnotettix luctuosus Stål, 1859: 292. Type locality: Ecuador, Puna (SMNH). Distribution – Ecuador, Chile.
- Exitianus luctuosus*; Linnauori, 1959: 316; Linnauori & DeLong, 1977b: 198 (distr.).
- nigrens* DeLong & Hershberger
Exitianus nigrens DeLong & Hershberger, 1947b: 115–116. Type locality: Mexico, Cordoba, Vera Cruz (OSUC). Metcalf, 1967: 324 (cat.).
- obscurinervis* (Stål)

- Jassus (Thamnotettix) obscurinervis* Stål, 1859: 293. Type locality: Brazil, Rio de Janeiro (SMNH). Distribution – America Central, Cuba, Puerto Rico, Barbados, Brazil, Peru, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay.
- Athy sanus obscurinervis*; Berg 1879: 261.
- Euscelis obscurinervis*; Osborn, 1924: 412
- Exitianus obscurinervis*; Ball, 1929: 5; Oman, 1936: 382 (note); DeLong & Caldwell, 1937: 36 (cat.); Linnauori, 1954b: 141 (note, distr.); DeLong & Hershberger, 1947b: 112 (note); Linnauori, 1955: 101 (distr.); Linnauori, 1956: 10 (distr.); Linnauori, 1959: 318 (redesc.); Metcalf, 1967: 325 (cat.); Ruffinelli, 1970: 18 (distr.); Linnauori & DeLong, 1977b: 198 (distr.); Cheng, 1980: 65 (distr.); Lozada, 1992: 29 (distr.); Zanol & Menzes, 1982: 39 (distr.).
- Thamnotettix bergrothi* Jensen-Haarup, 1922: 15–16. Type locality: Argentina, Mendoza, Sta Rosa (col Jensen-Haarup). Linnauori, 1956: 10 (syn); Metcalf, 1967: 736 (cat.).
- obscurinervis nigellus* Linnauori
- Exitianus obscurinervis* f. *nigellus* Linnauori, 1959: 319. Type locality: Argentina, Salta, La Caldera (MLPA).
- picatus* (Gibson)
- Athy sanus picatus* Gibson, 1919: 26. Type locality: Honduras, Tegucigalpa (NMNH). Distribution – USA, Mexico, Haiti. Ball, 1929: 5 (= *obscurinervis*).
- Exitianus picatus*; Oman, 1936: 382; DeLong & Caldwell, 1937: 36 (cat.); Oman, 1947a: 60 (note); DeLong & Hershberger, 1947b: 108 (redesc., distr.); Oman, 1949: 153 (listed); Metcalf, 1967: 330 (cat.).
- Athy sanus minaturatus* Gibson, 1919: 26. Type locality: Honduras, Tegucigalpa (NMNH). Ball, 1929: 5 (= *obscurinervis*); Oman, 1936: 382 (syn).
- quadratulus* (Osborn)
- Euscelis quadratula* Osborn, 1923b: 44–45. Type locality: Brazil, Boqueirao, Rio Grande (CMNH). Distribution – Colombia, Brazil, Peru, Bolivia.
- Exitianus quadratulus*; Oman, 1936: 382; Linnauori, 1959: 318 (redesc.); Metcalf, 1967: 331 (cat.); Linnauori & DeLong, 1976: 37 (ill.); Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.); Lozada, 1992: 29 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).
- spinosus* Zanol
- Exitianus spinosus* Zanol, 1987: 134. Type locality: El Salvador, Usulutan (CASC).
- tricolor* DeLong & Hershberger
- Exitianus tricolor* DeLong & Hershberger, 1947b: 115. Type locality: Mexico, Guerrero, Buena Vista (OSUC). Distribution – Mexico, Guatemala. Linnauori, 1959: 317 (redesc.); Metcalf, 1967: 334 (cat.).

Genus *Faltala* Oman

- Type species, *Faltala brachyptera* Oman, 1936 (original designation).
- Faltala* Oman, 1936: 385; Evans, 1947: 233 (listed); Linnauori, 1959: 159 (redesc.); Metcalf, 1967: 1606 (in Colladonini); Oman *et al.*, 1990: 213 (cat.); Zahniser & Webb, 2004: 669 (key).
- brachyptera* Oman
- Faltala brachyptera* Oman, 1936: 385. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (NMNH). Linnauori, 1959: 160 (redesc.); Metcalf, 1967: 1606 (cat.).
- furcipennis* Cheng
- Faltala furcipennis* Cheng, 1980: 100. Type locality: Paraguay, N Cnel Bogado (SNOW).

Genus *Frequenamia* DeLong

- Type species, *Frequenamia guerrera* DeLong, 1947 (original designation).
Frequenamia DeLong, 1947a: 63; Metcalf, 1967: 2088 (in Scaphoideini); Kramer & DeLong, 1968: 115 (tax.); Linnnavuori & DeLong, 1978a: 115; 229 (redesc., tax.); DeLong, 1984b: 118 (tax.); Cwikla & Blocker, 1981: 174 (note); Oman *et al.*, 1990: 213 (cat.); Zanol, 2003b: 9–67 (rev.).
- Bahita (Penebahita)* Linnnavuori, 1959: 166–167. Type species, *Deltoccephalus venosulus* Berg, 1879 (original designation). Linnnavuori & DeLong, 1978a: 115 (syn.); Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.); Oman *et al.*, 1990: 213 (cat.).
- Bahita (Exobahita)* Linnnavuori, 1959: 174. Type species, *Bahita fallaciosa* Linnnavuori, 1955 (original designation). Linnnavuori & DeLong, 1978a: 115 (syn.); Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.); Oman *et al.*, 1990: 213 (cat.); Cavichioli & Zanol, 1991: 59 (distr.).
- ambrosia* Zanol
Frequenamia ambrosia Zanol, 2003b: 25. Type locality: Brazil, Parana, Curitiba (DZUP).
- apiculata* Zanol
Frequenamia apiculata Zanol, 2003b: 27. Type locality: Brazil, Rondonia, Ouro Preto do Oeste (INPA).
- armata* (Linnnavuori)
Bahita (Penibahita) armata Linnnavuori, 1959: 169. Type locality: Argentina, Misiones, San Ignacio (MLPA). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina. Cheng, 1980: 65 (distr.).
- Frequenamia armata*; Linnavuori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 11 (redesc., distr.).
- aureola* Zanol
Frequenamia aureola Zanol, 2003b: 22–23. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP). Distribution – Brazil, Peru, Paraguay.
- Phlepsioides clypeatus* Osborn, 1923b: 62–63 (*partim*).
Bahita clypeata sensu Linnnavuori, 1959: 172–173
- baiana* Zanol
Frequenamia baiana Zanol, 2003b: 32–33. Type locality: Brazil, Bahia, Encruzilhada (DZUP)
- bicuspidata* Zanol
Frequenamia bicuspidata Zanol, 2003b: 26. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Belo Horizonte (DZUP).
- bifida* Zanol
Frequenamia bifida Zanol, 2003b: 35–36. Type locality: Brazil, Bahia, Encruzilhada (DZUP).
- blandita* Zanol
Frequenamia blandita Zanol, 2003b: 38. Type locality: Brazil, Bahia, Encruzilhada (DZUP).
- capixaba* Zanol
Frequenamia capixaba Zanol, 2003b: 31–32. Type locality: Brazil, Espírito Santo, Linhares
- cavifrons* (Linnnavuori)
Bahita cavifrons Linnnavuori, 1955: 116–117. Type locality: Brazil, Espírito Santo (HNHM). Metcalf, 1967: 543 (cat.).
- Bahita (Penibahita) cavifrons*; Linnnavuori, 1959: 174; Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).
- Frequenamia cavifrons*; Linnnavuori & DeLong, 1978a: 119; Zanol, 2003b: 12 (distr.).
- chapadensis* (Linnnavuori)

- Bahita (Penibahita) chapadensis* Linnauori, 1959: 169. Type locality: Brazil, Chapada (NMNH). Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).
Frequenamia chapadensis; Linnauori & DeLong, 1978a: 116.
cirrofasciata (Cheng)
Bahita cirrofasciata Cheng, 1980: 93. Type locality: Paraguay, nr Philadelphia (SNOW).
Frequenamia cirrofasciata; Zanol: 2003b: 12.
clypeata (Osborn)
Phlepsius clypeatus Osborn, 1923b: 62-63. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Distribution - Brazil, Bolivia, Paraguay. Metcalf, 1967: 557 (cat.).
Bahita (Penibahita) clypeata; Linnauori, 1959: 172-173; Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).
Frequenamia clypeata; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 12-13 (tax., note, distr.).
Bahita fallaciosa Linnauori, 1955: 118. Type locality: Brazil, Rio Grande (HNHM). Metcalf, 1967: 544 (cat.); Zanol, 2003b: 12 (syn.).
Bahita (Exobahita) fallaciosa; Linnauori, 1959: 175; Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).
Frequenamia fallaciosa; Linnauori & DeLong, 1978a: 116.
confusa (Linnauori)
Bahita confusa Linnauori, 1955: 115. Type locality: Paraguay, Asuncion (HNHM). Distribution - Brazil, Paraguay. Metcalf, 1967: 544 (cat.).
Bahita (Penebahita) confusa; Linnauori, 1959: 170.
Frequenamia confusa; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 13-14 (distr.).
crassistylus Linnauori
Bahita (Exobahita) crassistylus Linnauori, 1959: 176. Type locality: Colombia, Mamatoco (HNHM).
Frequenamia crassistylus; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Freytag & Sharkey, 2002: 266 (distr.).
elegantiae Zanol
Frequenamia elegantiae Zanol, 2003b: 34-35. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Belo Horizonte (DZUP).
estebana Linnauori & DeLong
Frequenamia estebana Linnauori & DeLong, 1978a: 117. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49 km N. Sta. Cruz (OSUC). Distribution - Brazil, Bolivia, Paraguay. Zanol, 2003b: 14 (distr.).
festiva Zanol
Frequenamia festiva Zanol, 2003b: 30-31. Type locality: Brazil, Parana, Morretes (DZUP).
fulvula (Osborn)
Eutettix fulvulus Osborn, 1923b: 56. Type locality: Brazil, Bahia (CMNH). Metcalf, 1967: 544 (cat.).
Bahita fulvula; Linnauori, 1955: 117.
Bahita (Exobahita) fulvula; Linnauori, 1959: 175; Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).
Frequenamia fulvula; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 14-15 (distr., note).
fumiae Zanol
Frequenamia fumiae Zanol, 2003b: 33-34. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Sao Goncalo Rio Abaixo (DZUP).
guerrera DeLong

- Frequenamia guerrera* DeLong, 1947a: 63–64. Type locality: Mexico, Pandancuarco (OSUC). Metcalf, 1967: 2088 (cat.); Zanol, 2003b: 15 (distr.).
- hasemani* (Osborn)
- Phlepsius hasemani* Osborn, 1923b: 58–59. Type locality: Brazil, Rondonia, along rio Guapore, below rio S. Miguel (CMNH). Metcalf, 1967: 599 (cat.). Oman, 1936: 377 (listed)
- Bahita (Penebahita) hasemani*; Linnauori, 1959: 173; Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.); Cavichioli & Zanol, 1991: 59 (distr.).
- Frequenamia hasemani*; Linnauori & DeLong, 1978a: 117; Zanol, 2003b: 15 (redesc., distr.).
- incus* Zanol
- Frequenamia incus* Zanol, 2003b: 27–28. Type locality: Brazil, Rondonia, Ouro Preto do Oeste (INPA).
- inhabilis* (Linnauori)
- Bahita inhabilis* Linnauori, 1959: 172. Type locality: Paraguay, Picada Isabella, Villa Concepcion (ZMUH). Distribution – Paraguay, Argentina.
- Frequenamia inhabilis*; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 16 (distr., note).
- jucunda* Zanol
- Frequenamia jucunda* Zanol, 2003b: 23–24. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Sao Goncalo Rio Abaixo (DZUP).
- lacerdae* (Signoret)
- Phl[epsius] lacerdae* Signoret, 1879: 69. Type locality: Brazil, Bahia (MRSN). Metcalf, 1967: 563 (cat.).
- Bahita (Penebahita) lacerdae*; Linnauori, 1959: 170; Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.); *Phlepsius signatus* Osborn, 1923b: 63–64. Type locality: Brazil, Bahia, Barra (CMNH). Linnauori, 1959: 170 (syn.); Metcalf, 1967: 567 (cat.).
- Frequenamia lacerdae*; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 16–17 (distr.).
- litorea* Zanol
- Frequenamia litorea* Zanol, 2003b: 29–30. Type locality: Brazil, Parana, Morretes (DZUP).
- loricata* (Osborn)
- Phlepsius loricatus* Osborn, 1923b: 60–61. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH) Distribution – Brazil, Bolivia. Metcalf, 1967: 563 (cat.).
- Bahita (Penibahita) loricata*; Linnauori, 1959: 171.
- Frequenamia loricata*; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 17 (distr.).
- nordestina* Zanol
- Frequenamia nordestina* Zanol, 2003b: 36–37. Type locality: Brazil, Sergipe, Caninde do Sao Francisco (DZUP).
- pasoensis* (Linnauori & Heller)
- Bahita (Exobahita) pasoensis* Linnauori & Heller, 1961: 8. Type locality: Paraguay, Paso Yobayi (SMNS). Distribution – Brazil, Paraguay.
- Frequenamia pasoensis*; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 17–18 (tax., redesc., distr.).
- Frequenamia atrata* Linnauori & DeLong, 1978a: 118–119. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Itu, Faz. Pau d’Alho (OSUC). Zanol, 2003b: 17 (syn.).
- plena* (Van Duzee)
- Aligia plena* Van Duzee, 1933: 37. Type locality: Costa Rica (CASC).
- Bahita plena*; Oman, 1936: 380; Metcalf, 1967: 545 (cat.).
- Bahita (Bahita) plena*; Linnauori, 1959: 166.

- Frequenamia plena*; Linnauori & DeLong, 1978a: 229; Zanol, 2003b: 18 (distr.)
pulchra Kramer & DeLong
Frequenamia pulchra Kramer & DeLong, 1968. Type locality: Mexico, Chiapas, Chiapa de Corza (OSUC). Distribution – Mexico, Nicaragua. Zanol, 2003b: 18 (distr.).
quimilica (Linnauori)
Bahita (Penebahita) quimilica Linnauori, 1959: 171–172. Type locality: Argentina, S. del Estero, Quimili (MLPA). Distribution – Paraguay, Argentina.
Frequenamia quimilica; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 18–19 (tax., distr.).
Bahita quimilica; Cheng, 1980: 65 (distr.)
Frequenamia luteola Delong, 1984b: 118. Type locality: Argentina, Salta, Embarcacion (OSUC). Zanol, 2003b: 18 (syn.).
ramosa (Linnauori)
Bahita ramosa Linnauori, 1955: 116. Type locality: Brazil, Mato Grosso do Sul, Corumba (HNHM). Metcalf, 1967: 545 (cat.).
Bahita (Penibahita) ramosa; Linnauori, 1959: 174; Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).
Frequenamia ramosa; Linnauori & DeLong, 1978a: 116.
rava Zanol
Frequenamia rava Zanol, 2003b: 37. Type locality: Brazil, Sergipe, Caninde do Sao Francisco (DZUP).
reticulata (Osborn)
Eutettix reticulatus Osborn, 1924: 415–416. Type locality: Colombia, Bonda (CMNH). Metcalf, 1967: 487 (cat.).
Bahita (Penebahita) reticulata; Linnauori, 1959: 173; Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).
Frequenamia reticulata; Linnauori & DeLong, 1978a: 118; Zanol, 2003b: 19 (distr.).
saranensis (Osborn)
Phlepsius saranensis Osborn, 1923b: 59. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Distribution – Brazil, Bolivia, Paraguay. Metcalf, 1967: 566 (cat.).
Bahita (Penebahita) saranensis; Linnauori, 1959: 173.
Frequenamia saranensis; Linnauori & DeLong, 1978a: 118; Zanol, 2003b: 19 (distr.).
sparsa (Osborn)
Phlepsius sparsus Osborn, 1923b: 59–60. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Distribution – Brazil, Bolivia, Paraguay. Metcalf, 1967: 567 (cat.).
Bahita (Penebahita) venosula f. *sparsa*; Linnauori, 1959: 168.
Frequenamia sparsa; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 20 (distr.).
spiniventris (Linnauori)
Bahita spiniventris Linnauori, 1955: 114–115. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHW). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Metcalf, 1967: 546 (cat.).
Bahita (Penebahita) spiniventris; Linnauori, 1959: 170; Zanol & Menezes, 1982: 37 (distr.).
Frequenamia spiniventris; Linnauori & DeLong, 1978a: 116; Zanol, 2003b: 20–21 (distr.).
venosula (Berg)
Deltoccephalus venosulus Berg, 1879: 266. Type locality: Argentina, Provincia Bonaerensis (MLPA). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina.
Phlepsius venosulus; Berg, 1884a: 32; Metcalf, 1967: 568 (cat.).
Bahita (Penebahita) venosula; Linnauori, 1959: 167.

Bahita gracilis Linnauvori, 1955: 115. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHMW).
Linnauvori, 1959: 167 (syn.); Metcalf, 1967: 544 (cat.).

Frequenamia venosula; Linnauvori & DeLong, 1978a: 116; Linnauvori & DeLong, 1979b:
192 (distr.); Zanol, 2003b: 21 (distr.).

venustula Zanol

Frequenamia venustula Zanol, 2003b: 28–29. Type locality: Brazil, Bahia, Encruzilhada
(DZUP).

vicosa Linnauvori & DeLong

Frequenamia vicosa Linnauvori & DeLong, 1978a: 119. Type locality: Brazil, Vicoso
(OSUC). Zanol, 2003b: 22 (tax., distr.).

Genus *Garapita* Oman

Type species, *Garapita garbosa* Oman, 1936 (original designation).

Garapita Oman, 1936: 369–370; Evans, 1947: 243 (in Platymetopiini); Linnauvori,
1959: 222–223 (redesc., key); Metcalf, 1967: 1606 (in Scaphoideini); Oman *et
al.*, 1990: 214 (cat.); Zanol, 2003a: 239 (redesc.).

Garapita (Chlamydopita) Linnauvori

Type species, *Garapita (Chlamydopita) aurea* Linnauvori (original designation).

Garapita (Chlamydopita) Linnauvori, 1959: 225.

aurea Linnauvori

Garapita (Chlamydopita) aurea Linnauvori, 1959: 225. Type locality: Brazil, Santa
Catarina, Nova Teutonia (AMNH). Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.); Zanol,
2003a 246 (redesc.).

Garapita (Garapita) Oman

Garapita (Garapita); Linnauvori, 1959: 223; Zanol, 2003a: 239 (note).

clitellaria (Osborn)

Cicadella clitellaria Osborn, 1926b: 185. Type locality: Brazil, Chapada (CMNH).
Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina.

Garapita (Garapita) pulchripennis Linnauvori, 1959: 224–225. Type locality: Brazil,
Santa Catarina, Nova Teutonia (AMNH). Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.);
Zanol, 2003a: 241 (syn.).

compta Zanol

Garapita (Garapita) computa [sic] Zanol, 2003a: 246. Type locality: Brazil, Mato
Grosso, Caceres (DZUP).

garbosa Oman

Garapita garbosa Oman, 1936: 370. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto
(NMNH). Di. stribution – Brazil, Argentina. Metcalf, 1967: 2104 (cat.).

Garapita (Garapita) garbosa; Linnauvori, 1959: 223–224 (redesc., distr.); Zanol, 2003a:
240 (redesc., dist.).

guajarensis Zanol

Garapita (Garapita) guajarensis Zanol, 2003a: 243–244. Type locality: Brazil, Rondonia,
Nova Mamore (INPA).

paraguaiensis Zanol

Garapita (Garapita) paraguaiensis Zanol, 2003a: 245–246. Type locality: Paraguay,
Canindeyu (DZUP).

sinopia Zanol

Garapita (Garapita) sinopia Zanol, 2003a: 244–245. Type locality: Brazil, Mato Grosso,
Sinop (DZUP).

Genus *Hecaloidia* Osborn

Type species, *Hecaloidia nervosa* Osborn, 1923 (original designation).

Hecaloidia Osborn, 1923b: 28; Oman, 1936: 378-379 (redesc.); Evans, 1947: 234 (listed); Metcalf, 1967: 1741 (in Fieberiellini); Linnauvori & DeLong 1978a: 112 (redesc.); Oman et al., 1990: 217 (cat.).

nervosa Osborn

Hecaloidia nervosa Osborn, 1923b: 28. Type locality: Bolivia, Villa Bella (CMNH).

Distribution – Brazil, Bolivia. Oman, 1936: 379 (listed); Metcalf, 1967: 1741 (cat.); Linnauvori & DeLong, 1978a: 113 (note, distr.); Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.).

Genus *Hegira* Oman

Type species, *Hegira brunnea* Oman, 1936 (original designation).

Hegira Oman, 1936: 383; Evans, 1947: 234 (listed); Metcalf, 1967: 160 (in Euscelini); Oman et al., 1990: 217 (cat.).

brunnea Oman

Hegira brunnea Oman, 1936: 383-384. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (NMNH). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina. Linnauvori, 1955: 101 (distr.); Linnauvori, 1956: 10 (distr.); Metcalf, 1967: 160 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.).

Genus *Huachia* Linnauvori

Type species, *Huachia rugicollis* Linnauvori, 1959 (original designation).

Huachia Linnauvori, 1959: 191; Oman et al., 1990: 218 (cat.).

rugicollis Linnauvori

Huachia rugicollis Linnauvori, 1959: 191. Type locality: Bolivia, Beni, Huachi (NMNH). Distribution – Bolivia, Ecuador. Linnauvori & DeLong, 1978c: 205 (note).

trilobata Linnauvori & Delong

Huachia trilobata Linnauvori & Delong, 1978c: 204. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Piracicaba (OSUC). Zanol, 2006g: 47-48 (desc. male, distr.).

Genus *Huancabamba* Linnauvori

Type species, *Huancabamba rotundiceps* Linnauvori, 1959 (original designation).

Huancabamba Linnauvori, 1959: 204-205; Oman et al., 1990: 218 (cat.).

rotundiceps Linnauvori

Huancabamba rotundiceps Linnauvori, 1959: 204-205. Type locality: Peru, Cajamarca, Huancabamba (AMNH). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Idiodonus* Ball

Type species, *Thamnotettix kennicotti* Uhler (original designation).

Idiodonus Ball, 1936a: 57; Evans, 1947: 234 (listed); Oman, 1949: 126 (redesc., tax.); Metcalf, 1967: 1284 (in Colladonini); Hamilton, 1975b: 494 (in Platymetopiina); Oman et al., 1990: 219 (cat.).

Phlepsius (Josanus) DeLong, 1938b: 244. Type species, *Phlepsius josea* Ball, 1900 (original designation). Oman, 1949: 16 (syn.); Metcalf, 1967: 1284 (cat.)

Orolix Ribaut, 1942: 267. Type species, *Cicada cruentata* Panzer, 1799 (original designation). Evans 1947: 236 (listed); Oman, 1949: 126 (syn.); Metcalf, 1967: 1284 (cat.).

graeculus (Ball)

Thamnotettix graecula Ball, 1901a: 6-7. Type locality: USA, Colorado Springs (NMNH). Distribution – USA, Mexico.

Idiodonus graeculus; DeLong, 1946a: 30.
plummeri DeLong

Idiodonus plummeri DeLong, 1946a: 25–26. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Rio Frio (OSUC). Metcalf, 1967: 1301 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key); Nielson, 1988: 134 (tax, note).

Idiodonus bakeri DeLong, 1946a: 26. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Deserto de Los Leones (OSUC). Metcalf, 1967: 1287 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key); Nielson, 1988: 134 (syn.).

wickhami Ball

Idiodonus wickhami Ball, 1937: 27. Type locality: USA, Arizona (NMNH). Distribution – USA, Mexico, Bolivia. Oman, 1949: 127 (distr.); Metcalf, 1967: 1304 (cat.).

Genus *Ilagia* Kramer & DeLong

Type species, *Ilagia zebula* Kramer & DeLong, 1968 (original designation).

Ilagia Kramer & DeLong, 1968: 172; Cwikla & Blocker, 1981: 174 (note); Oman *et al.*, 1990: 220 (cat.).

zebula Kramer & DeLong

Ilagia zebula Kramer & DeLong, 1968: 174. Type locality: Mexico, San Luis Potosi, Tamazunchale (OSUC).

Genus *Ileopeltus* Cwikla

Type species, *Chlorotettix tethys* Van Duzee, 1907 (original designation).

Ileopeltus Cwikla, 1988: 43. Godoy, 2004: 2 (redesc.), 3-4 (key).

aberrans (Osborn)

Chlorotettix aberrans Osborn, 1923b: 72–73. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Januaria (CMNH). Distribution – Brazil, Bolivia. Oman, 1936: 389 (listed); DeLong, 1945a: 11 (redesc.); Metcalf, 1967: 1029 (cat.).

Doleranus aberrans; Linnauvori, 1959: 276; Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.).

Ileopeltus aberrans; Cwikla, 1988: 52.

Doleranus cruzanus DeLong & Cwikla, 1984b: 726. Type locality: Bolivia, Santa Cruz. (OSUC). Cwickla, 1988: 52 (syn.).

blockeri Cwikla

Ileopeltus blockeri Cwikla, 1988: 51. Type locality: Venezuela, Guarico, 10 km east of Calazobo (NMNH). Distribution – Colombia, Venezuela. Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).

clavatus Cwikla

Ileopeltus clavatus Cwikla, 1988: 51. Type locality: Brazil, Roraima, Boa Vista (DZUP). Distribution – Colombia, Venezuela, Brazil. Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).

cuneus (DeLong & Martinon)

Chlorotettix cuneus DeLong & Martinon, 1974a: 265. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Piracicaba (OSUC).

Chlorotettix (Chlorotettix) cuneus; Zanol & Menezes, 1982: 38 (distr.).

Ileopeltus cuneus; Cwikla, 1988: 54.

cyclops (Linnauvori)

Doleranus cyclops Linnauvori, 1959: 275. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (NMNH). Distribution – Colombia, Brazil, Argentina. Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.).

Ileopeltus cyclops; Cwikla, 1988: 54.

dorsalus Cwikla

Ileopeltus dorsalus Cwikla, 1988: 46,48. Type locality: Venezuela, Aragua, El Limon (OSUC).

haplus Cwikla

Ileopeltus haplus Cwikla, 1988: 49. Type locality: Brazil, Mato Grosso do Sul, Campo Grande (DZUP).

hastulus (DeLong & Linnauori)

Chlorotettix hastulus DeLong & Linnauori, 1978: 121, 122. Type locality: Brazil, Roraima, Surumu (OSUC). Distribution – Venezuela, Brazil.

Ileopeltus hastulus; Cwikla, 1988: 49.*nanocanthus* Cwikla

Ileopeltus nanocanthus Cwikla, 1988: 45–46. Type locality: Panama, Canal Zone, Curundu (OSUC). Godoy, 2004: 4 (key).

similarus Godoy

Ileopeltus similarus Godoy, 2004: 2–3. Type locality: Costa Rica, Puntarenas, Finca Cafrosa (INBio).

spinosus (DeLong)

Chlorotettix spinosus DeLong, 1945a: 10–11. Type locality: Mexico, Guerrero, Buena Vista (OSUC).

Ileopeltus spinosus; Cwikla, 1988: 48; Godoy, 2004: 4 (key).*tethys* (Van Duzee)

Chlorotettix Tethys [sic] Van Duzee, 1907: 71. Type locality: Jamaica, Kingstone (NMNH). Distribution – USA, Mexico, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Trinidad and Tobago, Barbados, Antigua, Cayman Isl, Dominican Republic, Martinique, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, Panama, Colombia, Venezuela, Brazil.

Chlorotettix tethys; DeLong & Caldwell, 1937: 55; DeLong, 1945a: 15 (redesc.); Caldwell & Martorell, 1952: 72–73 (redesc., distr.), Metcalf, 1967: 1064 (cat.).

Chlorotettix bidentatus DeLong, in Wolcott, 1923: 264. Type locality: Puerto Rico (OSUC). Wolcott, 1936: 86 (syn.).

Chlorotettix dilutus Osborn, 1923b: 73. Type locality: Colombia, Bonda (CMNH). Osborn, 1935: 118 (syn.).

Doleranus kinonanus Ball, 1936b: 432. Type locality: Mexico, Sonora, Kino Bay (NMNH). Linnauori, 1959: 274 (syn.); Metcalf, 1967: 1276 (cat.).

Doleranus tethys; Linnauori, 1959: 274; Zanol & Menezes, 1982: 39 (distr.); Maes & Godoy, 1993: 29 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).

Ileopeltus tethys; Cwikla, 1988: 45; Godoy, 2004: 4 (key).*ventriculus* Cwikla

Ileopeltus ventriculus Cwikla, 1988: 48. Type locality: Brazil, Ceara, Crato (BMNH).

Genus *Jaacunga* Nielson

Type species, *Idiodonus vinculus* DeLong, 1946 (original designation).

Jaacunga Nielson, 1988: 129.*spatulatus* (DeLong)

Idiodonus spatulatus DeLong, 1946a: 15. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC). Metcalf, 1967: 1302 (cat.); DeLong, 1984a: 10 (key).

Jaacunga spatulatus; Nielson, 1988: 131.

Idiodonus rubellus DeLong, 1946a: 15. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC). Metcalf, 1967: 1301 (cat.); DeLong, 1984a: 9 (key); Nielson, 1988: 131 (syn.).

vinculus DeLong

Idiodonus vinculus DeLong, 1946a: 15. Type locality: Mexico, Hidalgo, Jacala (OSUC). Metcalf, 1967: 1304 (cat.); DeLong, 1984a: 10 (key).

Jaacunga vinculus; Nielson, 1988: 130.

Genus *Kramerana* DeLong & Thambimuttu

Type species, *Kramerana linnavuorii* DeLong & Thambimuttu (original designation).

Kramerana DeLong & Thambimuttu, 1973: 165; Cwikla & Blocker, 1981: 174 (note);
Oman et al. 1990: 223 (cat.); Zahniser & Webb, 2004: 669 (key).

adusta Zahniser

Kramerana adusta Zahniser, in Zahniser & Webb, 2004: 673. Type locality: Peru,
Pasco, 8 km E Carhuamayo, 4000m (MUSM).

hypera Blocker & Fang

Kramerana hypera Blocker & Fang, 1992: 344–345. Type locality: Peru, Jauja, Junin,
3260 m. Concepcion (SNOW).

junina Zahniser

Kramerana junina Zahniser, in Zahniser & Webb, 2004: 671–672. Type locality: Peru,
Junin 42km NE La Oroya, 4000m (MUSM).

linnavuorii DeLong & Thambimuttu

Kramerana linnavuorii DeLong & Thambimuttu, 1973: 165–167. Type locality: Chile,
Salta de Laja (OSUC). Linnavuori & DeLong, 1977b: 199 (distr.).

mella DeLong & Thambimuttu

Kramerana mella DeLong & Thambimuttu, 1973: 167. Type locality: Chile, Malleco,
Angol (OSUC).

Genus *Krameraxus* Maldonado-Capriles

Type species, *Krameraxus leucornatus* Maldonado-Capriles, 1968 (original designation).

Krameraxus Maldonado-Capriles, 1968: 35; Cwikla & Blocker, 1981: 174 (note); Oman
et al., 1990: 223 (cat.).

leucornatus Maldonado-Capriles

Krameraxus leucornatus Maldonado-Capriles, 1968: 37. Type locality: Puerto Rico, El
Verde Experimental Forest Station, near Yunque (NMNH).

Genus *Lajolla* Linnavuori

Type species, *Lajolla perlata* Linnavuori, 1959 (original designation). *Lajolla* Linnavuori,
1959: 160–161; Oman et al., 1990: 224 (cat.).

perlata Linnavuori

Lajolla perlata Linnavuori, 1959: 161. Type locality: Panama, La Jolla (NMNH).
Linnavuori & DeLong, 1978a: 112 (note).

Genus *Lascumbresa* Linnavuori & DeLong

Type species, *Lascumbresa armata* Linnavuori & DeLong, 1979 (original designation).

Lascumbresa Linnavuori & DeLong, 1979a: 132; Cwikla & Blocker, 1981: 174 (note);
Oman et al., 1990: 224 (cat.).

armata Linnavuori & DeLong

Lascumbresa armata Linnavuori & DeLong, 1979a: 132. Type locality: Panama, Las
Cumbres (OSUC).

Genus *Lojanus* Linnavuori, 1959

Type species, *Lojanus wagneri* Linnavuori, 1959 (original designation).

Lojanus Linnavuori, 1959: 272; Oman et al., 1990: 226 (cat.).

wagneri Linnavuori

Lojanus wagneri Linnavuori, 1959: 273. Type locality: Ecuador, Loja (ZMUH).

Genus *Megabahita* Linnnavuori & DeLong

- Type species, *Eutettix irroratus* Osborn, 1923 (original designation).
Megabahita Linnnavuori & DeLong, 1978a: 120; Cwikla & Blocker 1981: 175 (note);
Oman et al., 1990: 229 (cat.); Zanol, 1992: 66-74 (redesc., tax., distr.).
danunciae Zanol
Megabahita danunciae Zanol, 1992: 71. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Botucatu
(DZUP).
gigantea Linnnavuori & DeLong
Megabahita gigantea Linnnavuori & DeLong, 1978a: 120-121. Type locality: Brazil,
Goiás, Leopoldo Bulhões (OSUC). Zanol, 1992: 69 (distr.).
irrorata (Osborn)
Eutettix irroratus Osborn, 1932b: 51. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH)
Distribution – Brazil, Bolivia, Paraguay.
Bahita irrorata; Oman, 1936: 38; Linnnavuori, 1955: 113 (distr.); Metcalf, 1967: 545
(cat.).
Megabahita irrorata; Linnnavuori & DeLong, 1978a: 120; Zanol, 1992: 69 (redesc.,
distr.).
mineira Zanol
Megabahita mineira Zanol, 1992: 69-71. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Pirapora
(DZUP).
patula DeLong
Megabahita patula DeLong, 1982a: 187. Type locality: Panama, El Llano (OSUC).
Zanol, 1992: 69 (distr.).
spatulata Zanol
Megabahita spatulata Zanol, 1992: 74. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Chapada
dos Guimaraes (DZUP).
stylata DeLong
Megabahita stylata DeLong, 1984b: 118. Type locality: Bolivia, Santa Cruz (OSUC).
Zanol, 1992: 69 (distr.).

Genus *Menosoma* Ball

- Type species, *Menosoma stonei* Ball, 1931 (original designation).
Menosoma Ball, 1931a: 4-5; DeLong & Caldwell, 1937: 40-41 (cat.); Oman, 1936: 79
(redesc., tax.); Evans, 1947: 235 (listed); Oman, 1949: 159 (redesc.); Metcalf,
1967: 530 (cat.); Hamilton, 1975b: 495 (in Platymetopiini); Zanol, 1989a: 259
(note); Oman *et al.*, 1990: 229 (cat.).
cincta (Osborn & Ball)
Eutettix cinctus Osborn & Ball, 1898: 97. Type locality: USA (ISUI). Distribution –
USA, Panama, Nicaragua, Colombia, Brazil, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina.
Menosoma cincta; Ball., 1931a: 5; Oman, 1936: 379 (listed); DeLong & Caldwell, 1937:
40 (cat.); Oman, 1936: 379; DeLong, 1944d: 157 (note); Oman, 1949: 159 (distr.);
Linnnavuori, 1955: 101 (distr.); Linnnavuori, 1956: 10 (distr.); Metcalf, 1967: 531
(cat.); Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.); Linnnavuori, 1986: 153 (distr.); Zanol,
1989a: 260 (listed); Lozada, 1992: 29 (distr.); Freytag & Maes, 1997: 38 (distr.);
Maes *et al.*, 1999: 31 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).
cincta mexicana DeLong
Menosoma mexicana DeLong, 1944d: 158. Type locality: Mexico, Vera Cruz, Tierra
Blanca (OSUC). Metcalf, 1967: 534 (cat.).
Menosoma cincta mexicana; Linnnavuori, 1959: 185.

elegans (Osborn)

Eutettix elegans Osborn, 1923b: 53-54. Type locality: Bolivia, Puerto Suarez (CMNH).

Distribution – Guyana, Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina.

Menosoma elegans; Oman, 1936: 379; Linnavuori, 1955: 101 (distr.); Linnavuori, 1956: 10 distr.); Metcalf, 1967: 534 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.); Zanol, 1989a: 260 (listed); Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).

flavolineata (Linnavuori & DeLong)

Huachia flavolineata Linnavuori & DeLong, 1978b: 233. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Fazenda Joao Pinheiro, rio Tapirape, 240 km de Barra (CASC).

Menosoma flavolineata; Zanol 1989a: 260.

inprica Cheng

Monosoma inprica [sic] Cheng, 1980: 101. Type locality: Paraguay, nr Filadelfia (SNOW).

longita Cheng

Menosoma longita Cheng, 1980: 101. Type locality: Paraguay, NW Asuncion, 2 km E Limpo (SNOW).

monticola Linnavuori

Menosoma monticola Linnavuori, 1959: 186. Type locality: Argentina, Catamarca Belen (MLPA). Zanol, 1989a: 260 (listed).

neocincta (Osborn)

Eutettix neocinctus Osborn, 1923b: 49. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Distribution – Brazil, Bolivia.

Menosoma neocincta; Oman, 1936: 379; Linnavuori, 1959: 185 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 534 (cat.).

picta Zanol

Menosoma picta Zanol, 1989a: 260. Type locality: Argentina, La Rioja, Patquia (BMNH).

pseudotaeniata Linnavuori & DeLong

Menosoma pseudotaeniata Linnavuori & DeLong, 1978a: 133. Type locality: Peru, Sinchono (OSUC). Distribution – Brazil, Peru. Zanol, 1989a: 260 (distr.); Lozada, 1992: 29 (distr.).

randali Zanol

Menosoma randali Zanol, 2001b: 243. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Nova Xavantina (DZUP).

taeniata Linnavuori

Menosoma taeniata Linnavuori, 1955: 112–113. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHW). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina. Metcalf, 1967: 535 (cat.); Cheng, 1980: 66 (distr.); Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.); Zanol, 1989a: 260 (listed).

xavantinense Zanol

Menosoma xavantinense Zanol, 2001b: 246. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Nova Xavantina (DZUP).

Genus *Mesadorus* Linnavuori

Type species, *Mesadorus undatus* Linnavuori, 1955 (original designation).

Mesadorus Linnavuori, 1955: 120; Metcalf, 1967: 932 (in Thamnotettixini); Oman et al., 1990: 229 (cat.).

undatus Linnavuori

Mesadorus undatus Linnavuori, 1955: 120. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHW). Distribution – Brazil, Argentina. Metcalf, 1967: 932 (cat.); Cheng, 1980: 66 (distr.); Zanol & Menezes, 1982: 40 (distr.); Cavichioli & Zanol, 1991: 59 (distr.).

Genus *Mesamia* Ball

Type species, *Eutettix (Mesamia) nigridorsum* Ball, 1907 (original designation)

Eutettix (Mesamia) Ball, 1907: 59.

Mesamia; DeLong Cadwell, 1937: 20; Evans, 1947: 244 (in Platymetopiini); Oman, 1949: 132 (redesc.); Metcalf, 1967: 2075 (in Scaphoideini); Hamilton, 1975b: 495 (in Platymetopiina); Oman et al., 1990: 229 (cat.).

alta DeLong & Hershberger

Mesamia alta DeLong & Hershberger, 1947d: 260. Type locality: Mexico, Michoacan, Tuxpan (OSUC). Metcalf, 1967: 2078 (cat.).

bifurcata DeLong & Hershberger

Mesamia bifurcata DeLong & Hershberger, 1947d: 258. Type locality: Mexico, Tasquillo (OSUC). Metcalf, 1967: 2078 (cat.).

divisa DeLong & Hershberger

Mesamia divisa DeLong & Hershberger, 1947d: 262–263. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 2079 (cat.).

forcipata DeLong

Mesamia forcipata DeLong, 1980: 66. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

frigida DeLong & Hershberger

Mesamia frigida DeLong & Hershberger, 1947d: 265. Type locality: Mexico, Rio Frio (k. 65; 10,000ft elevation) (OSUC). Metcalf, 1967: 2080 (cat.).

interrupta DeLong & Hershberger

Mesamia interrupta DeLong & Hershberger, 1947d: 263. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (OSUC). Metcalf, 1967: 2080 (cat.).

montana DeLong & Hershberger

Mesamia montana DeLong & Hershberger, 1947d: 262. Type locality: Mexico, Michoacan, Urapan (OSUC). Metcalf, 1967: 2081 (cat.).

orizaba Ball

Mesamia orizaba Ball, 1931b: 92. Type locality: Mexico, Michoacan, Zitacuara (NMNH).] DeLong & Hershberger, 1947d: 258 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 2084 (cat.).

portachela DeLong

Mesamia portachela DeLong, 1984b: 116. Type locality: Bolivia, Portachuela (OSUC).

puebla DeLong & Hershberger

Mesamia puebla DeLong & Hershberger, 1947d: 264–265. Type locality: Mexico, Puebla, Puebla (OSUC). Metcalf, 1967: 2084 (cat.).

ruptura DeLong

Mesamia ruptura DeLong, 1980: 66. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

separata DeLong & Hershberger

Mesamia separata DeLong & Hershberger, 1947d: 263–264. Type locality: Mexico, Veracruz, Orizaba (OSUC). Metcalf, 1967: 2085 (cat.).

separata quadripunctata DeLong & Hershberger

Mesamia separata var. *quadripunctata* DeLong & Hershberger, 1947d: 2643. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

Genus *Mexicananus* DeLong

Type species, *Mexicananus levis* DeLong, 1944 (original designation).

Mexicananus DeLong, 1944e: 89; Evans, 1947: 235 (listed); Metcalf, 1967: 710 (cat.); Oman et al., 1990: 230 (cat.).

levis DeLong

Mexicananus levis DeLong, 1944e: 89. Type locality: Mexico, Chiapas, Finca Vergel, Valley Of Rio Huixtla. (OSUC). Metcalf, 1967: 710 (cat.).

Genus *Mimodorus* Linnauori

Type species, *Mimodorus diabolus* Linnauori, 1959 (original designation).
Mimodorus Linnauori, 1959: 229–230; Oman *et al.*, 1990: 230 (cat.).

***Mimodorus (Megadorus)* Linnauori**

Type species, *Mimodorus pseudundatus* (original designation).
Mimodorus (Megadorus) Linnauori, 1959: 231.
pseudundatus Linnauori

Mimodorus (Megadorus) pseudundatus Linnauori, 1959: 231. Type locality: Brazil, Mato do Sul, Corumba (NMNH). Distribution – Brazil, Bolivia, Argentina. Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.).

***Mimodorus (Mimodorus)* Linnauori**

Mimodorus Linnauori, 1959: 230.
decempunctatus (Linnauori)
Mesadorus decempunctatus Linnauori, 1955: 121. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHW). Metcalf, 1967: 932 (cat.).
Mimodorus (Mimodorus) decempunctatus; Linnauori, 1959: 231; Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.).
diabolus Linnauori
Mimodorus (Mimodorus) diabolus Linnauori, 1959: 230. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (NMNH). Distribution – Brazil, Argentina.

Genus *Mocolinna* McKamey

Type species, *Mocoa elegans* Linnauori & DeLong, 1978 (original designation).
Mocolinna McKamey, 2003b: 448 (*nom. nov. pro Mocoa* Linnauori & DeLong, 1978b, *non* Gray, 1845).
Mocoa; Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note).
elegans (Linnauori & DeLong)
Mocoa elegans Linnauori & DeLong, 1978b: 236. Type locality: Colombia, Narino, 15 mi SW Mocoa (OSUC). Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).
Mocolinna elegans; McKamey, 2003b: 448.

Genus *Napo* Linnauori & DeLong

Type species, *Napo brazosellus* Linnauori & DeLong, 1976 (original designation).
Napo Linnauori & DeLong, 1976: 34; Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman *et al.*, 1990: 232 (cat.).
bellus Zanol
Napo bellus Zanol, 2006a: 65. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Nobres (rio Serragem) (DZUP).
brazosellus Linnauori & DeLong
Napo brazosellus Linnauori & DeLong, 1976: 34. Type locality: Peru, Napo (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Neocrassana* Linnauori

Type species, *Neocrassana undata* Linnauori, 1959 (original designation).

Neocrassana Linnavuori, 1959: 286; Oman *et al.*, 1990: 233 (cat.); Blocker & Larsen, 1991: 123 (key).

alayoi Hidalgo-Gato

Neocrassana alayoi Hidalgo-Gato, 2000: 128–129. Type locality: Cuba, Pinar del Rio (IESC).

punctigera Linnavuori

Neocrassana punctiger [sic] Linnavuori, 1959: 287. Type locality: Panama, Barro Colorado (NMNH). Blocker & Larsen, 1991: 123 (distr.).

undata Linnavuori

Neocrassana undata Linnavuori, 1959: 286–287. Type locality: Brazil, Rio Grande (HNHM). Distribution – Brazil, Argentina. Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.); Blocker & Larsen, 1991: 123 (distr.).

Genus *Neohegira* Linnavuori & DeLong

Type species, *Neohegira breviceps* Linnavuori & DeLong, 1978 (original designation).

Neohegira Linnavuori & DeLong, 1978c: 205; Linnavuori & DeLong, 1978c: 205 (in Euscelini); Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman *et al.*, 1990: 233 (in Deltococephalini); Kamitani, 1999: 80 (in Paralimnini).

breviceps Linnavuori & DeLong

Neohegira breviceps Linnavuori & DeLong, 1978c: 206. Type locality: Bolivia, Cochabamba, Chapare, Alto Palomar (OSUC).

Genus *Neomesus* Linnavuori

Type species, *Paramesus obtusiceps* Berg, 1884 (original designation).

Neomesus Linnavuori, 1959: 233–234; Menezes, 1975: 133–134 (redesc.); Oman *et al.*, 1990: 233 (cat.).

obtusiceps (Berg)

Paramesus obtusiceps Berg, 1884a: 37. Type locality: Uruguay (Banda Oriental) (MLPA). Distribution – Brazil, Chile, Argentina, Uruguay. Metcalf, 1967: 2067 (cat.).

Neomesus obtusiceps; Linnavuori, 1959: 234; Ruffinelli, 1970: 18 (distr.); Menezes, 1975: 134–137 (desc. male, distr.); Linnavuori & DeLong, 1977b: 207 (desc. male); Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.).

Genus *Neophlepsius* Linnavuori

Type species, *Phlepsius gracilis* Osborn, 1923 (original designation).

Neophlepsius Linnavuori, 1955: 118; Linnavuori, 1959: 191–192 (redesc.); Metcalf, 1967: 546 (cat.); Menezes, 1973: 132 (key); Zanol, 1988c: 45–53 (rev.); Oman *et al.*, 1990: 233 (cat.); Zanol, 1998: 81–83 (redesc., tax.).

Neophlepsius (*Neophlepsius*) Linnavuori

Neophlepsius (*Neophlepsius*); Linnavuori, 1959: 11

abruptus Zanol

Neophlepsius (*Neophlepsius*) *abruptus* Zanol, 1998: 86–88. Type locality: Brazil, Mato Grosso do Sul, Tres Lagoas (DZUP).

bicuspidatus Linnavuori & DeLong

Neophlepsius bicuspidatus Linnavuori & DeLong, 1979a: 128. Type locality: Brazil, Sao Paulo (OSUC). Zanol, 1998: 83 (listed)

bifidus Zanol

Neophlepsius (*Neophlepsius*) *bifidus* Zanol, 1998: 90. Type locality: Brazil, Parana, Castro (DZUP).

corpulentus Linnavuori

- Neophlepsius gracilis* sensu Linnauori, 1955: 118 non Osborn, 1923b. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHMW).
- Neophlepsius corpulentus* Linnauori, 1959: 193; Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.); Zanol, 1988c: 51 (redesc., distr.); Zanol, 1998: 83 (distr.)
- denticulatus* Zanol
- Neophlepsius (Neophlepsius) denticulatus* Zanol, 1998: 88. Type locality: Brazil, Parana, Curitiba (DZUP).
- gracilis* (Osborn)
- Phlepsioides gracilis* Osborn, 1923b: 57–58. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Distribution – Brazil, Bolivia, Paraguay. Linnauori, 1956: 10 (distr.); Linnauori, 1959: 192 (syn. *multifarius*) Metcalf, 1967: 546 (cat.); Zanol, 1988c: 46 (reval.); Zanol, 1988d: 69–93 (morph.); Zanol, 1998: 83–85 (redesc., ill.).
- Neophlepsius (Neophlepsius) retrorsus* Menezes, 1973: 131. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Botucatu (MZSP). Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.); Zanol, 1988c: 46 (syn.).
- Neophlepsius phorus* Cheng, 1980: 103. Type locality: Paraguay: 101 km NW Encarnacion (SNOW). Zanol, 1998: 83 (syn.).
- malkowskiae* Zanol
- Neophlepsius (Neophlepsius) malkowskiae* Zanol, 1998: 90-91. Type locality: Brazil, Parana, Ponta Grossa (DZUP).
- multifarius* (Berg)
- Phlepsioides multifarius* Berg, 1884b: 117–118. Type locality: Uruguay (MLPA). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Metcalf, 1967: 564 (cat.).
- Neophlepsius (Neophlepsius) multifarius*; Linnauori, 1959: 192; Ruffinelli, 1970: 18 (distr.); Zanol, 1988c: 49 (redesc.); Zanol, 1998: 3 (distr.).
- Neophlepsius macilentus* Linnauori, 1955: 119. Type locality: Paraguay, San Bernardino (NHMW). Linnauori, 1959: 192 (syn.).
- peruvianus* Zanol
- Neophlepsius (Neophlepsius) peruvianus* Zanol, 1988c: 85. Type locality: Peru, Huanuco, Tingo Maria (BMNH).
- rafaeli* Zanol
- Neophlepsius (Neophlepsius) rafaeli* Zanol, 1988c: 52. Type locality: Brazil, Parana, Terra Boa (DZUP). Distribution – Brazil, Paraguay. Zanol, 1998: 83 (distr.).
- Neophlepsius (Nesolanus) Linnauori*
- Type species, *N[eophlepsius] disonymos* (original designation).
- Neophlepsius (Nesolanus) Linnauori*, 1959: 194.
- disonymos* Linnauori
- Neophlepsius (Nesolanus) disonymos* Linnauori, 1959: 194–195. Type locality: Brazil, Santa Catarina, Nova Teutonia (AMNH). Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.); 1998c: 83 (distr.).
- Genus *Ollarianus* Ball
- Type species, *Eutettix balli* Van Duzee, 1907 (original designation).
- Ollarianus* Ball, 1936a: 59; DeLong & Caldwell, 1937: 39 (cat.); Evans, 1947: 236 (listed); Oman, 1949: 135 (redesc.); Metcalf, 1967: 498 (cat.); Hamilton, 1975b: 495 (in *Platymetopiina*); Oman et al., 1990: 236 (cat.).
- advenus* DeLong
- Ollarianus advenus* DeLong, 1980: 69. Type locality: Mexico, Guerrero, Jalisco (OSUC).
- armus* (Ball)

- Exitianus armus* Ball, 1933: 227. Type locality: USA, Arizona, Tucson (NMNH).
 Distribution – USA, Mexico, Nicaragua. Oman, 1936: 382 (note); DeLong & Caldwell, 1937: 36 (cat.).
- Ollarianus armus*; DeLong, 1944c: 392; Oman, 1949: 135 (distr.); Metcalf, 1967: 499 (cat.); Freytag & Sharkey, 2002: 38 (distr.).
- balli* (Van Duzee)
Eutettix balli Van Duzee, 1907: 68–69. Type locality: Jamaica, Montego Bay (NMNH).
- Ollarianus balli*; Ball, 1936a: 59; DeLong & Caldwell, 1937: 39; Oman, 1949: 135 (distr.); Metcalf, 1967: 499 (cat.).
- bidentatus* DeLong
Ollarianus bidentatus DeLong, 1944c: 397. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).
 Metcalf, 1967: 499 (cat.).
- comayagus* Linnnavuori & DeLong
Ollarianus comayagus Linnnavuori & DeLong, 1977a: 565–566. Type locality: Honduras, Comayagua, Chiquita. (OSUC).
- grossus* Linnnavuori
Ollarianus grossus Linnnavuori, 1959: 296. Type locality: Guatemala, Esquintla (NMNH).
insignis DeLong
Ollarianus insignis DeLong, 1944c: 396–397. Type locality: Mexico, Morelos, Puente de Ixtla (OSUC). Distribution – Mexico, Guatemala, Nicaragua. Metcalf, 1967: 501 (cat.); Freytag & Maes 1997: 38 (distr.); Maes *et al.*, 1999: 32 (distr.).
- kinoanus* (Ball)
Exitianus kinoanus Ball, 1936c: 71. Type locality: USA, Arizona Gillespie Dam (NMNH).
 Distribution – USA, Mexico. DeLong & Hershberger, 1947b: 116 (redesc.).
- Ollarianus kinoanus*; Oman, 1947a: 60; Oman, 1949: 135 (distr.); Metcalf, 1967: 501 (cat.).
- lobatus* DeLong
Ollarianus lobatus DeLong, 1944c: 397. Type locality: Mexico, Guerrero, San Geronimo (OSUC). Metcalf, 1967: 501 (cat.).
- mexicanus* DeLong
Ollarianus mexicanus DeLong, 1980: 70. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).
muesebecki DeLong
Ollarianus muesebecki DeLong, 1944c: 396. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 502 (cat.).
- sexmaculatus* Linnnavuori
Ollarianus sexmaculatus Linnnavuori, 1959: 294–285. Type locality: Colombia, Mamatoco (AMNH). Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).
- strictus* (Ball)
Eutettix stricta Ball, 1900b: 204. Type locality: USA, Arizona (NMNH). Distribution – USA, Mexico, Nicaragua.
- Ollarianus strictus*; DeLong, 1944c: 392; Oman, 1949: 135 (distr.); Metcalf, 1967: 502 (cat.).
- Chlorotettix minor* DeLong, 1918: 6. Type locality: Mexico, Juarez (OSUC). DeLong, 1944c: 392 (syn.); Metcalf, 1967: 502 (cat.).
- tripartitus* DeLong
Ollarianus tripartitus DeLong, 1944c: 396. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 503 (cat.); Nielson, 1988: 132–133 (note, distr.).
- Idiodonus albifrons* DeLong, 1983b: 89. Type locality: Mexico, Guerrero, Chilpancingo (OSUC). DeLong, 1984a: 10; Nielson, 1988: 132 (syn.).
- uniformis* Linnnavuori & DeLong

Ollarianus uniformis Linnavuori & DeLong, 1977a: 566–567. Type locality: Panama, Darien, Santa Fe. (OSUC).

vestigii DeLong

Ollarianus vestigii DeLong, 1944c: 398. Type locality: Mexico, San Luis de Potosi, Palomas (OSUC). Metcalf, 1967: 503 (cat.).

Genus *Omanana* DeLong

Type species, *Athysanus litigiosus* Ball, 1901 (original designation).

Omanana DeLong, 1941: 293; Evans, 1947: 236 (listed); Oman, 1949: 122 (redesc.); Metcalf, 1967: 535 (cat.); Hamilton, 1975b: 495 (in Platymetopiina); Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman *et al.*, 1990: 236 (cat.).

angustata DeLong

Omanana angustata DeLong, 1941: 297. Type locality: Mexico, Morelos, Amacuzac (OSUC). Metcalf, 1967: 535 (cat.).

arcata DeLong

Omanana arcata DeLong, 1944f: 154–155. Type locality: Mexico, Tamps, El Mante (OSUC). Metcalf, 1967: 535 (cat.).

bifurcata DeLong

Omanana bifurcata DeLong, 1944f: 52. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 536 (cat.).

dampfi DeLong

Omanana dampfi DeLong, 1941: 294. Type locality: Mexico, Guerrero, Balsas (OSUC). Metcalf, 1967: 536 (cat.).

divergens DeLong

Omanana divergens DeLong, 1944f: 153. Type locality: Mexico, Morelos, Tepotzlan (OSUC). Metcalf, 1967: 536 (cat.).

divisa DeLong

Omanana divisa DeLong, 1980: 67. Type locality: Mexico, Guerrero, Mexcala (OSUC).

duodens DeLong

Omanana duodens DeLong, 1944f: 151–152. Type locality: Mexico, Michoacan, Tuxpan (OSUC). Metcalf, 1967: 536 (cat.).

litigiosa (Ball)

Athysanus litigiosus Ball, 1901b: 51. Type locality: Mexico (NMNH).

Omanana litigiosa; DeLong, 1941: 293; Oman, 1949: 122 (listed); Metcalf, 1967: 536 (cat.).

mediana DeLong

Omanana mediana DeLong, 1944f: 154. Type locality: Mexico, Tamps, El Mante (OSUC). Metcalf, 1967: 537 (cat.).

nigrifrons DeLong

Omanana nigrifrons DeLong, 1941: 297. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 537 (cat.).

pallidens DeLong

Omanana pallidens DeLong, 1941: 296. Type locality: Mexico, Tetela del Rio (OSUC). Metcalf, 1967: 537 (cat.).

similaris DeLong

Omanana similaris DeLong, 1941: 294–296. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 537 (cat.).

spinara DeLong

Omanana spinara DeLong, 1980: 66–67. Type locality: Mexico, Jalisco, Teguila (OSUC).

striata DeLong

Omanana striata DeLong, 1941: 296. Type locality: Mexico, Chiapas, Finca Vergel (OSUC).
Metcalf, 1967: 537 (cat.).

torquea DeLong

Omanana torquea DeLong, 1944f: 156. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).
Metcalf, 1967: 537 (cat.).

trileta DeLong

Omanana trileta DeLong, 1980: 67. Type locality: Mexico, Morelos, Cuernavaca (OSUC).

Genus *Onura* Oman

Type species, *Onura eburneola* Oman, 1936 (original designation).

Onura Oman, 1936: 387; Evans, 1947: 236 (listed); Metcalf, 1967: 839 (in Thamnotettixini);
Oman et al., 1990: 236 (cat.).

eburneola Oman

Onura eburneola Oman, 1936: 387–388. Type locality: Argentina, Misiones,
 Loreto(NMNH). Distribution – Brazil, Paraguay, Argentina. Metcalf, 1967: 839
 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.).

grisea (Linnauori)

Agudus griseus Linnauori, 1955: 121. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHMW).
Onura grisea; Linnauori, 1959: 240; Metcalf, 1967: 2242 (cat.); Zanol & Menezes, 1982:
 41 (distr.).

Genus *Oxycephalotettix* Zahniser

Type species, *Oxycephalotettix tiputini* Zahniser, 2005 (original designation).

Oxycephalotettix Zahniser, 2005: 654–655.

tiputini Zahniser

Oxycephalotettix tiputini Zahniser, 2005: 656. Type locality: Ecuador, Orellana, Tiputini
 Biodiversity Station, nr Yasuni National Park, 220–250m, 0°37'55" S 76°8'39" W.
 (NMNH).

Genus *Pachytettix* Linnauori

Type species, *Pachytettix sagittarius* Linnauori, 1959 (original designation).

Pachytettix Linnauori, 1959: 244; Oman et al., 1990: 237 (cat.); Zanol, 2006c: 133
 (distr.).

elegans Linnauori & DeLong

Pachytettix elegans Linnauori & DeLong, 1976: 34–35. Type locality: Bolivia, Sta
 Cruz, Saavedra (OSUC).

ikrajubus Zanol

Pachytettix ikrajubus Zanol, 2006c: 133–134. Type locality: Brazil, Acre, Porto Acre,
 Humaita (DZUP).

sagittarius Linnauori

Pachytettix sagittarius Linnauori, 1959: 245. Type locality: Peru, Madre de Dios
 (HNHM). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Parabahita* Linnauori

Type species, *Parabahita vezeyii* Linnauori, 1959 (original designation).

Parabahita Linnauori, 1959: 177; Oman et al., 1990: 238 (cat.).

armata Linnauori & DeLong

Parabahita armata Linnauori & DeLong, 1978b: 233. Type locality: Colombia,
 Cundinamarca, Finca Bella Vista near Sasaima (OSUC). Freytag & Sharkey, 2002:
 267 (distr.).

bicornis Linnauori & DeLong

- Parabahita bicornis* Linnavuori & DeLong, 1978c: 204. Type locality: Bolivia, Cochabamba, Chaparea (OSUC).
- caudata* Zanol
Parabahita caudata Zanol, 2001a: 683–685. Type locality: Brazil, Rondonia, Ouro Preto do Oeste (INPA).
- compressa* Linnavuori
Parabahita compressa Linnavuori, 1959: 178. Type locality: Paraguay (ZMUH). Distribution – Brazil, Paraguay.
- cumbresana* Linnavuori & DeLong
Parabahita cumbresana Linnavuori & DeLong, 1978a: 128. Type locality: Panama, Las Cumbres (OSUC). Distribution – Panama, Guyana. Linnavuori & DeLong, 1978c: 204 (note).
- falcata* Linnavuori & Heller
Parabahita falcata Linnavuori & Heller, 1961: 9. Type locality: Peru, Hacienda Mascoitania (SMNS). Lozada, 1992: 29 (distr.).
- igualae* DeLong
Parabahita igualae DeLong, 1980: 70. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).
- lamina* DeLong
Parabahita lamina DeLong, 1982a: 187. Type locality: Bolivia, Santa Cruz, Exper. Sta Saavedra (OSUC).
- lurida* Linnavuori
Parabahita lurida Linnavuori, 1959: 177–178. Type locality: Bolivia, Tipuani (ZMUH).
- palmirensis* Linnavuori
Parabahita palmirensis Linnavuori, 1986: 153. Type locality: Colombia, Palmira (AMNH). Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).
- thalla* DeLong
Parabahita thalla DeLong, 1982a: 188. Type locality: Bolivia, Santa Cruz (OSUC).
- umbrina* (Linnavuori)
Bahita umbrina Linnavuori, 1955: 115. Type locality: Brazil, Rio Grande do Sul (NHW). Metcalf, 1967: 546 (cat.).
- Parabahita umbrina*; Linnavuori, 1959: 178; Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.).
- vezenyii* Linnavuori
Parabahita vezenyii Linnavuori, 1959: 177. Type locality: Argentina, Tucuman (HNHM). Distribution – Peru, Argentina.
- yungasensis* Linnavuori
Parabahita yungasensis Linnavuori, 1959: 178. Type locality: Bolivia, Nor Yungas (MLPA).

Genus *Paracolladonus* Nielson

- Type species, *Idiodonus insculptus* DeLong, 1946 (original designation).
- Paracolladonus* Nielson, 1988: 127.
- insculptus* (DeLong)
Idiodonus insculptus DeLong, 1946a: 25. Type locality: Mexico, Distrito Federal, La Guarda (OSUC). Metcalf, 1967: 1299 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key).
- Paracolladonus insculptus*; Nielson, 1988: 127.

Genus *Paracrassana* Nielson

- Type species, *Idiodonus nigrifrons* DeLong, 1983 (original designation).
- Paracrassana* Nielson, 1988: 132.
- nigrifrons* (DeLong)

Idiodonus nigrifrons DeLong, 1983b: 91. Type locality: Mexico, Puebla, Huanchinango (OSUC). DeLong, 1984a: 11 (key).

Paracrassana nigrifrons; Nielson, 1988: 132; Blocker & Larsen, 1991: 123 (distr., key).

Genus *Paraganus* Linnavuori

Type species, *Paraganus spinosus* Linnavuori, 1955 (original designation).

Paraganus Linnavuori, 1955: 111; Metcalf, 1967: 1241 (in Deltcephalini); Oman *et al.*, 1990: 339 (cat.).

spinosus Linnavuori

Paraganus spinosus Linnavuori, 1955: 111–112. Type locality: Paraguay, Toldo Cue (NHMW). Metcalf, 1967: 1241 (cat.).

Genus *Paralaca* Lozada

Type species, *Paralaca sordida* Lozada, 1998 (original designation).

Paralaca Lozada, 1998: 113–114.

sordida Lozada

Paralaca sordida Lozada, 1998: 114–115. Type locality: Peru, MD, P. V. Pakitza, Zona Reserva del Manu (MUSM).

Genus *Parandanus* Linnavuori & DeLong

Type species, *Parandanus ornatus* Linnavuori & DeLong, 1976 (original designation).

Parandanus Linnavuori & DeLong, 1976: 34; Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman *et al.*, 1990: 239 (in Deltcephalini).

cruciatus Linnavuori & DeLong

Parandanus cruciatus Linnavuori & DeLong, 1979a: 128. Type locality: Bolivia, Cochabamba, Limbo (OSUC).

hilaris Linnavuori & DeLong

Parandanus hilaris Linnavuori & DeLong, 1976: 34. Type locality: Peru, Sinchono, near Tingo Maria (OSUC).

ornatus Linnavuori & DeLong

Parandanus ornatus Linnavuori & DeLong, 1976: 34. Type locality: Peru, Sinchono, near Tingo Maria (OSUC).

Genus *Paranurenus* Nielson

Type species, *Idiodonus latidens* DeLong, 1946 (original designation).

Paranurenus Nielson, 1988: 127–128.

latidens (DeLong)

Idiodonus latidens DeLong, 1946a: 26. Type locality: Mexico, Michoacan, Zitacuaro (OSUC). Metcalf, 1967: 1300 (cat.); DeLong, 1984a: 11 (key).

Paranurenus latidens; Nielson, 1988: 128.

Genus *Paraphlepsius* Baker

Type species, *Paraphlepsius ramosus* Baker, 1897 (original designation).

Paraphlepsius Baker, 1897: 158; Evans, 1947: 237 (listed); Oman, 1949: 139 (redesc.); Crowder, 1952: 371 (rev.); Metcalf, 1967: 578 (cat.); Hamilton, 1975a: 18 (rev.); Hamilton, 1975b: 495 (in Platymetopiina); Oman *et al.*, 1990: 239 (cat.).

Phlepsioides (*Paraphlepsius*); Osborn & Lathrop, 1923: 337; DeLong, 1938b: 243 (note).

Paraphlepsius (Gamarex) Hamilton

Type species, *Jassus fulvidorsum* Fitch, 1851 (original designation).

Paraphlepsius (Gamarex) Hamilton, 1975a: 34.

chepada DeLong

- Paraphlepsius chepada* DeLong, 1982b: 478–479. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Chapada dos Guimaraes (OSUC).
- cinereus* (Van Duzee)
Phlepsius cinereus Van Duzee, 1892c: 68. Type locality: USA, Texas, Aaron (ISUI). Distribution – USA, Cuba, Jamaica.
Phlepsius (Phlepsius) cinereus; Osborn & Lathrop, 1923: 323 (redesc., ill.)
Paraphlepsius cinereus; Oman, 1949: 139 (distr.); Crowder, 1952: 382 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 589 (cat.).
Paraphlepsius (Gamarex) cinereus; Hamilton, 1975a: 36 (*partim*).
continuus (DeLong)
Phlepsius continuus DeLong, 1938b: 239. Type locality: USA, Texas, Brownsville (OSUC). Distribution – USA, Mexico, Guatemala. DeLong, 1939a: 381 (note, distr.), 392 (distr.); DeLong, 1944a: 86 (distr.).
Paraphlepsius continuus; DeLong & Knull, 1937: 42; DeLong & Knull, 1945: 53 (cat.); Oman, 1949: 139 (distr.); Crowder, 1952: 437 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 592 (cat.); Hamilton, 1975a: 48 (listed).
Phlepsius cinereus Van Duzee 1907: 69, *non* Van Duzee, 1892; Hamilton, 1975a: 48 (listed).
Paraphlepsius cinereus; Oman, 1947b: 199; Oman, 1949: 139 (distr.); Crowder, 1952: 382 (redesc. distr.); Metcalf, 1967: 589 (cat.).
Phlepsius fuscipennis turpiculus Ball, 1927: 265, *non* Ball, 1900; Hamilton, 1975a: 48 (*partim*).
Paraphlepsius turpiculus; Crowder, 1952: 435–436 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 653 (cat.);
delongi Hamilton
Paraphlepsius (Gamarex) delongi Hamilton, 1975a: 49. Type locality: Mexico, Vera Cruz, Coatepec (OSUC).
fuscipennis fuscipennis (Van Duzee)
Phlepsius fuscipennis Van Duzee, 1892c: 70. Type locality: USA, New York, New York City (ISUI). Distribution – USA, Cuba.
Paraphlepsius fuscipennis; DeLong & Knull, 1945: 53; Oman, 1947b: 199 (tax.); Oman, 1949: 139 (distr.); Crowder, 1952: 439 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 600 (cat.); Linnauvoori, 1973a: 95 (distr.).
Paraphlepsius (Gamarex) fuscipennis fuscipennis; Hamilton, 1975a: 46.
obvius (Oman)
Phlepsius obvius Oman, 1931: 435. Type locality: USA, Texas, Kingsville (NMNH).
Paraphlepsius obvius; DeLong & Knull, 1945: 54; Oman, 1949: 140 (distr.); Crowder, 1952: 428 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 624 (cat.).
Paraphlepsius (Gamarex) obvius; Hamilton, 1975a: 54.
Phlepsius dampfi DeLong, 1939a: 381. Type locality: Mexico, Nuevo Leon, Granja Exp. Rodriguez (OSUC). DeLong, 1939a: 392 (distr.); Metcalf, 1967: 557 (cat.); Hamilton, 1975a: 54 (syn.).
orthana DeLong & Linnauvoori
Paraphlepsius orthana DeLong & Linnauvoori, 1978: 118–119. Type locality: Bolivia, Santa Cruz, San Esteban (OSUC).

Genus *Paratanus* Young

- Type species, *Atanus exitiosus* Beamer, 1943 (original designation).
Paratanus Young, 1957: 14; Oman *et al.*, 1990: 240 (cat.).
bipunctus DeLong & Cwikla

- Paratanus bipunctus* DeLong & Cwikla, 1984b: 725. Type locality: Bolivia, Santa Cruz (OSUC).
- Paratanus bipunctatus*; DeLong & Cwikla, 1984b: 725 (abstract); Mackamey & Hicks, 2007: 934 (note).
- brevicapitus* Cheng
- Paratanus brevicapitus* Cheng, 1980: 104. Type locality: Paraguay, nr Filadelfia, Mennonite. Sta (SNOW).
- costatus* (DeLong)
- Idiodonus costatus* DeLong, 1983b: 92. Type locality: Bolivia, Santa Cruz (OSUC). DeLong, 1984a: 9 (key).
- Paratanus costatus*; Nielson, 1988: 133.
- exitiosus* (Beamer)
- Atanus exitiosus* Beamer, 1943: 178–179. Type locality: Argentina, Rio Negro Valley (NMNH). Distribution – Brazil, Argentina, Chile. Metcalf, 1967: 1239 (cat.).
- Paratanus exitiosus*; Young, 1957: 14; Linnavuori & DeLong, 1977b: 209 (distr.).
- inermis* Linnavuori
- Paratanus inermis* Linnavuori, 1959: 309. Type locality: Argentina, Entre Ríos, Gualeguaychu (MLPA). Distribution – Brazil, Argentina.
- inermis paraguayensis* Cheng
- Paratanus inermis paraguayensis* Cheng, 1980: 104, 106. Type locality: Paraguay, nr Filadelfia, Mennonite Expt. Sta (SNOW).
- magniceps* Linnavuori
- Paratanus magniceps* Linnavuori, 1959: 307. Type locality: Argentina, Buenos Aires, Pedro Luro (MLPA).
- psidii* Linnavuori
- Paratanus psidii* Linnavuori, 1959: 308–309. Type locality: Venezuela, Los Teques (NMNH).
- rotundiceps* Linnavuori
- Paratanus rotundiceps* Linnavuori, 1959: 310. Type locality: Argentina, Patagonia, Rio Santa Crux (HNHM). Distribution – Argentina, Chile. Linnavuori & DeLong, 1977b: 209 (note, distr.).
- sativae* Young
- Paratanus sativae* Young, 1957: 16. Type locality: Ecuador, Cotopaxi, Lasso (NMNH). Distribution – Guyana, Brazil, Ecuador.
- spinilobus* Linnavuori & DeLong
- Paratanus spiniloba* [sic] Linnavuori & DeLong, 1977b: 209–210. Type locality: Chile, Valvidia, Paillaco (OSUC).
- variegatus* Linnavuori & DeLong
- Paratanus variegatus* Linnavuori & DeLong, 1977b: 210. Type locality: Chile, Santiago, Cerro Robles (OSUC).
- yusti* Young
- Paratanus yusti* Young, 1957: 15. Type locality: Ecuador, Pomasqui (NMNH). Distribution – Colombia, Ecuador, Peru. Linnavuori, 1975b: 10 (distr.); Linnavuori, 1986: 154 (distr.); Lozada, 1992: 29 (distr.); Freytag & Sharkey, 2002: 267 (distr.).
- wygodzinskyi* (Linnavuori)
- Alaca wygodzinskyi* Linnavuori, 1954a: 61. Type locality: Argentina, Tucuman, Bella Vista (AMNH). Distribution – Brazil, Argentina. Linnavuori, 1959: 307; 1961; Metcalf, 1967: 812 (cat.).
- wygodzinskyi recurvatus* Linnavuori, 1959

Paratans wygodzinskyi recurvatus Linnavuori, 1959: 308. Type locality: Argentina, Misiones, Loreto (MNHN). Distribution – Brazil, Argentina. Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.).

Genus *Perubahita* Linnavuori & DeLong

Type species, *Perubahita longifalx* Linnavuori & DeLong, 1978 (original designation). *Perubahita* Linnavuori & DeLong, 1978a: 113–114; Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman et al., 1990: 241 (cat.).

binotata DeLong

Perubahita binotata DeLong, 1984b: 117. Type locality: Argentina, Salta, Embarcacion (OSUC).

confusa DeLong

Perubahita confusa DeLong, 1982a: 184. Type locality: Brazil, Para, Boa Vista, Castanhal (OSUC).

longifalx Linnavuori & DeLong

Perubahita longifal [sic] Linnavuori & DeLong, 1978a: 114. Type locality: Peru, Sinchono (OSUC). Distribution – Brazil, Peru. Lozada, 1992: 29 (distr.).

Perubahita longifalx; Linnavuori & DeLong, 1978a: 109 (abstract); McKamey & Hicks, 2007: 934 (spelling).

ornata Linnavuori & DeLong

Perubahita ornata Linnavuori & DeLong, 1978a: 114–115. Type locality: Peru, Sinchono (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Perundanus* Zanol

Type species, *Perundanus raunoi* Zanol, 1993 (original designation).

Perundanus Zanol, 1993: 616.

raunoi Zanol

Perundanus raunoi Zanol, 1993: 616–618. Type locality: Peru, Cuzco, Madre de Dios (HNHM).

Andanus bimaculatus Linnavuori, 1959: 238 (*partim*).

Genus *Phlepsobahita* Linnavuori

Type species, *Phlepsobahita irrorata* Linnavuori, 1959 (original designation).

Phlepsobahita Linnavuori, 1959: 195; Oman et al., 1990: 242 (cat.).

irrorata Linnavuori

Phlepsobahita irrorata Linnavuori, 1959: 195. Type locality: Argentina, Tucuman (HNHM).

Genus *Premanus* DeLong

Type species, *Premanus hebatus* DeLong, 1944 (original designation).

Premanus DeLong, 1944g: 98; Evans, 1947: 238 (listed); Metcalf, 1967: 547 (cat.); Oman et al., 1990: 244 (cat.).

hebatus DeLong

Premanus hebatus DeLong, 1944g: 98–100. Type locality: Mexico, San Luis de Potosi, Tamazunchale (OSUC). Metcalf, 1967: 547 (cat.).

Genus *Pseudalaca* Linnavuori

Type species, *Agallia multipunctata* Osborn, 1923a (original designation).

Pseudalaca Linnavuori, 1959: 236; Oman et al., 1990: 245 (cat.).

multipunctata (Osborn)

Agallia multipunctata Osborn, 1923a: 10–11. Type locality: Paraguay, Sapucay (CMNH). Metcalf, 1967: 811 (cat.).

Pseudalaca multipunctata; Linnauvori, 1959: 237-238; Zanol & Menezes, 1982: 41 (distr.).

Genus *Pseudaligia* Kramer & DeLong

Type species, *Pseudaligia nigropunctata* Kramer & DeLong, 1968 (original designation) *Pseudaligia* Kramer & DeLong, 1968: 171; Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman *et al.*, 1990: 245 (cat.).

nigropunctata Kramer & DeLong

Pseudaligia nigropunctata Kramer & DeLong, 1968: 171-172. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

Genus *Pseutettix* DeLong

Type species, *Pseutettix mexicana* DeLong, 1967 (original designation).

Pseutettix DeLong, 1967c: 210; Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman *et al.*, 1990: 246 (cat.).

binotata DeLong

Pseutettix binotata DeLong, 1967c: 212. Type locality: Mexico, Chiapas, Vergel (OSUC). *mexicana* DeLong

Pseutettix mexicana DeLong, 1967c: 210-211. Type locality: Mexico, Morelos, Cuernavaca (OSUC).

Genus *Renonus* DeLong

Type species, *Renonus rubraviridus* DeLong, 1959 (original designation).

Renonus DeLong, 1959: 325; Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman *et al.*, 1990: 247 (cat.).

rubraviridus DeLong

Renonus rubraviridus DeLong, 1959: 326. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

Genus *Retusanus* DeLong

Type species, *Retusanus punctatus* DeLong, 1945 (original designation).

Retusanus DeLong, 1945b: 135; Evans, 1947: 238 (listed); Metcalf, 1967: 1657 (in Colladonini); Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note); Oman *et al.*, 1990: 247 (cat.).

apicatus DeLong

Retusanus apicatus DeLong, 1945b: 138-139. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 1658 (cat.).

irroratus DeLong

Retusanus irroratus DeLong, 1945b: 140. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 1658 (cat.).

luteus DeLong

Retusanus luteus DeLong, 1945b: 136, 137. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 1658 (cat.).

pulverus DeLong

Retusanus pulverus DeLong, 1945b: 136. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 1658 (cat.).

punctatus DeLong

Retusanus punctatus DeLong, 1945b: 135. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 1658 (cat.).

Genus *Rinconada* Linnauvori & DeLong

Type species, *Rinconada simplex* Linnauvori & DeLong, 1977 (original designation).

Rinconada Linnnavuori & DeLong, 1977b: 203; Cwikla & Blocker, 1981: 175 (note);
Oman et al., 1990: 248 (cat.).

simplex Linnnavuori & DeLong

Rinconada simplex Linnnavuori & DeLong, 1977b: 203. Type locality: Chile, Santiago,
Rinconada Maipu (OSUC).

Genus *Rineda* Linnnavuori & DeLong

Type species, *Rineda cornuta* Linnnavuori & DeLong, 1978 (original designation).

Rineda Linnnavuori & DeLong, 1978a: 129; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman
et al., 1990: 248 (cat.).

ampla DeLong

Rineda ampla DeLong 1984b: 115. Type locality: Argentina, Santa Fe, Villa Guillermina
(OSUC).

cornuta Linnnavuori & DeLong

Rineda cornuta Linnnavuori & DeLong, 1978a: 129. Type locality: Panama, Darien,
Santa Fe (OSUC).

Genus *Saadevra* McKamey

Type species, *Mesamia fasciata* Osborn, 1923 (original designation).

Saadevra McKamey, 2003b: 448 (nom. nov. pro *Saavedra* Linnnavuori & DeLong,
1978a, non Girault, 1933).

Saavedra Linnnavuori & DeLong, 1978a: 122; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note);
Oman et al., 1990: 248 (cat.).

fasciata (Osborn)

Mesamia fasciata Osborn, 1923b: 47. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH).
Distribution – Colombia, Bolivia.

Menosoma fasciata; Oman, 1936: 379; Linnnavuori, 1959: 185 (redesc.).

Saavedra fasciata; Linnnavuori & DeLong, 1978a: 122.

Saadevra fasciata; McKamey, 2003b: 448.

Genus *Sanestebania* Linnnavuori & DeLong

Type species, *Sanestebania rotundiceps* Linnnavuori & DeLong, 1978 (original
designation).

Sanestebania Linnnavuori & DeLong, 1978a: 130; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note);
Oman et al., 1990: 249 (cat.).

rotundiceps Linnnavuori & DeLong

Sanestebania rotundiceps Linnnavuori & DeLong, 1978a: 130. Type locality: Bolivia,
San Esteban 49 km N Sta Cruz (OSUC).

yacapana DeLong

Sanestebania yacapana [sic] DeLong, 1984b: 116. Type locality: Bolivia, Yacapani
(OSUC).

Genus *Sanuca* DeLong

Type species, *Sanuca badia* DeLong, 1980 (original designation).

Sanuca DeLong, 1980: 66; Oman et al., 1990: 249 (cat.).

badia DeLong

Sanuca badia DeLong, 1980: 66. Type locality: Mexico. Guerrero, Iguala (OSUC).

Genus *Scaphoidula* Osborn

Type species, *Scaphoidula cingulata* Osborn, 1923 (original designation).

Scaphoidula Osborn, 1923b: 41; *Oman*, 1936: 368 (redesc.); *Oman*, 1937: 92–96 (rev.); *Evans*, 1947: 245 (in *Platymetopiini*); *Metcalf*, 1967: 2203 (in *Scaphoideini*); *Zanol*, 1988b: 416 (rev.); *Oman et al.*, 1990: 250 (cat.).

cingulata Osborn

Scaphoidula cingulata Osborn, 1923b: 41. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Distribution – Bolivia, Argentina. *Oman*, 1937: 93–94 (redesc., distr.); *Metcalf*, 1967: 2204 (cat.); *Zanol*, 1988b: 417 (redesc.).

confusa Menezes

Scaphoidula confusa Menezes, 1973: 41. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Botucatu (MZUP). *Zanol & Menezes*, 1982: 42 (distr.); *Zanol*, 1988b: 421 (redesc., distr.).

dentata Oman

Scaphoidula dentata Oman, 1937: 94. Type locality: St Lucia, Castrie (CUIC). Distribution – Brazil, Peru. *Metcalf*, 1967: 2204 (cat.); *Zanol & Menezes*, 1982: 42 (distr.); *Zanol*, 1988b: 419, 421 (redesc., distr.); *Cavichioli & Zanol*, 1991: 59 (distr.).

incisa Oman

Scaphoidula incisa Oman, 1937: 94–95. Type locality: Panama, rio Trinidad (NMNH). Distribution – Panama, Colombia, Guyana, Brazil. *Metcalf*, 1967: 2204 (cat.); *Zanol*, 1988b: 419 (redesc., distr.); *Cavichioli & Zanol*, 1991: 59 (distr.); *Freytag & Sharkey*, 2002: 267 (distr.).

mourei Zanol

Scaphoidula mourei Zanol, 1988b: 422. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Chapada dos Guimaraes (DZUP). Distribution – Brazil, Paraguay.

omani Zanol

Scaphoidula omani Zanol, 1988b: 422. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

rubrocincta Zanol

Scaphoidula rubrocincta Zanol, 1989e: 372. Type locality: Paraguay (BMNH).

spinosa Zanol

Scaphoidula spinosa Zanol, 1988b: 421. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

unica Oman

Scaphoidula unica Oman, 1937: 95–96. Type locality: Brazil, Minas Gerais, Vicoso (NMNH). *Metcalf*, 1967: 204 (cat.); *Zanol & Menezes*, 1982: 42 (distr.); *Zanol*, 1988b: 419 (redesc., distr.).

webbi Zanol

Scaphoidula webbi Zanol, 1997b: 117. Type locality: Brazil, Roraima, Ilha de Maraca, rio PGenus *Mocolinna* McKameya PaGenus *Mocolinna* McKamey. Paricoera (DZUP).

Genus *Serratus* Linnavuori

Type species, *Serratus clypealis* Linnavuori, 1959 (original designation).

Serratus Linnavuori, 1959: 250; *Oman et al.*, 1990: 251 (cat.).

clypealis Linnavuori

Serratus clypealis Linnavuori, 1959: 250. Type locality: Argentina, Tocuman (HNHM).

Genus *Serridonus* Linnavuori

Type species, *Serridonus longistylus* Linnavuori, 1959 (original designation).

Serridonus Linnnavuori, 1959: 181; Oman *et al.*, 1990: 251 (cat.); Zanol, 1997c: 579–587 (rev.).

foersteri Zanol

Serridonus foersteri Zanol, 1997c: 585. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Barra do Tapirape (DZUP).

longistylus Linnnavuori

Serridonus longistylus Linnnavuori, 1959: 181–182. Type locality: Argentina, Formosa (AMNH). Distribution – Brazil, Bolivia, Argentina. Linnnavuori & DeLong, 1978a: 129 (distr.); Zanol & Menezes, 1982: 42 (distr.); Zanol 1997c: 581 (redesc., distr.).

luridus Zanol

Serridonus luridus Zanol, 1997c: 581. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Rubineia (DZUP).

serratus Zanol

Serridonus serratus Zanol, 1997c: 585. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Caceres (DZUP).

Genus *Sinchonoa* Linnnavuori & DeLong

Type species, *Sinchonoa pilosa* Linnnavuori & DeLong, 1978 (original designation).

Sinchonoa Linnnavuori & DeLong, 1978a: 132; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman *et al.*, 1990: 251 (cat.).

machua DeLong

Sinchonoa machua DeLong, 1980:70. Type locality: Peru, Machu Picchu (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

particula (DeLong)

Frequenamia particula DeLong 1982a: 188. Type locality: Panama, Chiriqui, Fortuna (OSUC).

Sinchonoa particula; Zanol, 2004b: 343.

pilosa Linnnavuori & DeLong

Sinchonoa pilosa Linnnavuori & DeLong, 1978a: 132–133. Type locality: Peru, Sinchono (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Spinulana* DeLong

Type species, *Spinulana varigata* DeLong, 1967 (original designation).

Spinulana DeLong, 1967d: 20; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman *et al.*, 1990: 252 (cat.).

spinosa DeLong

Spinulana spinosa DeLong, 1967d: 20. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). varigata DeLong

Spinulana varigata DeLong, 1967d: 21–22. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC).

Genus *Stoneana* DeLong

Type species, *Stoneana marthae* DeLong, 1943 (original designation).

Stoneana DeLong, 1943a: 448; Metcalf, 1967: 1747 (in Synophropsini); Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman *et al.*, 1990: 253 (cat.).

balli DeLong

Stoneana balli DeLong, 1943a: 449. Type locality: Mexico, Cuernavaca-Acapulco road (NMNH). Metcalf, 1967: 1748 (cat.).

marthae DeLong

Stoneana marthae DeLong, 1943a: 448–449. Type locality: Mexico, Cuernavaca-Acapulco road (NMNH). Metcalf, 1967: 1748 (cat.).

separata DeLong

Stoneana separatus [sic] DeLong, 1943a: 450. Type locality: Mexico, Guerrero, Yetia (OSUC). Metcalf, 1967: 1748 (cat.).

Genus *Suarezilinna* McKamey

Type species, *Eutettix reflexus* Osborn, 1923 (original designation).

Suarezilinna McKamey, 2003b: 448 (*nom. nov. pro Suarezia* Linnavuori & DeLong, 1978a, *non* Budde-Lund, 1904).

Suarezia; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman *et al.*, 1990: 254 (cat.).

reflexa (Osborn)

Eutettix reflexus Osborn, 1923b: 55–56. Type locality: Bolivia, Puerto Suarez (CMNH). Metcalf, 1967: 6487 (cat.).

Menosoma reflexa; Linnavuori, 1959: 186.

Suarezia reflexa; Linnavuori & DeLong, 1978a: 121.

Suarezilinna reflexa; McKamey, 2003b: 448.

Genus *Taperinha* Linnavuori

Type species, *Taperinha bifurcata* Linnavuori, 1959 (original designation).

Taperinha Linnavuori, 1959: 188–189; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman *et al.*, 1990: 254 (cat.).

adspersa Linnavuori & DeLong

Taperinha adspersa Linnavuori & DeLong, 1978a: 131. Type locality: Bolivia, Sta Cruz, Estacion Experimental Saavedra (OSUC). Distribution – Brazil, Peru, Bolivia.

albinoi Zanol

Taperinha albinoi Zanol, 1988a: 415. Type locality: Brazil, Rondonia, Vilhena (DZUP). *assurinia* Zanol

Taperinha assurinia Zanol, 2004d: 240. Type locality: Brazil, Para, Tucurui (rio Tocantins, Chiqueirao) (MPEG).

bifurcata Linnavuori

Taperinha bifurcata Linnavuori, 1959: 190. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Chapada dos Guimaraes (NMNH). Distribution – Guyana, Brazil, Peru, Bolivia. Linnavuori & Heller, 1961: 9 (distr.); Zanol & Menezes, 1982: 42 (distr.); Loazada, 1992: 29 (distr.).

brunneopicta Zanol

Taperinha brunneopicta Zanol, 1988a: 412. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

compta Zanol

Taperinha compta Zanol, 2004d: 338. Type locality: Brazil, Rondonia, Ariquemes (DZUP)

concinna Zanol

Taperinha concinna Zanol, 2004d: 338. Type locality: Brazil, Amazonas, Querari (INPA).

dentata Zanol

Taperinha dentata Zanol, 1988a: 415. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

discigutta Linnavuori

Taperinha discigutta Linnavuori, 1959: 189. Type locality: Brazil, Para, Santarem (Faz. Taperinha) (NHMW). Zanol & Menezes, 1982: 42 (distr.).

excavata Zanol

Taperinha excavata Zanol, 1989c: 256. Type locality: Guyana, Confluence of Orenoque and New Rivers (BMNH).

flavescens Zanol

Taperinha flavescens Zanol, 1988a: 412. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

freytagi Zanol

Taperinha freytagi Zanol, 2004d: 431–342. Type locality: Acre, Porto Acre (Humaitá) (MPEG).

kijaua Zanol

Taperinha kijaua Zanol, 2004d: 338. Type locality: Brazil, Amazonas, Parque Nacional do Jaú (Seringal) (INPA).

maculata Zanol

Taperinha maculata Zanol, 1989c: 255. Type locality: Peru, San Jose, 40 mi W. Pucallpa, 300 m. (CASC). Distribution – Brazil, Peru. Lozada, 1992: 29 (distr.).

manauara Zanol

Taperinha manauara Zanol, 2004d: 337–338. Type locality: Brazil, Amazonas, Manaus (INPA).

marinonii Zanol

Taperinha marinonii Zanol, 1997d: 625–627. Type locality: Brazil, Paraná, Fenix (DZUP). Distribution – Brazil, Paraguay.

monticola Linnauvori & DeLong

Taperinha monticola Linnauvori & DeLong, 1978a: 131. Type locality: Peru, Sinchono (OSUC). Distribution – Brazil, Peru. Cavichioli & Zanol, 1991: 60 (distr.); Lozada, 1992: 29 (distr.).

ourensis Zanol

Taperinha ourensis Zanol, 2004d: 342. Type locality: Brazil, Rondonia, Ouro Preto do Oeste (DZUP).

punctata Linnauvori

Taperinha punctata Linnauvori, 1959: 190. Type locality: Costa Rica, Farm Hamburg near Reventazon (ZMUH). Distribution – Costa Rica, Nicaragua, Panama. Maes *et al.*, 1999: 43 (distr.).

pupejua Zanol

Taperinha pupejua Zanol, 2004d: 341. Type locality: Brazil, Amazonas, Coari (DZUP).

rugosa Zanol

Taperinha rugosa Zanol, 1988a: 411–412. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

simillima Linnauvori & DeLong

Taperinha simillima Linnauvori & DeLong, 1978a: 131. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49 km N. Sta. Cruz (OSUC). Distribution – Brazil, Bolivia.

tefeigua Zanol

Taperinha tefeigua Zanol, 2004d: 339. Type locality: Brazil, Amazonas, Tefe (DZUP).

Genus *Tenuisanus* DeLong

Type species, *Tenuisanus costatus* DeLong, 1944 (original designation).

Tenuisanus DeLong, 1944h: 73; Evans, 1947: 239 (listed); Metcalf, 1967: 177 (in Synophropini); Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman *et al.*, 1990: 255 (cat.).

costatus DeLong

Tenuisanus costatus DeLong, 1944h: 73–74. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 1747 (cat.).

Genus *Texananus* Ball

Type species, *Phlepsius mexicanus* Ball, 1918 (original designation).

Phlepsius (Texananus) Ball, 1918: 384.

Texananus; DeLong & Caldwell, 1937: 43; Evans, 1947: 239 (listed); DeLong & Hershberger, 1949: 173 (note, key); Oman, 1949: 141 (redesc., key); Crowder, 1952: 318 (key, rev.); Linnavuori, 1959: 199 (redesc., key); Metcalf, 1967: 658 (cat.); Hamilton, 1975b: 496 (in Playmetopiina); Oman *et al.*, 1990: 256 (cat.); McKamey, 2000: 214 (note., tax.).

Phlepsius (Zioninus) Ball, 1918: 388. Type species, *Phlepsius extremus* Ball, 1901 (original designation). DeLong, 1938b: 244 (note); Oman, 1949: 141 (listed); Crowder, 1952: 318 (listed); McKamey, 2000: 214 (listed).

Zioninus; Evans, 1947: 240.

Texananus (Aridanus) DeLong & Hershberger, 1949: 173. Type species, *Phlepsius areolatus* Baker, 1898 (original designation). Crowder, 1952: 318 (syn.); Metcalf, 1967: 705 (cat.); McKamey, 2000: 214 (listed).

Texananus (Iowanus) Ball

Type species, *Texananus (Iowanus) handlirschi* Ball, 1918 (original designation).

Phlepsius (Iowanus) Ball, 1918: 382.

Texananus (Iowanus); Oman, 1949: 142; Crowder, 1952: 363–364 (redesc, key); Linnavuori, 1959: 200 (tax.); Metcalf, 1967: 691 (cat.); McKamey, 2000: 215–219 (redesc., tax., key).

Iowanus; Evans, 1947: 234; DeLong & Hershberger, 1948a: 107–108 (note, key).

apicalis DeLong & Hershberger

Iowanus apicalis DeLong & Hershberger, 1948a: 114. Type locality: Mexico, Guerrero, Mexcala (OSUC). Distribution – Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Panama.

Texananus (Iowanus) apicalis; Oman, 1949: 142; Metcalf, 1967: 692 (cat.); McKamey, 2000: 217–218 (note, distr.).

Texananus (Iowanus) apicalis contaminatus Linnavuori, 1959: 201. Type locality: Venezuela, Distrito Federal, Caracas. (NMNH). McKamey, 2000: 217 (*partim*).

Texananus copalanus DeLong & Martinson, 1973a: 202. Type locality: Mexico, Sinaloa, Copala (OSUC). Maes *et al.*, 1999: 43 (distr.); McKamey, 2000: 217 (syn.).

contaminatus Linnavuori

Texananus (Iowanus) apicalis f. contaminatus Linnavuori, 1959: 201.

Localidade-tipo, Venezuela, Caracas (NMNH).

Texananus (Iowanus) contaminatus; McKamey, 2000: 218.

handlirschi (Ball)

Phlepsius (Iowanus) handlirschi Ball, 1918: 383. Type locality: Mexico, Guerrero, Omilteme (NHW). Osborn & Lathrop, 1923: 348 (redesc., distr.).

Texananus handlirschi; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939b: 390 (distr.).

Iowanus handlirschi; DeLong & Hershberger, 1948a: 112.

Texananus (Iowanus) handlirschi; Metcalf, 1967: 694 (cat.); McKamey, 2000: 219 (tax, distr.)

Texananus (Texananus) Ball

Texananus (Texananus); DeLong & Hershberger, 1949: 174–175; Oman, 1949: 141 (tax., distr.); Crowder, 1952: 319–323 (key); Linnavuori, 1959: 200 (key); Metcalf, 1967: 663 (cat.); McKamey 2000: 219 (tax.).

areolatus (Baker)

Phlepsius areolatus Baker, 1898b: 30. Type locality: Mexico, Monterrey (NMNH).

Texananus areolatus; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939a: 389 (note), 396 (distr.); DeLong, 1944b: 235 (distr.).

- Texananus (Aridanus) areolatus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; Metcalf, 1967: 705 (cat.).
- Texananus (Texananus) areolatus*; Oman, 1949: 141; Crowder, 1952: 336 (redesc., distr.); McKamey, 2000: 219 (tax, distr.).
- barbus* DeLong
- Texananus barbus* DeLong, 1944b: 229. Type locality: Mexico, Michoacan, Zacapu(6,500ft) (OSUC). Metcalf, 1967: 660 (cat.).
- Texananus (Texananus) barbus*; McKamey, 2000: 212.
- biacus* DeLong
- Texananus biacus* DeLong, 1939a: 389. Type locality: Mexico, Sonora, Hermosillo (OSUC). DeLong, 1944b: 236 (distr.); Metcalf, 1967: 660 (cat.).
- Texananus (Texananus) biacus*; McKamey, 2000: 219.
- bilicum* DeLong
- Texananus bilicum* DeLong, 1944b: 232. Type locality: Mexico, Michoacan, Zacapu (6,500-7500ft) (OSUC). Metcalf, 1967: 660 (cat.).
- Texananus (Texananus) bilicum*; McKamey, 2000: 212.
- cajaensis* Linnauori
- Texananus (Texananus) cajaensis* Linnauori, 1959: 200. Type locality: Costa Rica, San Jose, San Jose (NHMW). McKamey, 2000: 220 (distr.).
- curtus* DeLong
- Texananus curtus* DeLong, 1939a: 384. Type locality: Mexico, Guerrero (OSUC). DeLong, 1944b: 233 (distr.).
- Texananus (Texananus) curtus*; Metcalf, 1967: 667 (cat.); McKamey, 2000: 220 (distr.).
- cuspidatus* DeLong
- Texananus cuspidatus* DeLong, 1939a: 382. Type locality: Mexico, Chiapas, Vejucu, Rio Balsas (OSUC). DeLong, 1944b: 228 (redesc.); Metcalf, 1967: 661 (cat.).
- Texananus (Texananus) cuspidatus*; McKamey, 2000: 220.
- elongatus* (Ball)
- Phlepsius (Iowanus) elongatus* Ball, 1918: 382. Type locality: Mexico, Guerrero, Amula (NHMW).
- Texananus elongatus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939a: 390 (distr.); DeLong, 1944b: 238 (distr.).
- Iowanus elongatus*; DeLong & Hershberger, 1948a: 108.
- Texananus (Iowanus) elongatus*; Metcalf, 1967: 693 (cat.).
- Texananus (Texananus) elongatus*; McKamey, 2000: 221.
- hosanus* (Ball)
- Phlepsius (Texananus) hosanus* Ball, 1918: 386. Type locality: Mexico, Guerrero (OSUC). Osborn & Lathrop, 1923: 343 (redesc., distr.).
- Texananus hosanus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939a: 396 (distr.); DeLong, 1944b: 235 (distr.); Metcalf, 1967: 661 (cat.).
- Texananus (Texananus) hosanus*; McKamey, 2000: 215.
- mexicanus* (Ball)
- Phlepsius (Texananus) mexicanus* Ball, 1918: 385. Type locality: Mexico, Orizaba, Chilpancingo (NMNH). Osborn & Lathrop, 1923: 341 (redesc., distr.).
- Texananus mexicanus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939a: 390 (redesc.), 397 (distr.); DeLong, 1944b: 237 (distr.).
- Texananus (Texananus) mexicanus*; Oman, 1949: 142 (distr.); Crowder, 1952: 334 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 678 (cat.); McKamey, 2000: 222 (distr.).
- ovatus* (Van Duzee)

- Phlepsius ovatus* Van Duzee, 1892c: 79. Type locality: USA, Texas (ISUI). Distribution – USA, Mexico. Van Duzee, 1984b: 298 (distr.).
- Phlepsius (Texananus) ovatus*; Ball, 1918: 387; Osborn & Lathrop, 1923: 341 (redesc., distr.).
- Texananus ovatus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939a: 383 (distr., note); DeLong, 1944b: 229 (note).
- Texananus (Texananus) ovatus*; DeLong Hershberger, 1949: 182; Oman, 1949: 142 (distr.); Crowder, 1952: 344 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 680 (cat.); McKamey, 2000: 222 (distr.).
- pergradus* DeLong
- Texananus pergrada* [sic] DeLong, 1938c: 185. Type locality: USA, New Mexico, Jemez Springs (OSUC). Distribution – USA, Mexico.
- Texananus (Texananus) pergradus*; DeLong & Hersberger, 1949: 184; Oman, 1949: 142 (distr.); Crowder, 1952: 343 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 682 (cat.); McKamey, 2000: 222 (distr.).
- serrellus* DeLong
- Texananus serrellus* DeLong, 1944b: 229. Type locality: Mexico, Guerrero, Mexcala (2,500 ft) (OSUC). Metcalf, 1967: 663 (cat.).
- Texananus (Texananus) serrellus*; McKamey, 2000: 212.
- spatulatus* (Van Duzee)
- Phlepsius spatulatus* Van Duzee, 1892c: 78–79. Type locality: USA, Texas, “Aaron” (ISUI). Distribution – USA, Mexico, Cuba. Van Duzee 1894b: 298 (distr.).
- Texananus spatulatus*; DeLong & Caldwell, 1937: 44; DeLong, 1939a: 389 (note, distr.), 396 (distr.); DeLong, 1944b: 235 (distr.).
- Iowanus spatulatus*; DeLong & Hershberger, 1948a: 114.
- Texananus (Texananus) spatulatus*; Oman, 1949: 142 (distr.); Crowder, 1952: 324 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 685 (cat.); McKamey, 2000: 223 (distr.).
- superbus* (Van Duzee)
- Phlepsius superbus* Van Duzee, 1892c: 81. Type locality: USA, North Carolina (ISUI). Distribution – USA, Mexico. Van Duzee, 1894b: 297 (distr.); Van Duzee, 1923: 184 (distr.).
- Phlepsius (Texananus) superbus*; Ball, 1918: 385; Osborn & Lathrop, 1923: 339 (redesc., ill.); Crowder, 1952: 331 (redesc., distr.).
- Texananus superbus*; DeLong & Caldwell, 1937: 43; DeLong, 1939a: 384 (redesc., distr.), 393 (distr.); DeLong, 1944b: 233 (note).
- Texananus (Texananus) superbus*; DeLong & Hershberger, 1949: 178; Oman, 1949: 142 (distr.); Crowder, 1952: 331 (redesc.); Metcalf, 1967: 688 (cat.); McKamey, 2000: 223 (note, distr.).
- uncinatus* DeLong
- Texananus uncinatus* DeLong, 1944b: 232. Type locality: Mexico, Michoacan, Carapan (500-7,500ft) (OSUC). Metcalf, 1967: 663 (cat.).
- Texananus (Texananus) uncinatus*; McKamey, 2000: 212.
- uncus* DeLong
- Texananus uncus* DeLong, 1944b: 233. Type locality: Mexico, Distrito Federal, Mexico City (900ft). (OSUC). Metcalf, 1967: 663 (cat.).
- Texananus (Texananus) uncus*; McKamey, 2000: 212.
- vermiculatus* DeLong
- Texananus vermiculatus* DeLong, 1938a: 42. Type locality: USA, Arizona (OSUC). Distribution – USA, Mexico. DeLong, 1939a: 383 (redesc., distr.); DeLong, 1939a: 383 (redesc., distr.); DeLong, 1944b: 232 (distr.).

Texananus (Texananus) vermiculatus; DeLong & Hershberger, 1949: 178; Oman, 1949: 142 (distr.); Crowder, 1952: 328 (redesc., distr.) ; Metcalf, 1967: 690 (cat.); McKamey, 2000: 223 (distr.).

Genus *Tingolix* Linnnavuori & DeLong

Type species, *Tingolix piperatus* Linnnavuori & DeLong, 1978 (original designation).
Tingolix Linnnavuori & DeLong, 1978b: 235; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman et al., 1990: 257 (cat.).

piperatus Linnnavuori & DeLong

Tingolix piperatus Linnnavuori & DeLong, 1978b: 235. Type locality: Peru, Tingo Maria, Monson Valley (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Tingopyx* Linnnavuori & DeLong

Type species, *Tingopyx ramosus* Linnnavuori & DeLong, 1978b (original designation).
Tingopyx Linnnavuori & DeLong, 1978b: 228; Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman et al., 1990: 257 (cat.).

ramosus Linnnavuori & DeLong

Tingopyx ramosus Linnnavuori & DeLong, 1978b: 229. Type locality: Peru, Tingo Maria, Monson Valley (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Tropicanus* DeLong

Type species, *Allygus costomaculatus* Van Duzee, 1894 (original designation).

Phlepsius (Tropicanus) DeLong, 1944a: 87.

Tropicanus; DeLong & Knull, 1945: 5; Oman, 1949: 144 (redesc.); Linnnavuori, 1959: 201–202 (redesc., key); Metcalf, 1967: 569 (cat.); Hamilton, 1975b: 496 (in (Platymetopiinae));

Oman et al., 1990: 258 (cat.); Zanol, 2006e: 1251-1255 (redesc., tax., distr.).

Tropicanus (Cabimanus) Linnnavuori

Type species, *Phlepsius singularis* DeLong, 1944 (original designation).

Tropicanus (Cabimanus) Linnnavuori, 1959: 204.

singularis (DeLong)

Phlepsius (Tropicanus) singularis DeLong, 1944a: 92. Type locality: Mexico, Chiapas, Vergel (OSUC). Distribution – Mexico, Panama.

Tropicanus singularis; Metcalf, 1967: 572.

Tropicanus (Cabimanus) singularis; Linnnavuori, 1959: 204. Zanol, 2006e: 1252 (tax., distr.).

Tropicanus (Tropicanus) DeLong

Tropicanus (Tropicanus); Linnnavuori, 1959: 201.

amazonicus Zanol

Tropicanus (Tropicanus) amazonicus Zanol, 2006e: 1252. Type locality: Brazil, Amapa, Curau (DZUP)

annulatus (Osborn)

Phlepsius annulatus Oborn 1923b: 61–62. Type locality: Brazil, Para (CMNH). Metcalf, 1967: 555 (cat.).

Tropicanus (Tropicanus) annulatus; Linnnavuori, 1959: 203. Zanol & Menezes, 1982: 42 (distr.); Cavichioli & Zanol, 1991: 60 (distr.); Zanol, 2006e: 1252 (tax., distr.).

appendiculatus Zanol

Tropicanus appendiculatus Zanol, 1991a: 83. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Cuiaba (DZUP).

bicornis Linnauvori

Tropicanus (Tropicanus) bicornis Linnauvori, 1959: 203. Type locality: Argentina, Corrientes, Manantiales (MLPA). Zanol, 2006e: 1252 (tax., distr.).

Tropicanus bicornis; Cheng, 1980: 66 (distr.).

caldwelli (DeLong)

Phlepsius (Tropicanus) caldwelli DeLong, 1944a: 92. Type locality: Mexico, San Luis de Potosi, Tamazunchale (OSUC).

Tropicanus caldwelli; Metcalf, 1967: 569 (cat.).

calidus (DeLong)

Phlepsius (Tropicanus) calidus DeLong, 1944a: 90. Type locality: Mexico, Tamaulipas, Santa Engracia (OSUC). Distribution – Mexico, Guatemala.

Tropicanus calidus; Metcalf, 1967: 569 (cat.).

Tropicanus (Tropicanus) calidus; Linnauvori, 1959: 203. Zanol, 2006e: 1251 (tax., distr.).

chapadensis Zanol

Tropicanus (Tropicanus) chapadensis Zanol, 2006e: 1255. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Chapada dos Guimaraes (Colegio Agricola Buriti) (DZUP).

chiapas Zanol

Tropicanus chiapas Zanol, 1991a: 82. Type locality: Mexico, Chiapas, Villa las Rosas (BMNH).

Tropicanus (Tropicanus) chiapas; Zanol, 2006e: 1252.

costomaculatus (Van Duzee)

Allygus costomaculatus Van Duzee, 1894b: 294. Type locality: USA, Texas Aaron (ISUI). Distribution – USA, Guatemala, Brazil.

Eutettix costomaculata; Ball, 1901b: 48.

Phlepsius costomaculatus; DeLong, 1939a: 391.

Phlepsius (Tropicanus) costomaculatus; DeLong, 1944a: 88.

Phlepsius (Dixianus) costomaculatus; Ball, 1918: 388.

Tropicanus costomaculatus; DeLong & Knull, 1945: 54. Oman, 1949: 144 (distr.); Crowder, 1952: 462 (redesc., distr.); Metcalf, 1967: 569 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 42 (distr.).

Tropicanus (Tropicanus) costomaculatus; Linnauvori, 1959: 202. Zanol, 2006e: 1251 (tax., distr.).

Phlepsius pulchripennis Baker, 1898c: 65. Type locality, USA, Delta Railroad, 8mi Baltimore (coll. Uhler). DeLong, 1944a: 88 (syn.).

Phlepsius (Dixianus) pulchripennis; Osborn & Larthrop, 1923: 316-17 (redesc, ill.).

Tropicanus pulchripennis; Oman, 1949: 144; Metcalf, 1967: 571 (cat.).

digitus (DeLong)

Phlepsius (Tropicanus) digitus DeLong 1944a: 89. Type locality: Mexico, Morelos, Jiutepec (OSUC).

Tropicanus digitus; Metcalf, 1967: 571 (cat.).

Tropicanus (Tropicanus) digitus; Zanol, 2006e: 1251.

flectus (DeLong)

Phlepsius (Tropicanus) flectus DeLong, 1944a: 88. Type locality: Mexico, Guerrero, Mexcala (OSUC). Distribution – Mexico, Nicaragua, Panama.

Tropicanus (Tropicanus) flectus; Linnauvori, 1959: 203.

Tropicanus flectus; Metcalf, 1967: 571 (cat.).

Tropicanus (Tropicanus) flectus; Linnauvori, 1959: 203. Zanol, 2006e: 1252 (tax., distr.).

irroratus Zanol

Tropicanus irroratus Zanol, 1991a: 79. Type locality: Mexico, Vera Cruz, Cordoba (CASC).

- Tropicanus (Tropicanus) irroratus*; Zanol, 2006e: 1252.
lisiei Zanol
Tropicanus (Tropicanus) lisei Zanol, 2006e: 1255. Type locality: Brazil, Roraima, Normandia (INPA).
mexicanus Zanol
Tropicanus mexicanus Zanol, 1991a: 82. Type locality: Mexico, Vera Cruz (CASC).
Tropicanus (Tropicanus) mexicanus; Zanol, 2006e: 1252.
punctatus (Osborn)
Eutettix punctatus Osborn, 1923b: 50. Type locality: Bolivia, Quatro Ojos (CMNH).
Phlepsius punctatus; Metcalf, 1967: 565.
Menosoma punctata; Linnauvori, 1959: 185.
Tropicanus punctatus; Linnauvori & DeLong, 1977a: 561.
Tropicanus (Tropicanus) punctatus; Linnauvori & DeLong, 1977a: 561. Zanol, 2006e: 1252 (tax., distr.).
taulipangus Zanol
Tropicanus (Tropicanus) taulipangus Zanol, 2006e: 1252. Type locality Brazil, Roraima, rio Uraricoera, Ilha de Maraca (INPA).

Genus *Usanus* DeLong

- Type species, *Usanus stonei* DeLong, 1947 (monotypy).
Usanus DeLong, 1947b: 110; Metcalf, 1967: 1025 (in *Acinopterini*); Cwikla & Blocker, 1981: 176 (note); Oman *et al.*, 1990: 259 (cat.).
stonei DeLong
Usanus stonei DeLong, 1947b: 110–111. Type locality: Mexico, Guerrero, Iguala (OSUC). Metcalf, 1967: 1025 (cat.).

Genus *Virgana* DeLong & Thambimuttu

- Type species, *Virgana* *herbida* DeLong & Thambimuttu (original designation).
Virgana DeLong & Thambimuttu, 1973: 167, 169; Cwikla & Blocker, 1981: 177 (note); Oman *et al.*, 1990: 259 (cat.); Zahniser & Webb, 2004: 670 (key).
herbida DeLong & Thambimuttu
Virgana *herbida* DeLong & Thambimuttu, 1973: 169. Type locality: Chile, Malleco, Angol (OSUC).
maculata DeLong & Thambimuttu
Virgana *maculata* DeLong & Thambimuttu, 1973: 169. Type locality: Chile, Arauco, Contulo (OSUC).

Genus *Yungasia* Linnauvori

- Type species, *Yungasia digitata* Linnauvori, 1959 (original designation).
Yungasia Linnauvori, 1959: 207; Oman *et al.*, 1990: 261 (cat.).
bidentata Zanol
Yungasia bidentata Zanol, 1989d: 1–2. Type locality: Brazil, Parana, Umuarama (DZUP).
coroicoa Linnauvori & DeLong
Yungasia coroicoa Linnauvori & DeLong, 1976: 32. Type locality: Bolivia, Coroico (OSUC).
digitata Linnauvori
Yungasia digitata Linnauvori, 1959: 207–208. Type locality: Bolivia, Nor Yungas (MLPA). Distribution – Brazil, Bolivia. Zanol & Menezes, 1982: 42 (distr.).
falcata Linnauvori
Yungasia falcata Linnauvori, 1959: 208–209. Type locality: Ecuador (ZMUH). Distribution – Ecuador, Peru; Lozada, 1992: 29 (distr.).

fulmina Zanol

Yungasia fulmina Zanol, 1991b: 191. Type locality: Colombia, Cundinamarca, Finca Bella (CASC).

longipennis Linnauvori & DeLong

Yungasia longipennis Linnauvori & DeLong, 1976: 32. Type locality: Peru, Machu Picchu (OSUC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

lurida Zanol

Yungasia lurida Zanol, 1991b: 188. Type locality: Colombia, Cundinamarca, Finca Bella (CASC).

ornata Linnauvori & Heller

Yungasia ornata Linnauvori & Heller, 1961: 10. Type locality: Peru, Hacienda Mascoitania. (SMNS).

peruana Zanol

Yungasia peruana Zanol, 1991b: 187-188. Type locality: Peru, Cajamarca (BMNH).

pungens Linnauvori & DeLong

Yungasia pungens Linnauvori & DeLong, 1976: 32. Type locality: Bolivia, San Esteban, 49 km N. Sta Cruz, 1120ft (OSUC).

serrata Linnauvori & Heller

Yungasia serrata Linnauvori & Heller, 1961: 9. Type locality: Peru, Caras, 2200m (SMNS). Lozada, 1992: 29 (distr.).

tricolor Zanol

Yungasia tricolor Zanol, 1991b: 191. Type locality: Ecuador, 6-12 mi SW Banos (2500-3000m N. Slope of Mt Tungurahua) (CASC).

trispinosa Linnauvori

Yungasia trispinosa Linnauvori, 1959: 208. Type locality: Peru (NMNH). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Yuraca* Linnauvori & DeLong

Type species, *Yuraca flavomarginata* Linnauvori & DeLong, 1978 (original designation).

Yuraca Linnauvori & DeLong, 1978b: 231; Cwikla & Blocker, 1981: 177 (note); Oman et al., 1990: 261 (cat.).

aureola Zanol

Yuraca aureola Zanol, 1990: 807-809. Type locality: Brazil, Mato Grosso, Sinop (DZUP).

flavomarginata Linnauvori & DeLong

Yuraca flavomarginata Linnauvori & DeLong, 1978b: 231. Type locality: Peru, Yurac, 67 mi E of Tingo Maria (CASC). Lozada, 1992: 29 (distr.).

Genus *Zabrosa* Oman

Type species, *Thamnotettix amazonensis* Osborn, 1923 (original designation).

Zabrosa Oman, 1949: 128. Metcalf, 1967: 1330 (in Colladonini); Hamilton, 1975b: 496 (in Platymetopiina); Oman et al., 1990: 261 (cat.).

amazonensis (Osborn)

Thamnotettix amazonensis Osborn, 1923b: 65. Type locality: Brazil, Chapada (CMNH).

Brazosa amazonensis; Oman, 1936: 386.

Zabrosa amazonensis; Oman, 1949: 128; Metcalf, 1967: 1330 (cat.); Zanol & Menezes, 1982: 42 (distr.).

aquareza Linnauvori & DeLong

Zabrosa aquareza Linnauvori & DeLong, 1978c: 206. Type locality: Argentina, Salta, Aquarez (OSUC).

unicampi Menezes

Zabrosa unicampi Menezes, 1973: 134. Type locality: Brazil, Sao Paulo, Campinas (MZSP).

Zanol & Menezes, 1982: 42 (distr.).

INCERTAE SEDIS

- Alebra dorsalis* Gillette, 1898: 173. Type locality: Brazil, Chapada. (NMNH). Young, 1952: 31 (near genus *Atanus*); Linnnavuori, 1959: 325 (*incertae sedis*).
Atanus dorsalis; Metcalf, 1967: 1238.
Eutettix mimicus Osborn, 1924: 414-415. Type locality: Bolivia, Provincia del Sara (CMNH). Linnnavuori, 1959: 326 (*incertae sedis*); Metcalf, 1967: 480 (cat.).
Idiodonus copulus DeLong, 1946a: 16. Type locality: Mexico, Michoacan, Carapan (OSUC). Metcalf, 1967: 1290 (cat.); Nielson, 1988: 134 (*incertae sedis*).
Idiodonus edentulus DeLong, 1946a: 25. Type locality: Mexico, D.F., Rio Frio (10300ft) (OSUC). Metcalf, 1967: 1289 (cat.); Nielson, 1988: 134 (*incertae sedis*).
Idiodonus excavatus DeLong, 1946a: 27. Type locality: Mexico, Hidalgo, Zimapan (OSUC). Metcalf, 1967: 1298 (cat.); Nielson, 1988: 134 (*incertae sedis*).
Thamnotettix clypeatus Osborn, 1924: 420. Type locality: Bolivia, Province del Sara (CMNH). Linnnavuori, 1959: 326-327 (*incertae sedis*); Metcalf, 1967: 739 (cat.).
Thamnotettix fessulus Van Duzee, 1907: 70. Type locality: Jamaica, Mandeville (CASC). Linnnavuori, 1959: 327 (*incertae sedis*); Metcalf, 1967: 757 (cat.).
Thamnotettix reitteratus Baker, 1925: 347 (*nom. nov. pro Thamnotettix chapadensis* Osborn, 1924, *non* Osborn, 1923). Type locality: Brazil, Chapada (CMNH). Linnnavuori, 1959: 326 (*incertae sedis*); Metcalf, 1967: 772 (cat.).

RESUMO

O catálogo da tribo Athysanini (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) da região Neotropical é apresentado. Os gêneros (127), espécies (659) e oito espécies *incertae sedis* são registradas em ordem alfabética. Após o nome de cada espécie, dados sobre a localidade tipo, abreviação da instituição na qual o holótipo está depositado, sinônimos, distribuição geográfica e referências bibliográficas são adicionados.

PALAVRAS CHAVES: Catálogo, Cicadellidae, Deltocephalinae, Athysanini, Neotropical.

SUMMARY

A catalogue of the tribe Athysanini (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) of the Neotropical region is presented. The genera (127), species (659) and eight species *incertae sedis* are listed in alphabetical order. After each species-group name, data on the type locality, the acronym of the institution where the type is deposited, synonyms, geographical distribution and bibliographical references are provided.

KEY WORDS: Catalogue, Cicadellidae, Deltocephalinae, Athysanini, Neotropical.

RÉSUMÉ

Le catalogue des Athysanini (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) de la région Néotropicale c'est présente. Les genres (127), espèces (659) et espèces *incertae sedis* (8) sont mentionnées en ordre alphabétique.

Après les taxons nominaux du niveau espèce, indications sur les localités type, abréviation de tout établissement où déposés des holotypes, les synonymes, leur distribution géographiques et références bibliographiques sont additinners.

MOTS CLÉS: Catalogue, Cicadellidae, Deltoccephalinae, Athysanini, Néotropique.

BIBLIOGRAPHY

- BAKER, C. F. 1895. VI. New Homoptera received from the New Mexico Agricultural Experiment Station – I. *Psyche* 7 (suppl. 1): 12-14.
- BAKER, C. F. 1897. Some new and little known Dorydini (Jassinae). *Can. Ent.* 29 (6): 157-159.
- BAKER, C. F. 1898a. Notes on *Chlorotettix*, with some new species. *Can. Ent.* 30 (8): 219-220.
- BAKER, C. F. 1898b. Four new species of *Phlepsius*. *Can. Ent.* 30 (2): 30-32.
- BAKER, C. F. 1898c. Five new species of *Phlepsius*. *Ent. News* 9 (3): 65-67.
- BAKER, C. F. 1923. Comparison of Neotropical and Paleotropical insects faunae. *P. J. Sci.* 23: 531-532.
- BAKER, C. F. 1925. Nomenclatorial notes on Jassoidea. *P. J. Sci.* 30: 347.
- BALL, E. D. 1900a. Additions to the western jassid fauna. *Can. Ent.* 32 (11): 337-347.
- BALL, E. D. 1900b. Some new Jassidae from the southwest. *Can. Ent.* 32 (7): 200-205.
- BALL, E. D. 1901a. New Jassidae from the Rocky Mountain and Pacific Region. *Can. Ent.* 33 (1): 4-11.
- BALL, E. D. 1901b. New Jassidae from the Rocky Mountain and Pacific Region. *Can. Ent.* (2): 45-51.
- BALL, E. D. 1907. The genus *Eutettix* with especial reference to *E. tenella*, the beet leafhopper: a taxonomic, biologic and economic study of the North American forms. *Proc. Dav. Acad. Sci.* 12: 27-94, plates I-IV.
- BALL, E. D. 1911. Additions to the jassid fauna of N. A. (Homoptera). *Can. Ent.* 43 (6): 197-204.
- BALL, E. D. 1918. The phlepsids of Mexico and Central America (Homoptera, Cicadellidae). *Ann. Entomol. Soc. Am.* 11 (4): 381-391.
- BALL, E. D. 1927. Notes on the phlepsids of the subgenus *Phlepsius* (Rhynchota, Homoptera). *Can. Ent.* 49 (2): 262-265.
- BALL, E. D. 1929. A supplemental revision of the gênero *Athysanus* in North America (Homoptera: Cicadellidae). *Trans. Amer. Entomol. Soc.* 55: 1-8.
- BALL, E. D. 1931a. Some new genera and species of leafhoppers related to *Eutettix* Van Duzee (Rhynchota, Homoptera). *Fla Ent.* 15 (1): 1-6.
- BALL, E. D. 1931b. Some new genera and species of leafhoppers related to *Mesamia* Ball. *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 26 (2): 91-95.
- BALL, E. D. 1931c. New species of *Phlepsius* with notes on others (Homoptera, Cicadellidae) *Pan-Pacific Ent.* 8 (2): 85-89.

- BALL, E. D. 1933. Some new genera and species of western leafhoppers. *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 28 (5): 223-228.
- BALL, E. D. 1936a. Some new genera of leafhoppers related to *Thamnotettix*. *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 31 (1): 57-60.
- BALL, E. D. 1936b. Some new leafhoppers related to *Thamnotettix*. *J. Wash. Acad. Sci.* 26 (10): 430-434.
- BALL, E. D. 1936c. The food of the leafhoppers of the genus *Exitianus*. *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 31 (2): 71-72.
- BALL, E. D. 1937. Some new species of leafhoppers in group recently segregated from *Thamnotettix*. *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 32 (1): 26-31.
- BEAMER, R. H. 1943. A new *Atanus* from Argentina, South America (Homoptera: Cicadellidae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 45 (7): 178-179.
- BERG, C. 1879. Hemiptera Argentina. *An. Soc. Cien. Argen.* 8: 241-272.
- BERG, C. 1884a. Addenda et emendanda ad Hemiptera Argentina. *An. Soc. Cien. Argen.* 7: 20-41.
- BERG, C. 1884b. Addenda et emendanda ad Hemiptera Argentina. *An. Soc. Cien. Argen.* 17: 97-118.
- BLIVEN, B. P. 1955. Notes on *Colladonus* complex in the redwood empire (Hemiptera, Homoptera, Cicadellidae). *Studies on insects of the redwood empire* 1: 1-7, pls I-II.
- BLOCKER, H. D. & K. J. LARSEN. 1991. A new leafhoppers genus, *Cocrassana* (Homoptera: Cicadellidae), from Mexican Tripsacinae and a synopsis of related genera. *J. Kans. Entomol. Soc.* 64 (2): 123-126.
- BLOCKER, H. D. & Q. FANG. 1992. A synopsis of the *Faltala* group (Homoptera: Cicadellidae) with descriptions of new taxa. *J. Kans. Entomol. Soc.* 65 (3): 341-346.
- BONFILS, J. & A. DELPLANQUE. 1871. Distribution des principales cicadelles des prairies aux Antilles Françaises (Homoptera). *An. Zool. Écol. anim.* 3 (2): 135-150.
- BROWN, W. F., 1933. The genus *Chlorotettix* in America North north of Mexico. (Homoptera-Cicadellidae). *Univ. Kans. Sci. Bull.* 21 (4): 235-254.
- CALDWELL, J. S. & L. F. MARTORELL. 1952. Review of the auchenorynchous Homoptera of Puerto Rico. Part 1: Cicadellidae. *J. Agric. Univ. P. R.* 34: 1-132.
- CAVICHIOLI, R. R. & K. M. R ZANOL. 1991. Espécies de Cicadellinae, Deltoccephalinae (Homoptera: Cicadellidae) da ilha de Maracá, Roraima. *Acta Am.* 21: 55-61.
- CHENG, Y. J. 1980. New leafhopper taxa (Homoptera: Cicadellidae) from Paraguai. *J. Kans. Entomol. Soc.* 53 (1): 61-118.
- CROWDER, H. W. 1952. A revision of some phlepsiuslike genera of the tribe Deltoccephalini (Homoptera, Cicadellidae) in North America of Mexico. *Univ. Kans. Sci. Bull.* 35 (3): 309-541, plates 45-81.
- CRUMB, S. A. 1915. Some new species of Jassoidea. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 8 (2): 189-198.
- CWIKLA, P. S. 1988. A new genus, *Ileopeltus*, related to *Chlorotettix* (Homoptera, Cicadellidae). *Great Basin Natur. Mem.* 12: 43-60.

- CWIKLA, P. S. & D. H. BLOCKER. 1981. Neotropical genera of Deltocephalinae not included in Linnavuori's 1959 keys. *Bull. Entomol. Soc. Am.* 27 (3): 170-178.
- CWIKLA, P. S. & P. H. FREYTAG. 1982. Three new leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae) from Cocos Island. *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 84 (3): 632-635.
- DELONG, D. M. 1918. A synopsis of the genus *Chlorotettix*. *Ohio S. Univ. Bull.* 23 (15): 1-29; 2 pls.
- DELONG, D. M. 1924. Some new Cicadellidae (Homoptera) from the southern United States. *J. N. Y. Entomol. Soc.* 32 (1): 63-69.
- DELONG, D. M. 1937a. Six new species of *Graminella* and *Chlorotettix* (Homoptera, Cicadellidae) from the eastern United States. *Ent. News* 48 (2): 50-54.
- DELONG, D. M. 1937b. The genus *Chlorotettix* (Homoptera Cicadellidae); some notes on synonymy. *Pan-Pacific Ent.* 13 (1-2): 34-35.
- DELONG, D. M. 1938a. Some new species of *Texananus* and *Phlepsius* from the United States. *Ohio J. Sci.* 38 (1): 41-44.
- DELONG, D. M. 1938b. The genus *Phlepsius*. A study of the North America species with special reference to the characters of the male genitalia. *Lloydia* 1; 232-252, pls I-VIII.
- DELONG, D. M. 1938c. Three new species of *Texananus*. *Pan-Pacific Ent.* 14 (4): 185-187.
- DELONG, D. M. 1939a. Fauna Mexicana - II. (Insecta, Homoptera, familia Cicadellidae, genus *Phlepsius*). Los phlepsidios (*Phlepsius* y *Texananus*) de Mexico (Homoptera-Cicadellidae). *An. Esc. Nac. Cien. Biol.* 1 (3-4): 379-405.
- DELONG, D. M. 1939b. The *Texananus* (Homoptera, Cicadellidae) species of the *Majestus* group, with descriptions of four new species. *Ohio J. Sci.* 39 (4): 235-238.
- DELONG, D. M. 1941. A new genus (*Omanana*) and six new species of leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae) from Mexico. *Lloydia* 4 (4): 293-299.
- DELONG, D. M. 1943a. A new genus – *Stoneana* – and three new species of Mexican leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). *Ann. Entomol. Soc. Am.* 36 (3): 448-450.
- DELONG, D. M. 1943b. A new genus, *Artucephalus*, and a new species of Mexican leafhoppers. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 36 (4): 654-655.
- DELONG, D. M. 1944a. The Mexican species of *Phlepsius* (Homoptera: Cicadellidae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 46 (4): 85-94.
- DELONG, D. M. 1944b. The mexican species of leafhoppers of the genus *Texananus* (Homoptera: Cicadellidae). *J. Wash. Acad. Sci.* 34 (7): 228-239
- DELONG, D. M. 1944c. The genus *Ollarianus* (Homoptera: Cicadellidae) in North America, including Mexico. *J. Wash. Acad. Sci.* 34 (12): 391-398.
- DELONG, D. M. 1944d. The genus *Menosoma* (Homoptera, Cicadellidae) and a new genus *Spathanus* (Homoptera, Cicadellidae). *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 39 (5): 157-160.
- DELONG, D. M. 1944e. A new genus *Mexicananus* and species of leafhopper from Mexico related to *Phlepsius* and *Texananus*. *Ohio J. Sci.* 44 (2): 89-90.
- DELONG, D. M. 1944f. Some new Mexican species of *Omanana* (Homoptera: Cicadellidae). *Ent. News* 55 (6): 151-158.

- DeLONG, D. M. 1944g. A new genus -*Premanus*- and species of Mexican leafhopper related to *Omanana*. *Pan-Pacific Ent.* 20 (3): 98-100.
- DeLONG, D. M. 1944h. A new genus -*Tenuisanus* - and species of Mexican leafhoppers (Homoptera, Cicadellidae). *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 39 (3): 73-74.
- DeLONG, D. M. 1945a. The genus *Chlorotettix* (Homoptera-Cicadellidae) in Mexico. *Lloydia* 8 (1): 1-30, plates 1-5.
- DeLONG, D. M. 1945b. A new genus -*Retusanus* – and five new species of Mexican leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). *Pan-Pacific Ent.* 21 (4): 135-140.
- DeLONG, D. M. 1946a. The Mexican species of *Idiodonus* (Homoptera: Cicadellidae). *Ohio J. Sci.* 46 (1): 13-30.
- DeLONG, D. M. 1946b. A new genus (*Excavanus*) and species of mexican leafhoppers related to *Acunasus* (Homoptera: Cicadellidae). *Ann. Entomol. Soc. Am.* 34 (3): 446-447.
- DeLONG, D. M. 1946c. A new genus (*Costamia*) and species of Mexican leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). *Ann. Entomol. Soc. Am.* 34 (1): 82-83.
- DeLONG, D. M. 1947a. A new genus (*Frequenamia*) and species of Mexican leafhopper related to *Mesamia* (Homoptera, Cicadellidae). *Bull. Brooklyn Entomol. Soc.* 42 (2): 63-64.
- DeLONG, D. M. 1947b. A new genus *Usanus* and new species of Mexican leafhoppers related to *Chlorotettix*. *Pan-Pacific Ent.* 23 (3): 110-111.
- DeLONG, D. M. 1959. A new genus, *Renonus*, and two new species of Mexican leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). *Ohio J. Sci.* 59 (6): 325-326.
- DeLONG, D. M. 1967a. *Devolana*, new genus of Mexican Deltcephalinae, and a new species of *Devolana* (Homoptera: Cicadellidae). *Ohio J. Sci.* 67 (1): 22-23.
- DeLONG, D. M. 1967b. Studies of the Mexican Deltcephalinae: a new genus, *Conversana*, and three new species. *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 69 (3): 266-269.
- DeLONG, D. M. 1967c. *Pseutettix*, a new genus and two new species of Mexican Deltcephalinae (Homoptera: Cicadellidae). *Pan-Pacific Ent.* 43 (3): 210-212.
- DeLONG, D. M. 1967d. *Spinulana*, new genus of Mexican Deltcephalinae and two new species of *Spinulana* (Homoptera, Cicadellidae). *Ohio J. Sci.* 67 (1): 20-22.
- DeLONG, D. M. 1978. The genus *Atanus* (Homoptera: Cicadellidae) in North America. *J. Kans. Entomol. Soc.* 51 (3): 484-491.
- DeLONG, D. M. 1980. New genera and species of Mexican and South Amer. Deltcephaline leafhoppers (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Rev. Per. Entomol.* 23 (1): 63-71.
- DeLONG, D. M. 1982a. New Central and South American leafhopper of the “*Bahita*” group (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 84 (1): 184-190.

- DeLONG, D. M. 1982b. New or little known South American Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) with description of a new genus, *Sincholata*. *Brenesia* 19-20: 477-485.
- DeLONG, D. M. 1983a. New species of Bolivian *Osbornellus* and *Chlorotettix* (Homoptera: Cicadellidae: Deltocephalinae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 84 (2): 331-334.
- DeLONG, D. M. 1983b. New species and distribution notes of Mexican and Bolivian *Idiodonus* (Homoptera: Cicadellidae). *Ent. News* 94 (3): 89-92.
- DeLONG, D. M. 1984a. A revised key to the *Idiodonus* (Homoptera: Cicadellidae) of Mexico and Bolivia. *Ent. News* 95 (1): 9-15.
- DeLONG, D. M. 1984b. New leafhoppers of the "Bahita" group (Homoptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) from Central and South America. *Brenesia* 22: 115-122.
- DeLONG, D. M. & J. S. CALDWELL. 1937. Check list of the Cicadellidae (Homoptera) of America, north of Mexico. *Ohio S. Univ.* 1937: 93pp.
- DeLONG, D. M. & P. S. CWIKLA. 1984a. A new genus and species of deltocephaline leafhoppers from Panama (Homoptera, Cicadellidae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 84 (2): 432-434.
- DeLONG, D. M. & P. S. CWIKLA. 1984b. New Neotropical Deltocephalinae (Homoptera: Cicadelliae). *J. Kans. Entomol. Soc.* 57 (4): 725-728.
- DeLONG, D. M. & H. J. HARLAN. 1968. Studies of the Mexican Deltocephalinae: new species of *Eutettix* and two allied new genera (Homoptera: Cicadellidae). *Ohio J. Sci.* 68 (3): 139-152.
- DeLONG, D. M. & R. V. HERSHBERGER. 1947a. A new genus and species of leafhopper from Central America related to *Atanus* (Homoptera: Cicadellidae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 84 (8): 231-232.
- DeLONG, D. M. & R. V. HERSHBERGER. 1947b. The genus *Exitianus* in North America including Mexico. *Ohio J. Sci.* 47 (3): 107-116, 2pls.
- DeLONG, D. M. & R. V. HERSHBERGER. 1947c. A new genus (*Crassana*), new subgenus (*Macrassana*) and new species of North American leafhoppers. *Pan-Pacific Ent.* 23 (2): 76-78.
- DeLONG, D. M. & R. V. HERSHBERGER. 1947d. The genus *Mesamia* in Mexico. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 40 (2): 257-265, 2 pls.
- DeLONG, D. M. & R. V. HERSHBERGER. 1948a. A synopsis of the genus *Iowanus* in North America including Mexico. *Ohio J. Sci.* 48 (3): 107-115, 3 pls.
- DeLONG, D. M. & R. V. HERSHBERGER. 1948b. A new genus, *Dampfiana*, and a new species of leafhopper related to *Stoneana* (Homoptera: Cicadellidae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 50 (9): 229-230.
- DeLONG, D. M. & R. V. HERSHBERGER. 1949. A review of the North American species of *Texananus* (Homoptera-Cicadellidae) north of Mexico. *Ohio J. Sci.* 49 (5): 173-187, 5 pls.
- DeLONG, D. M. & D. J. KNULL. 1945. Checklist of the Cicadellidae (Homoptera) of America, North of Mexico. *Ohio S. Univ., Biol. Sci. Ser.* 1-102.
- DeLONG, D. M. & R. LINNAVUORI. 1978. Studies on Neotropical leafhoppers (Homoptera, Cicadellidae). *Entomol. Scand.* 9 (2): 111-123.
- DeLONG, D. M. & R. LINNAVUORI. 1979. Six new species of Deltocephalini leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae) from Mexico and Brazil. *Brenesia* 16: 169-174.

- DeLONG, D. M. & C. MARTINSON. 1973a. A new species of *Texananus* (Homoptera: Cicadellidae). *Ent. News* 84: 202-204.
- DeLONG, D. M. & C. MARTINSON. 1973b. A new genus, *Desertana*, and two new species of Chilean leafhoppers belonging to the Deltoccephalinae (Homoptera: Cicadellidae). *Ohio J. Sci.* 73 (2): 125-127.
- DeLONG, D. M. & C. MARTINSON. 1974a. New species of *Chlorotettix* (Homoptera: Cicadellidae) from Argentina, Bolivia, Brazil and Mexico. *J. Kans. Entomol. Soc.* 47 (2): 261-267.
- DeLONG, D. M. & C. MARTINSON. 1974b. A new genus, *Ancudana*, and two new species of Chilean leafhoppers belonging to the Deltoccephalinae (Homoptera: Cicadellidae). *Ohio J. Sci.* 74 (4): 261-263.
- DeLONG, D. M. & H. H. P. SEVERIN. 1950. *Texananus incurvatus* I. Taxonomy. *Hilgardia* 19 (18): 541-543.
- DeLONG, D. M. & C. THAMBIMUTTU. 1973. Three closely related new genera and five new species of short-winged Chilean leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). *Fla Ent.* 56 (3): 165-172.
- EMELJANOV, A. F. 1966. On the tribe Stirellini trib. n. and its taxonomic position (Homoptera, Cicadellidae). *Zool. Zh.* 45: 609-610.
- EVANS, J. W. 1947. A natural classification of leaf-hoppers (Jassoidea, Homoptera). *Trans. R. Entomol. Soc. Lon.* 98: 105-271.
- FITCH, A. 1851. Catalogue with references and descriptions of the insects collected and arranged for the State Cabinet of Natural History. *S. Cab. Nat. Hist. Ann. Rpt* 4: 43-69.
- FREYTAG, P. H. & J. M. MAES. 1977. Nuevos reportes de Cicadellidae (Homoptera) para la fauna de Nicaragua. *Rev. Nic. Entomol.* 40: 29-43.
- FREYTAG, P. H. & M. J. SHARKEY. 2002. A preliminary list of the leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae) of Colombia. *Biota Colombiana* 3 (2): 235-283.
- GIBSON, E. H. 1919. Five new species of Jassoidea from Honduras (Hemiptera: Homoptera). *Proc. Biol. Soc. Wash.* 32: 25-28.
- GILLETTE, C. P. 1898. American leafhoppers of the subfamily Typhlocybynae. *Proc. Nat. Mus.* 20 (1138): 709-773.
- GILLETI, C. P. & C. F. BAKER. 1895. A preliminary list of the Hemiptera of Colorado. *Colorado Agr. Exp. Bull.* 31: 1-137.
- GODOY, C. 2004. A new species of *Ileopeltus* Cwikla from Costa Rica (Cicadellidae, Deltoccephalinae). *Zootaxa* 608: 1-4.
- HAMILTON, K. G. A. 1975a. Revision of the genera *Paraphlepsius* Baker and *Pendarus* Ball (Rhynchota: Homoptera: Cicadellidae). *Mem. Entomol. Soc. Can.* 96: 1-129, figs 1-277.
- HAMILTON, K. G. A. 1975b. Review of the tribal classification of the leafhoppers subfamily Aphrodinae (Deltoccephalinae of authors) of the Holartic region (Rhynchota, Homoptera, Cicadellidae). *Can. Ent.* 107 (5): 437-498.
- HEPNER, L. W. 1942. A revision of the genus *Aligia* (Homoptera Cicadellidae). *Univ. Kans. Sci. Bull.* 28 (8): 145-185, pls XI-XIII.
- HIDALGO-GATO, M. 2000. Dos nuevas especies de cicadélidos (Homoptera: Cicadellidae) y registro del género *Neocrassana* Linnauori, 1959, para Cuba. *Avicennia* 12/13: 127-131.

- HIDALGO-GATO, M. & R. RODRÍGUES-LEÓN. 2000. Los homópteros (Homoptera: Auchenorrhyncha) de la Cordillera de Guaniguanico, Cuba. *Brenesia* 54: 51-60.
- JENSEN-HAARUP, A. C. 1922. Hemipterological notes and descriptions II. *Ent. Med.*, 14: 1-16.
- KAMITANI, S. 1999. The phylogeny of the genera in the tribe Deltoccephalini, Paralimnini, and their allies (Homoptera, Cicadellidae, Deltoccephalinae). *Esakia* 39: 65-108.
- KNULL D. J. 1946. The genus *Bandara* Ball (Homoptera, Cicadellidae). *Ann. Entomol. Soc. Am.* 39(2): 259-264.
- KOCAK, A. O. 1981. Two replacement names for the genera of Homoptera. *Priamus* 1 (3): 124-125.
- KRAMER, J. P. & D. M. DELONG. 1968. Studies of the Mexican Deltoccephalinae: *Aligia* and some new allied genera and species (Homoptera: Cicadellidae). *Ohio J. Sci.* 68 (3): 169-175.
- LINNAVUORI, R. 1954a. Contributions to the Neotropical leafhopper fauna of the family Cicadellidae I. *An. Ent. Fenn.* 20 (2): 59-64.
- LINNAVUORI, R. 1954b. Contributions to the Neotropical leafhopper fauna of the family Cicadellidae II. Stål's and Osborn's Neotropical leafhopper species. *An. Ent. Fenn.* 20 (3): 124-145.
- LINNAVUORI, R. 1955. Contributions to the Neotropical leafhopper fauna of the family Cicadellidae IV. *An. Ent. Fenn.* 21 (2-3): 100-129.
- LINNAVUORI, R. 1956. Neotropical Homoptera of the Hungarian National Museum and some other European museums. *An. Ent. Fenn.* 22 (1): 5-35.
- LINNAVUORI, R. 1959. Revision of the Neotropical Deltoccephalinae and some related subfamilies. *An. Zool. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo* 20 (1): 1-370.
- LINNAVUORI, R. 1973a. A collection of leafhoppers (Hom., Cicadellidae) from Cuba. *An. Ent. Fenn.* 39 (2): 94-97.
- LINNAVUORI, R. 1973b. Additional notes on the Cicadellidae fauna of Peru. *Rev. Per. Entomol.* 16 (1): 14-16.
- LINNAVUORI, R. 1975a. Studies on Neotropical Deltoccephalinae (Homoptera, Cicadellidae). *Notulae Entomol.*, 55 (2): 49-52.
- LINNAVUORI, R. 1975b. Studies on the Cicadellidae fauna of Peru. *Rev. Per. Entomol.* 18 (1): 10.
- LINNAVUORI, R. 1986. Contribución al conocimiento de la fauna Colombiana de cicadelidos. *Agricultura Tropical* 24 (3): 147-156.
- LINNAVUORI, R. & D. M. DELONG. 1976. New Neotropical leafhoppers from Peru and Bolivia (Homoptera: Cicadellidae). *Rev. Per. Entomol.* 19 (1): 29-38.
- LINNAVUORI, R. & D. M. DELONG. 1977a. New deltocephaline leafhoppers from Central America (Homoptera: Cicadellidae) and illustrations of some Osborn Bolivian species. *J. Kans. Entomol. Soc.* 50 (4): 558-568.
- LINNAVUORI, R. & D. M. DELONG. 1977b. The leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae) known from Chile. *Brenesia* 12-13: 163-267.
- LINNAVUORI, R. & D. M. DELONG. 1978a. Neotropical leafhoppers of the *Bahita* group (Homoptera, Cicadellidae, Deltoccephalinae). A contribution to the taxonomy. *Brenesia* 14-15: 109-169.
- LINNAVUORI, R. & D. M. DELONG. 1978b. Some new or little known Neotropical Deltoccephalinae (Homoptera: Cicadellidae). *Brenesia* 14-15: 227-247.

- LINNAUORI, R. & D. M. DELONG. 1978c. Seventeen new species and three new genera of Central and South American Deltocephalini (Homoptera: Cicadellidae). *Brenesia* 14-15: 195-226.
- LINNAUORI, R. & D. M. DELONG. 1979a. New species of leafhoppers from Central and South America (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae, Neobalinae, Xestocephalinae). *Entomol. Scan.* 10 (2): 123-138.
- LINNAUORI, R. & D. M. DELONG. 1979b. Additional notes on the Biturritidae and Cicadellidae (Homoptera) of Chile. *Brenesia* 16: 189-196.
- LINNAUORI, R. & F. HELLER. 1961. Beitrag zur Cicadelliden-Fauna von Peru. *St. Beitr. Naturk.* 67: 1-14.
- LOZADA, P. 1992. Cicadellidae (Homoptera) registrados para el Peru. I: Xestocephalinae, Agalliinae y Deltocephalinae. *Rev. Per. Entomol.* 35: 27-30.
- LOZADA, P. 1998. Two new genera of Neotropical Deltocephalinae (Insecta: Homoptera:Cicadellidae) related to *Alaca Oman*. *Rev. Per. Biol.* 5 (2): 113-117.
- MAES, J. M. & C. GODOY. 1993. Catalogo de los Cicadellidae (Homoptera) de Nicaragua. *Rev. Nicar. Entomol.* 24: 5-34.
- MAES, J. M., C. GODOY & P. FREYTAG. 1999. Nuevos reportes de Cicadellidae (Homoptera) de Nicaragua. *Rev. Nicar. Entomol.* 49: 9-46.
- MALDONADO-CAPRILES, J. 1968. A new genus and species of Deltocephalinae from Puerto Rico (Homoptera: Cicadellidae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 70 (1): 35-37.
- MCKAMEY, S. H. 2000. A review of the New World leafhopper subgênero *Texananus* (*Iowanus* Ball) (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) with a checklist and distribution summary for species in the genus. *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 102 (1): 212-224.
- MCKAMEY, S. H. 2003a. Review of the New World lefhpoper genus *Exultanus* Oman (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 105(2): 292-299.
- MCKAMEY, S. H. 2003b. Some new generic names in the Cicadellidae (Hemiptera: Deltocephalinae, Selenocephalinae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 105 (2): 447-451.
- MCKAMEY, S. H. & A. L. HICKS. 2007. A new subspecies, replacement names, and spelling fixations for species of Deltocephalinae and Macropsinae. *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 109 (4): 930-937.
- MELICHAR, M. D. L. 1911. Collections recueillies par M. M. de Rothschild dans l'Afrique Orientale. Homoptères. *Bull. Mus. Nat. H. Nat.* 17: 106-117.
- MEDLER, J. T. 1942. The leafhoppers of Minnesota. Homoptera: Cicadellidae. *Univ. Minn. Agric. Exp. S., Tech. Bull.* 155: 196 pp, 9pls.
- MENEZES, M. DE. 1973. Notas sobre Deltocephalinae da região Neotropical (Homoptera, Cicadellidae). *Revta bras. Ent.* 17 (20): 131-136.
- MENEZES, M. DE. 1975. Notas sobre o gênero *Neomesus* Linnauori (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). *Revta bras. Ent.* 19 (3): 133-137.
- METCALF, Z. P. 1946. Homoptera. Fulgoroidea and Jassoidea of Guam. *B. P. Bishop Mus. Bull.* 189: 105-148, figs 1-30.

- METCALF, Z. P. 1954. Homoptera from the Bahamas islands. *Amer. Mus. Novitates* 1698: 1-46.
- METCALF, Z. P. 1966. *General Catalogue of the Homoptera. Fascicle VI, Cicadelloidea, Part 15. Issidae*, 229 pp. Agricultural Research Service, U. S. Dept. Agric., Washington, D. C.
- METCALF, Z. P. 1967. *General Catalogue of the Homoptera. Fascicle VI, Cicadelloidea, Part 10. Euscelidae, Section I-III*, 2695 pp. Agricultural Research Service, U. S. Dept. Agric., Washington, D. C.
- NAST, J. 1972. *Palaearctic Auchenorrhyncha (Homoptera): An annotated check list*. Polish Academy of Science., Institute of Zoology, Polish Scientific Publisher, Warsaw, 550pp.
- NIELSON, M. W. 1957. A revision of the genus *Colladonus* (Homoptera: Cicadellidae). *U. S. Dept Agric., Tec. Bul.* 1156: 1-52, 13pls.
- NIELSON, M. W. 1966. A synopsis of the genus *Colladonus* (Homoptera: Cicadellidae). *J. Kans. Entomol. Soc.* 39 (2): 333-336.
- NIELSON, M. W. 1968. *The leafhoppers vectors of phytopathogenic viruses (Homoptera, Cicadellidae). Taxonomy, biology, and transmition*. U. S. Dept. of Agric. *Tec. Bull.* 1382: 386pp.
- NIELSON, M. W. 1988. *Colladonus* and related genera of Mexico and Central America with new taxa and synonymy (Homoptera: Cicadellidae). *Great Basin Natur. Mem.* 12: 103-134.
- OMAN, P. W. 1931. New Jassinae, with notes on other species. *J. Wash. Acad. Sci.* 21 (17): 430-436.
- OMAN, P. W. 1936. A generic revision of american Bythoscopinae and South American Jassinae. *Bull. Univ. Kans.* 37 (14): 343-420, pl 27-35.
- OMAN, P. W. 1937. The leafhoppers of the *Scaphoidula* (Homoptera: Cicadellidae). *Revta Ent.* 7 (1): 92-96.
- OMAN, P. W. 1946. Checklist of the Cicadellidae (Hemiptera) of America, North of Mexico. *J. N. Y. Entomol. Soc.* 54 (3): 262-263.
- OMAN, P. W. 1947a. Miscellaneous notes on Cicadellidae (Homoptera). *J. N. Y. Entomol. Soc.* 55 (1): 59-63.
- OMAN, P. W. 1947b. The types of achenorrhynchos Homoptera in the Iowa State College collection. *Iowa S. Col. J. Sci.* 21 (2): 161-228.
- OMAN, P. W. 1949. The Nearctic leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). A generic classification and check list. *Mem. Entomol. Soc. Wash.* 3: 1—253, +44pls
- OMAN, P. W., W. J. KNIGHT & M. W. NIELSON. 1990. *Leafhoppers (Cicadellidae): A bibliography, generic checklist and index to the world literature 1956-1985*, 368 pp. CAB International.
- OSBORN, H. 1900. The genus *Scaphoideus*. *J. Cinc. Soc. Nat. Hist.* 19: 187-209.
- OSBORN, H. 1909. Notes on Guatemalan Hemiptera with descriptions of a few new species. *Ohio Natur.* 9 (5): 457-466.
- OSBORN, H. 1923a. I. Neotropical Homoptera of the Carnegie Museum. *Ann. Car. Mus.* 15 (1): 8-26, pls 1-3.
- OSBORN, H. 1923b. II. Neotropical Homoptera of the Carnegie Museum. Part 2. Records and descriptions of five new genera and sixty-five new species of the subfamily Jassinae. *Ann. Car. Mus.* 25 (1): 27-79.

- OSBORN, H. 1924. Neotropical Homoptera of the Carnegie Museum. Parts 4. Report upon the collection in the subfamily Bythoscopinae, with descriptions of new species. *Ann. Car. Mus.* 15: 383-462.
- OSBORN, H. 1926a. Faunistic and ecological notes on Cuban Homoptera. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 19 (3): 335-366.
- OSBORN, H. 1926b. V. Neotropical Homoptera of the Carnegie Museum. Parts 5. Report upon the collections in the subfamily Cicadellinae with description of new species. *Ann. Car. Mus.* 16 (2): 155-237, plates XI-XII.
- OSBORN, H. 1935. Insects of Porto Rico and the Virgin Islands Homoptera (excepting the Sternorrhynchi). *Scence Survey, Puerto Rico and Virgin Islands* 14: 111-260, figs 1-71.
- OSBORN , H. & E. D. BALL. 1896. Contributions to the hemipterous fauna of Iowa. *Proc. Iowa Acad. Sci.* 4: 172-234, pls. 19-26.
- OSBORN, H. & E. D. BALL. 1898. Studies of North American Jassoidea. New species, dimorphic forms, and early stages of Jassidae. *Proc. Dav. Acad. Sci.* 7: 74-100, pls 4-6.
- OSBORN , H. & E. D. BALL. 1902. A review of the North American species of *Athysanus* (Jassidae). *Ohio Natur.* 2 (6): 231-256.
- OSBORN, H. & F. H. LATHROP. 1923. The genus *Phlepsius* in North America (Homoptera). *Ann. Entomol. Soc. Am.* 16 (4) : 310-350, pls 22-23.
- PARADELL, S & A. M. M. REMES LENICOV. 2005. Redescription of *Clorindaia hecaloides* Linnavuori, 1975, and distribution in the Argentina Republic (Hemiptera, Cicadellidae). *Bull. Soc. Entomol. Fr.* 110 (2): 133-136.
- RIBAUT, H. 1942. Demembrement des genres *Athysanus* Burm. et *Thamnotettix* Zett. [Homoptera-Jassidae]. *Bull. Soc. Hist. Natur.* 77: 259-270.
- ROSS, H. H. 1968. The evolution and dispersal of the grassland leafhopper genus *Exitianus*, with key to the Old World species (Cicadellidae, Hemiptera). *Bull. B. Mus. (Nat. Hist.)* 22 (1): 1-30.
- RUFFINELLI, A. 1970. Contribucion al conocimiento de los homopteros auquenorrincos del Uruguay. *Publ. Tec.* 1, Ser. Zool. Agr.: 1-25.
- SANDERS, J. G. & D. M. DeLONG. 1922. New species of Cicadellidae (Homoptera) from the eastern and southern United States. *Proc. Entomol. Soc. Wash.* 24 (4): 93-100, pls 11-12.
- SEVERIN, H. H. P. 1950. *Texananus incuvatus* III. Life history on virus infected and on healthy plants. *Higarda* 19 (18): 546-549, 1 pl.
- SEVERIN, H. H.P. & E. KLOSTERMEYER. 1950. *Colladonus geminatus* and *C. montanus*. Life histories on virus-infected and on healthy plants. *Hilgarda* 19 (18): 553-560, 1 pl.
- SIGNORET, M. V. 1879. Essai sur les Jassides Stal, Fieb. et plus particulièrement sur les acocepalides Puton. *An. Soc. Ent. Fr.* 9 (5): 259-280.
- SOUTHWICK, J. F. 1892. Notes on local Jassidae. *Science* (485): 287-288.
- STÅL, C. 1854. Nya Hemiptera –Följande af studenten Carl Stål författade uppsats meddelades af Hr Boherman. *Öfv. K. Vetensk. Förh.* 11 (8): 231-255.
- STÅL, C. 1855. Hemiptera från Kafferlandet. *S. Vetensk. Akad. Öfv. Förh.* 12: 89-100.

- STÅL, C. 1859. Hemiptera. Species novas descriptsit. Kongliga svenska Fregatten Eugenies resa omkring jorden under befäl af C. A. Virgin ären 1851-1853. vetenskapliga iakttagelser På H. Maj:t Konung Oscar den Förstes befallning utgifna. *K. Svensk. Vetensk Akad. Zool.* 4: 219-298, pls 3-4.
- STÅL, C. 1862. Bidrag till Rio Janeiro-trakten Hemipterfauna. *K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl.* 3 (6): 1-75.
- STÅL, C. 1864. Hemiptera Mexicana enumeravit speciesque novas descriptsit. *Ent. Ztung* 1864 (1-3): 49-86.
- UHLER, P. R. 1880. Remarks on a new form of jassid. *Amer. Ent.* 3: 72-73.
- UHLER, P. R. 1877. Report upon the insects collected by P. R. Uhler during the explorations of 1875, including monographs of the families Cydnidae and Saldae and the Hemiptera collected by A. S. Packard, Jr. *Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Ter.* 3 (2): 355-475, pls 27
- VAN DUZEE, E. P. 1890. New North American Homoptera. *Can. Ent.* 22 (6): 110-112
- VAN DUZEE, E. P. 1892a. The North American Jassidae allied to *Thamnotettix*. *Psyche* 6 (196): 305-310.
- VAN DUZEE, E. P. 1892b. New North America Homoptera. V. *Can. Ent.* 24 (10): 266-268.
- VAN DUZEE, E. P. 1892c. A revision of the North American species of *Phlepsius*. *Trans. Amer. Entomol. Soc.* 19: 63-82.
- VAN DUZEE, E. P. 1894a. Descriptions of some new North American homopterous insects. *Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci.* 5: 205-216.
- VAN DUZEE, E. P. 1894b. A catalogue of the described Jassoidea of North America. *Trans. Amer. Entomol. Soc.* 21: 245-317.
- VAN DUZEE, E. P. 1907. Notes on Jamaican Hemiptera: a report on a collection of Hemiptera made on the island of Jamaica in the spring of 1906. *Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci.* 8 (5): 3-79.
- VAN DUZEE, E. P. 1916. Suborder Homoptera Latr. 1810. Section Auchenorrhyncha A. & S. 1843. Check list of Hemiptera (excepting the Aphididae, Aleurodidae, and Coccidae) of America North of Mexico. 1916: i-xi, 1-111.
- VAN DUZEE, E. P. 1917. Catalogue of the Hemiptera of America North of Mexico excepting the Aphididae, Aleurodidae, and Coccidae. *Cal. Agric. Exp. S., Entomol. Tec. Bull.* 2: 1-902
- VAN DUZEE, E. P. 1923. Expedition of the California Acad. of Sci. to the Gulf of California in 1921. The Hemiptera (true bugs, etc.). *Proc. Cal. Acad. Sci.* 12 (1): 123-200.
- VAN DUZEE, E. P. 1933. The Templeton Crocker Expedition of the California Acad. of Sci.s. 1932, n° 4. Characters of twenty-four new species of Hemiptera from the Galapagos Island and Islands and coast and islands of Central America and Mexico. *Proc. Cal. Acad. Sci.* 21 (4): 25-40.
- WALKER, F. 1851. List of the specimens of Homopterous insects in the collection of the British Museum 3: 637-907.
- WOLCOTT, G. N. 1923. Insectae Portoricensis. A preliminary annotated check-list of the insects of Puerto Rico, with descriptions of some new species. *J. Agric. Univ. P. R.* 7 (1): 1-131.

- WOLCOTT, G. N. 1936. Insectae Boriquenses. A revised annotated checklist o the insects of Puerto Rico. *J. Agric. Univ. P. R.* . 20: 71-111, 30 figs.
- YOUNG, D. A. 1952. A reclassification of western hemisphere Typhlocybinae (Homoptera, Cicadellidae). *Univ. Kans. Sci. Bull.* 35 (1): 1-141, 38 pls.
- YOUNG, D. A. 1957. A new genus of economic leafhoppers and notes on the genus *Atanus* Oman. *Revta Chl. Ent.* 5: 13-16.
- ZAHNISER, J. N. 2005. A new genus of Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae) from Ecuador and a new synonym of *Luheria constricta* Osborn with illustrations of the female. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 98 (5): 653-657.
- ZAHNISER, J. N. & M. D. WEBB. 2004. Placement of the *Faltala* Oman leafhoppers group (Hemiptera, Cicadellidae, Deltocephalinae) with descriptions of three new species. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 97 (4): 667- 674.
- ZACHVATKIN, A. A. 1935. Notes on the Homoptera-Cicadina of Jemen. *Wiss. B. Mosk. Staat-univ.* 4: 106-115.
- ZANOL, K. M. R. 1987. Descrição de duas novas espécies de *Exitianus* Ball (Homoptera, Cicadellidae). *Acta biol. Par.* 16 (1,2,3,4): 133-137.
- ZANOL, K. M. R. 1988a. Descrição de cinco espécies novas de *Taperinha* Linnauori, 1959 (Homoptera, Cicadellidae). *Revta bras. Ent.* 32 (3-4): 411-415.
- ZANOL, K. M. R. 1988b. As espécies do gênero *Scaphoidula* Osborn, 1923 (Homoptera, Cicadellidae). *Revta bras. Ent.* 32 (3-4): 416-422.
- ZANOL, K. M. R. 1988c. As espécies do gênero *Neophlepsius* Linnauori, 1955 (Homoptera, Cicadellidae). *Revta bras. Ent.* 32 (1): 45-53.
- ZANOL, K. M. R. 1988d. Morfologia de *Neophlepsius gracilis* (Osborn, 1923) (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). *Revta bras. Ent.* 32 (1): 69-93.
- ZANOL, K. M. R. 1989a. Sobre a composição do gênero *Menosoma* Ball, 1931 e descrição de uma nova espécie (Homoptera, Cicadellidae). *Revta bras. Zool.* 6 (2): 259-262.
- ZANOL, K. M. R. 1989b. Duas novas espécies de *Brazosa* Oman (Homoptera, Cicadellidae). *Revta bras. Zool.* 33 (1): 3-5.
- ZANOL, K. M. R. 1989c. Descrição de duas espécies novas de *Taperinha* Linnauori, 1959 (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). *Revta bras. Zool.* 6 (2): 255-258.
- ZANOL, K. M. R. 1989d. Nova espécie de *Yungasia* Linnauori (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). *Revta bras. Ent.* 33 (1): 1-3.
- ZANOL, K. M. R. 1989e. Nova espécie de *Scaphoidula* Osborn, 1923 (Homoptera: Cicadellidae). *An. ent. Brasil* 18 (2): 371-373.
- ZANOL, K. M. R. 1989f. Nova espécie de *Carelmapu* Linnauori, 1959 (Homoptera: Cicadellidae). *An. ent. Brasil* 18 (2): 367-369.
- ZANOL, K. M. R. 1990. Nova espécie de *Yuraca* Linnauori & DeLong, 1978 (Homoptera, Cicadellidae). *Revta bras. Ent.* 34 (4): 807-809.
- ZANOL, K. M. R. 1991a. Descrição de quatro espécies novas de *Tropicanus* DeLong (Homoptera, Cicadellidae). *Revta bras. Zool.* 7 (1-2): 79-83.
- ZANOL, K. M. R. 1991b. Quatro espécies novas de *Yungasia* Linnauori (Homoptera: Cicadellidae). *Revta bras. Zool.* 7 (1-2): 187-192.
- ZANOL, K. M. R. 1992. *Megabahita* Linnauori & DeLong (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae): descrição de três espécies novas. *Revta bras. Zool.* 9 (1-2): 67-74.

- ZANOL, K. M. R. 1993. Sobre o material tipo de *Andanus bimaculatus* Linnnavuori e descrição de um novo gênero e espécie (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Revta bras. Zool.* 10 (4): 613-618.
- ZANOL, K. M. R. 1996a. Descrição de cinco espécies novas de *Bahita* Oman (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Revta bras. Zool.* 13 (3): 727-735.
- ZANOL, K. M. R. 1996b. Homonymy within *Frequenamia* DeLong (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Revta bras. Zool.* 13 (3): 813.
- ZANOL, K. M. R. 1997a. Nova espécie de *Bahita* Oman (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Revta bras. Zool.* 14 (1): 113-115.
- ZANOL, K. M. R. 1997b. Uma nova espécie de *Scaphoidula* Osborn (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Revta bras. Zool.* 14 (1): 117-119.
- ZANOL, K. M. R. 1997c. *Serridonus* Linnnavuori (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae): descrições de três novas espécies. *Revta bras. Zool.* 14 (3): 579-587.
- ZANOL, K. M. R. 1997d. Uma nova espécie de *Taperinha* Linnnavuori (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Revta bras. Zool.* 14 (3): 625-627.
- ZANOL, K. M. R. 1998. *Neophlepsius* Linnnavuori (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae): descrição de cinco espécies novas. *Revta bras. Zool.* 15 (1): 81-93.
- ZANOL, K. M. R. 1999. Revisão do gênero *Bahita* Oman 1936 (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Biociências* 7 (2): 73-145.
- ZANOL, K. M. R. 2000. *Atanus* Oman (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae): descrição de seis espécies novas com apêndices no tubo anal. *Acta biol. Par.* 27 (1,2,23,4): 27-38, "1998".
- ZANOL, K. M. R. 2001a. Nova espécie de *Parabahita* Linnnavuori (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Acta Am.* 31 (4): 683-685.
- ZANOL, K. M. R. 2001b. Duas espécies novas de *Menosoma* Ball, 1931 (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Revta bras. Ent.* 45 (3): 243-246.
- ZANOL, K. M. R. 2001c. *Chlorotettix* Van Duzee (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae): descrições de duas novas espécies. *Revta bras. Zool.* 18 (2): 387-390.
- ZANOL, K. M. R. 2002a. *Bandaromimus* Linnnavuori (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae): primeiro registro no Brasil e descrição de duas espécies novas. *Revta bras. Zool.* 19 (supl 1): 191-195.
- ZANOL, K. M. R. 2002b. Homonymy within *Chlorotettix* Van Duzee (Homoptera, Cicadellidae, Deltcephalinae). *Revta bras. Zool.* 19 (4): 1221.
- ZANOL, K. M. R. 2003a. O gênero *Garapita* Oman (Hemiptera, Cicadellidae, Deltcephalinae) com descrições de quatro novas espécies. *Revta bras. Zool.* 20 (2): 239-246.
- ZANOL, K. M. R. 2003b. *Frequenamia* (Cicadellidae, Deltcephalinae): distribuição geográfica, notas sinonímicas e descrições de dezessete novas espécies. *Acta biol. Par.* 32 (1,2,3,4): 9-67.
- ZANOL, K. M. R. 2004a. Nova combinação em Deltcephalinae (Hemiptera, Cicadellidae). *Revta bras. Ent.* 48 (4): 581-582.

- ZANOL, K. M. R. 2004b. Nova combinação em Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadelliidae). *Revta bras. Zool.* 21(2): 343-344.
- ZANOL, K. M. R. 2004c. Ocorrência do gênero *Dolyobius* Linnauori (Hemiptera, Cicadellidae) no Brasil e descrição do macho de *Dolyobius distinctus* Linnauori. *Acta biol. Par.* 33 (1,2,3,4): 163-166.
- ZANOL, K. M. R. 2004d. *Taperinha* (Hemiptera, Cicadellidae, Deltocephalinae): descrições de nove espécies novas. *Revta bras. Zool.* 21 (2) 337-342.
- ZANOL, K. M. R. 2005. Nova sinonímia em Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadellidae) e primeira ocorrência de *Andanus* Linnauori no Brasil. *Acta biol. Par.* 34 (1,2,3,4): 89-90.
- ZANOL, K. M. R. 2006a. *Napo* (Hemiptera, Cicadellidae): primeiro registro no Brasil e descrição de uma nova espécie. *Iheringia*, sér. Zool., 96 (1):65-66.
- ZANOL, K. M. R. 2006b. Novas combinações em *Atanus* Oman (Hemiptera, Cicadellidae). *Revta bras. Ent.* 50 (2): 163-164.
- ZANOL, K. M. R. 2006c. *Pachytettix* (Hemiptera, Cicadellidae): primeiro registro no Brasil e descrição de uma nova espécie. *Iheringia*, sér. Zool., 96 (2): 133-134.
- ZANOL, K. M. R. 2006d. *Caruya* Linnauori & DeLong, 1978 (Hemiptera: Cicadellidae): primeiro registro no Brasil e descrição de uma nova espécie. *Lundiana* 7 (1): 65-66.
- ZANOL, K. M. R. 2006e. Quatro espécies novas de *Tropicanus* DeLong (Hemiptera, Cicadellidae). *Revta bras. Zool.* 23 (4): 1251-1255.
- ZANOL, K. M. R. 2006f. *Benibahita* Linnauori (Hemiptera, Cicadellidae): primeiro registro no Brasil e descrição da fêmea de *Benibahita furcillata* Linnauori. *Revta bras. Zool.* 23 (4): 1273-1274.
- ZANOL, K. M. R. 2006g. Descrição do macho de *Huachia trilobata* (Hemiptera, Cicadellidae). *Biociências* 14 (1): 47-48.
- ZANOL, K. M. R. 2006h. Catalogue of the neotropical (including north of Mexico) Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadellidae). Part I – Athysanini and Deltocephalini excluded. *Acta biol. Par.* 35 (3-4): 89-161.
- ZANOL, K. M. R. 2007. Catalogue of the neotropical Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadellidae). Part II – Tribe Deltocephalini excluded. *Acta biol. Par.* 36 (1-2): 1-46.
- ZANOL, K. M. R. & M. DE MENEZES. 1982. Lista preliminar dos cicadelídeos (Homoptera, Cicadellidae) do Brasil. *Iheringia*, sér. Zool., 61: 9-65.
- ZANOL, K. M. R. & A. SAKAKIBARA. 1984. As espécies do gênero *Copididonus* e descrição de três novas (Homoptera, Cicadellidae). *Dusenia* 14 (1): 11-21.
- ZANOL, K. M. R. & A. SAKAKIBARA. 1990. Descrição de três espécies novas de *Copididonus* Linnauori (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). *Revta bras. Ent.* 34 (3): 577-581.

ÍNDICE

aberrans Osborn, Ileopeltus	43
abruptus DeLong & Hershberger, Exitianus	34
abruptus Zanol, Neophlepsioides (Neophlepsioides)	50
aculeata Zanol, Caruya	15
<i>acus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	27
acutus Linnnavuori & Heller, Atanus	5
adama Blocker & Fang, Clorindaia	24
<i>Adlaca</i> Lozada	4
adspersa Linnnavuori & DeLong, Taperinha	64
adusta Zahniser, Kramerana	45
advenus DeLong, Ollarianus	51
Aequicephalus DeLong & Thambimuttu	3
aguasina Zanol, Bahita	8
Alaca Oman	3
<i>Alanus</i> DeLong & Hershberger	5
alayoi Hidalgo-Gato, Neocrassana	50
albidus DeLong & Hershberger, Atanus	5
albidus Walker, Chlorotettix (Chlorotettix)	16
<i>albifrons</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	52
albigena Linnnavuori, Chaparea	15
albinoi Zanol, Taperinha	64
albocinctus DeLong, Colladonus	25
aliceae Zanol & Sakakibara, Copididonus	28
Aligia Ball	3
Alladanus DeLong & Harlan	3
alta Osborn, Chaparea	15
alta DeLong & Hershberger, Mesamia	48
alvarengai Zanol, Bahita	9
alvarengai Zanol & Sakakibara, Copididonus	28
alvona Kramer & DeLong, Aligia	3
amabilis Linnnavuori & DeLong, Dariena	30
amapana Linnnavuori & DeLong, Bahita	9
amazonensis Osborn, Zabrosa	72
amazonicus Zanol, Tropicanus (Tropicanus)	69
ambrosia Zanol, Frequenamia	37
amoena Zanol, Bahita	9
ampla DeLong, Rineda	61
anademus DeLong, Colladonus	25
Angubahita DeLong	4
Angubahita (Angubahita) DeLong	4
Angubahita (Mairana) DeLong	4
Ancudana DeLong & Martinson	3
Andanus Linnnavuori	4
angustata DeLong, Omanana	53
angustata DeLong, Conversana	28
Angulanus DeLong	4
angulatus DeLong & Hershberger, Exitianus	34
angustus Linnnavuori, Atanus	5
angustus DeLong, Excavanus	32
annulatus Osborn, Tropicanus (Tropicanus)	69
Antoniellus Linnnavuori	4
antonina Zanol, Bahita	9
<i>apertus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	13

apicalis DeLong & Hershberger, Texananus (Iowanus)	66
apicatus DeLong, Retusanus	60
apiculata Zanol, Frequenamia	37
Aplanatus Cheng	5
appendiculata Linnavuori & DeLong, Brazosa	13
appendiculatus Zanol, Tropicanus (Tropicanus)	69
<i>appendiculatus</i> Linnavuori, <i>Chacotettix</i>	16
aquareza Linnavuori & DeLong, Zabrosa	72
arcata DeLong, Omanana	53
areolatus Baker, Texananus (Texananus)	66
<i>argillaceus</i> Van Duzee, <i>Phlepsius</i>	33
Aricanus Linnavuori	5
arida DeLong & Martinson, Desertana	30
armata Linnavuori & DeLong, Lascumbresa	45
armata Linnavuori & DeLong, Parabahita	54
armata Linnavuori, Frequenamia	37
armus Ball, Ollarianus	51
Artucephalus DeLong	5
asper Linnavuori & DeLong, Concepciona	28
assurinia Zanol, Taperinha	64
Atanus Oman	5
ATHYSANINI	3
atra DeLong, Angubahita (Angubahita)	4
<i>atrata</i> Linnavuori & DeLong, <i>Frequenamia</i>	39
atrus Linnavuori, Exitianus	34
atriceps Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	17
aurea Linnavuori, Garapita (Chlamydopita)	41
aureola Zanol, Frequenamia	37
aureola Zanol, Yuraca	72
aureonitens Linnavuori & DeLong, Carelmapu (Nahuelbuta)	15
australis Linnavuori, Bandaromimus	11
Bahita Oman	8
<i>Bahita (Penebahita)</i> Linnavuori	37
<i>Bahita (Exobahita)</i> Linnavuori	37
baiana Zanol, Frequenamia	37
baianus Zanol, Atanus	6
badia DeLong, Sanuca	61
bakeri DeLong, <i>Idiodonus</i>	43
bakeri Sanders & DeLong, Chlorotettix (Chlorotettix)	17
balli Van Duzee, Ollarianus	52
balli DeLong, Stoneana	63
Bandara Ball	11
Bandara (Bandara) Ball	11
Bandara (Bandarana) DeLong	11
Bandaromimus Linnavuori	11
barbus DeLong, Texananus (Texananus)	67
Bardana DeLong	12
Baroma Oman	12
beameri Ball, Colladonus	25
<i>beamerallus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	25
belli Uhler, Colladonus	25
<i>belli</i> var. <i>gilletti</i> ; Van Duzee, <i>Thamnotettix</i>	25
bellus Zanol, Napo	49
bergi Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	17
Bergolix Linnavuori	12

<i>bergrothi</i> Jensen-Haarup, <i>Thamnotettix</i>	36
Benibahita Linnavuori	12
<i>berryi</i> DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	17
<i>biacus</i> DeLong, <i>Texananus</i> (<i>Texananus</i>)	67
<i>bicinctus</i> DeLong, <i>Colladonus</i>	26
<i>bicornis</i> Linnavuori & DeLong, <i>Parabahita</i>	54
<i>bicornis</i> Linnavuori & DeLong, <i>Atanus</i>	6
<i>bicornis</i> Linnavuori, <i>Tropicanus</i> (<i>Tropicanus</i>)	70
<i>bicuspidata</i> Zanol, <i>Frequenamia</i>	37
<i>bicuspidatus</i> Linnavuori & DeLong, <i>Neophlepsius</i> (<i>Neophlepsius</i>)	50
<i>bicolor</i> Kramer & DeLong, <i>Aligia</i>	3
<i>bicoloratus</i> DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	17
<i>bircura</i> Zanol, <i>Bahita</i>	9
<i>bidentata</i> Zanol, <i>Yungasia</i>	71
<i>bidentatus</i> DeLong, <i>Chlorotettix</i>	44
<i>bidentatus</i> DeLong, <i>Ollarianus</i>	52
<i>bifida</i> Zanol, <i>Frequenamia</i>	37
<i>bifidus</i> Zanol, <i>Neophlepsius</i> (<i>Neophlepsius</i>)	50
<i>bifidus</i> Linnavuori, <i>Atanus</i>	6
<i>bifurcata</i> DeLong & Hershberger, <i>Mesamia</i>	48
<i>bifurcata</i> DeLong, <i>Omanana</i>	53
<i>bifurcata</i> Linnavuori, <i>Taperinha</i>	64
<i>bilicum</i> DeLong, <i>Texananus</i> (<i>Texananus</i>)	67
<i>bimaculatus</i> DeLong & Linnavuori, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	17
<i>bimaculatus</i> Linnavuori, <i>Andanus</i>	4
<i>binotata</i> DeLong, <i>Perubahita</i>	59
<i>binotata</i> DeLong, <i>Pseutettix</i>	60
<i>bipartitus</i> DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	17
<i>bipunctus</i> DeLong & Cwikla, <i>Paratanus</i>	57
<i>blandita</i> Zanol, <i>Frequenamia</i>	37
<i>blockeri</i> Cwikla, <i>Ileopeltus</i>	43
<i>boliviellus</i> DeLong & Martinson, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	17
<i>Bonneyana</i> Oman	12
<i>bos</i> Linnavuori & DeLong, <i>Atanus</i>	6
<i>brachyptera</i> Oman, <i>Faltala</i>	36
<i>Brasilanus</i> Linnavuori	13
<i>Brasilanus</i> (<i>Brasilanus</i>) Linnavuori	13
<i>Brasilanus</i> (<i>Mascoitanus</i>) Linnavuori & Heller	13
<i>brasileira</i> Zahner, <i>Clorindaia</i>	24
<i>brasiliensis</i> Osborn, <i>Thamnotettix</i>	29
<i>Brazosa</i> Oman	13
<i>brazosellus</i> Linnavuori & DeLong, <i>Napo</i>	49
<i>brevicapitus</i> Cwikla, <i>Paratanus</i>	58
<i>brevicauda</i> Linnavuori & DeLong, <i>Caruya</i>	15
<i>breviceps</i> Baker, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	17
<i>breviceps</i> Linnavuori & DeLong, <i>Neohegira</i>	50
<i>brevis</i> DeLong & Hershberger, <i>Exitianus</i>	34
<i>Brincadorus</i> Oman	14
<i>brunnea</i> Oman, <i>Hegira</i>	42
<i>brunneopicta</i> Zanol, <i>Taperinha</i>	64
<i>brunneopictus</i> Zanol, <i>Exitianus</i>	34
<i>brunneus</i> DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	17
<i>brunneus</i> Zanol & Sakakibara, <i>Copididonous</i>	28
<i>caesarea</i> Linnavouri & Heller, <i>Brazosa</i>	13
<i>Cahya</i> Linnavuori	14

cajaensis Linnnavuori, Texananus (Texananus)	67
caldwelli DeLong, Bonneyana	13
caldwelli DeLong, Tropicanus (Tropicanus)	70
calidus DeLong, Tropicanus (Tropicanus)	70
canolaterus Cwikla & Freytag, Chlorotettix (Chlorotettix)	17
Caphodus Oman	14
capicola Stål, Exitianus	35
capixaba Zanol, Bahita	9
capixaba Zanol, Frequenamia	37
caracana Linnnavuori & DeLong, Bahita	9
Caranavia Linnnavuori	14
Carelmapu Linnnavuori	15
Carelmapu (Carelmapu) Linnnavuori	15
Carelmapu (Nahuelbuta) Linnnavuori & DeLong	15
Caruya Linnnavuori & DeLong	25
<i>cassus</i> DeLong, <i>Texananus</i>	34
caudata Zanol, Parabahita	55
caudata DeLong & Linnnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	17
cavifrons Linnnavuori, Frequenamia	37
<i>Celsanus</i> Linnnavuori	16
cephalatus DeLong & Harlan, Alladanus	3
chapadensis Menezes, Cahya	14
chapadensis Linnnavuori, Frequenamia	37
chapadensis Zanol, Tropicanus (Tropicanus)	70
Chaparea Linnnavuori	15
chepada DeLong, Paraphlepsius (Gamarex)	56
chiapasus Zanol, Tropicanus (Tropicanus)	70
Chlorotettix Van Duzee	16
Chlorotettix (Chacottetix) Linnnavuori	16
Chlorotettix (Chlorotettix) Linnnavuori	16
Chonosina Linnnavuori & DeLong	23
cinchus DeLong, Atanus	6
cincta DeLong & Martinson, Ancudana	4
cincta Osborn & Ball, Menosoma	46
cincta mexicana DeLong, Menosoma	46
cineratus Linnnavuori, Atanus	6
cinereus Van Duzee, Paraphlepsius (Gamarex)	57
<i>cinereus</i> VanDuzee, <i>Phlepsius</i>	57
cingulata Osborn, Scaphoidula	62
cirrofasciata Cheng, Frequenamia	38
claustrus DeLong, Colladonus	26
clathrus DeLong, Colladonus	26
clavatus Cwikla, Ileopeltus	43
clitellaria Osborn, Garapita (Garapita)	41
<i>clitellaria</i> Gillette & Baker, <i>Thamnotettix</i>	27
Clorindaia Linnnavuori	24
clypealis Linnnavuori, Serratus	62
clypeata Osborn, Frequenamia	38
<i>clypeatus</i> Osborn, <i>Phlepsius</i>	37
clypeatus Osborn, Thamnotettix	73
Cocrassana Blocker & Larsen	24
<i>cognitus</i> Caldwell, <i>Chlorotettix</i>	18
Colladonus Ball	24
Comayagua Linnnavuori & DeLong	27
comayagus Linnnavuori & DeLong, Ollarianus	52

compressa Linnavuori, Parabahita	55
compta Zanol, Garapita (Garapita)	41
compta Zanol, Taperinha	64
Concepciona Linnavuori & DeLong	28
concinna Zanol, Taperinha	64
<i>Coniferadonus</i> Bliven	25
confusa Linnavuori, Frequenamia	38
confusa DeLong, Perubahita	59
confusa Menezes, Scaphoidula	62
<i>Conodonus</i> Ball	24
conus DeLong, Excultanus	32
Consepusa Linnavuori & DeLong	28
contaminatus Linnavuori, Texananus (Iowanus)	66
continuus DeLong, Paraphlepsius (Gamarex)	57
contrarius Linnavuori, Atanus	6
conversa DeLong, Conversana	28
Conversana DeLong	28
<i>copalanus</i> DeLong & Martinson, <i>Texananus</i>	66
Copididonus Linnavuori	28
copula DeLong, Eutettix (Guadlera)	31
copulus DeLong, Idiodonus	73
cornuta Linnavuori & DeLong, Rineda	61
coronatus Berg, Atanus	6
coroicoa Linnavuori & DeLong, Yungasia	71
corpulentus Linnavuori, Neophlepsius (Neophlepsius)	50
costomaculatus Van Duzee, Tropicanus (Tropicanus)	70
Costamia DeLong	29
costatus DeLong, Tenuisanus	65
costatus DeLong, Paratanus	58
coxinus Zanol, Atanus	6
Cozadanus DeLong & Harlan	29
Crassana DeLong & Hershberger	29
Crassana (Crassana) DeLong & Hershberger	30
Crassana (Macrasana) DeLong & Hershberger	30
crassistylus Linnavuori & DeLong, Consepusa	28
crassistylus Linnavuori, Frequenamia	38
cristatus Linnavuori & DeLong, Atanus	6
cruciatus Linnavuori & DeLong, Parandanus	56
cruentata Linnavuori, Caranavia	14
<i>cruzanus</i> DeLong & Cwikla, <i>Doleranus</i>	43
cumbresana Linnavuori & DeLong, Parabahita	55
cuneus DeLong & Martinon, Ileopeltus	43
curtula Linnavuori & DeLong, Bahita	9
curtus DeLong, Texananus (Texananus)	67
<i>curvidens</i> Osborn, <i>Chlorotettix</i>	16
curvilinea Linnavuori, Atanus	6
cuspidatus DeLong, Texananus (Texananus)	67
cyclops Linnavuori, Ileopeltus	43
cypora Blocker & Fang, Clorindaia	24
dampfi DeLong, Colladonus	26
dampfi DeLong, Omanana	53
<i>dampfi</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	26
<i>dampfi</i> DeLong, <i>Phlepsius</i>	57
Dampfiana DeLong & Hershberger	30
danunciae Zanol, Megabahita	46

Dariena Linnavuori & DeLong	30
decempunctatus Linnavuori, <i>Mimodorus</i> (<i>Mimodorus</i>)	49
declivatus Linnavuori, <i>Atanus</i>	6
delicatus Osborn, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	17
<i>delongi</i> Linnavuori, <i>Colladonus</i>	27
delongi Zanol, <i>Eusceloidia</i>	31
delongi Hamilton, <i>Paraphlepsius</i> (<i>Gamarex</i>)	57
dentata Oman, <i>Scaphoidula</i>	62
dentata Zanol, <i>Taperinha</i>	64
<i>dentatus</i> Osborn, <i>Eutettix</i>	6
denticulata Zanol, <i>Bahita</i>	9
denticulatus Zanol, <i>Atanus</i>	6
denticulatus Zanol, <i>Neophlepsius</i> (<i>Neophlepsius</i>)	51
depressa DeLong, <i>Bardana</i>	12
deserta DeLong & Hershberger, <i>Dampfiana</i>	30
Desertana DeLong & Martinson	30
Devolana DeLong	31
diabolus Linnavuori, <i>Mimodorus</i> (<i>Mimodorus</i>)	49
digitata Linnavuori, <i>Yungasia</i>	71
digitus DeLong, <i>Tropicanus</i> (<i>Tropicanus</i>)	70
<i>digressus</i> Van Duzee, <i>Athyisanus</i>	35
discapa DeLong, <i>Eutettix</i> (<i>Guadlera</i>)	32
discigutta Linnavuori, <i>Taperinha</i>	64
<i>dilutus</i> Osborn, <i>Chlorotettix</i>	44
dimorphus Berg, <i>Bergolix</i>	12
<i>diserus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	26
disonymos Linnavuori, <i>Neophlepsius</i> (<i>Nesolanus</i>)	51
distincta Zanol, <i>Brazosa</i>	13
distinctus Linnavuori, <i>Dolyobius</i>	31
divergens DeLong, <i>Omanana</i>	53
divisa DeLong, <i>Omanana</i>	53
divisa DeLong & Hershberger, <i>Mesamia</i>	48
Dolyobius Linnavuori	31
dorothyae DeLong, <i>Excultanus</i>	32
dorsalis Gillette, <i>Alebra</i>	73
dorsalus Cwikla, <i>Ileopeltus</i>	43
<i>dubiosa</i> Lozada, <i>Adlaca</i>	4
duodens DeLong, <i>Omanana</i>	53
duospinus DeLong & Martinson, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	18
eburneola Oman, <i>Onura</i>	54
edentulus DeLong, <i>Idiodonus</i>	73
elegans Linnavuori & DeLong, <i>Pachytettix</i>	54
elegans Osborn, <i>Menosoma</i>	47
elegans Linnavuori & DeLong, <i>Mocolinna</i>	49
elegantiae Zanol, <i>Frequenamia</i>	38
elongatus Ball, <i>Texananus</i> (<i>Texananus</i>)	67
emarginatus Baker, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	18
essbejus Zanol, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	18
estebana Linnavuori & DeLong, <i>Frequenamia</i>	38
eugeneus Ball, <i>Excultanus</i>	32
Eusceloidea Osborn	31
Eutettix Van Duzee	31
Eutettix (Guadlera) DeLong	31
Excavanus DeLong	32
excavata Zanol, <i>Taperinha</i>	64

excavatus DeLong & Hershberger, <i>Exitianus</i>	35
excavatus DeLong, <i>Idiodonus</i>	73
<i>Excultanus Oman</i>	32
<i>excultus Sanders & DeLong, Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	18
<i>excultus Uhler, Excultanus</i>	32
<i>Exitianus Ball</i>	34
<i>exitiosus Uhler, Exitianus</i>	35
<i>exitiosus Beamer, Paratanus</i>	58
<i>exitiosus angustatus DeLong & Hershberger, Exitianus</i>	35
<i>exitiosus pallidens DeLong & Hershberger, Exitianus</i>	35
<i>falcata Linnnavuori & Heller, Parabahita</i>	55
<i>falcata Linnnavuori, Yungasia</i>	71
<i>fallaciosa Linnnavuori, Bahita</i>	38
<i>Faltala Oman</i>	36
<i>fasciata Osborn, Saadevra</i>	61
<i>fasciaticollis Stål, Colladonus</i>	26
<i>fasciatus DeLong, Artucephalus</i>	5
<i>fasciatus Zanol & Sakakibara, Copidodonus</i>	28
<i>fasciolatus Melichar, Exitianus</i>	35
<i>femorata Osborn, Bahita</i>	9
<i>fenica Zanol, Bahita</i>	9
<i>festiva Zanol, Frequenamia</i>	38
<i>fessulus Van Duzee, Thamnotettix</i>	73
<i>filigranus Linnnavuori, Aricanus</i>	5
<i>flagellaris Linnnavuori, Brasilanus (Brasilanus)</i>	13
<i>flavescens Zanol, Taperinha</i>	64
<i>flavocostata Linnnavuori & DeLong, Chonosina</i>	23
<i>flavolineata Linnnavuori & DeLong, Menosoma</i>	47
<i>flavomarginata Linnnavuori & DeLong, Yuraca</i>	72
<i>flectus DeLong, Tropicanus (Tropicanus)</i>	70
<i>floridanus DeLong, Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	18
<i>foersteri Zanol, Serridonus</i>	63
<i>forcipata DeLong & Linnnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	18
<i>forcipata DeLong, Mesamia</i>	48
<i>frameus DeLong & Linnnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	18
<i>fratercula Linnnavuori, Bahita</i>	9
<i>fratervulus Berg, Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	18
<i>Frequenamia DeLong</i>	36
<i>freytagi Zanol, Taperinha</i>	65
<i>frigida DeLong & Hershberger, Mesamia</i>	48
<i>Friscananus Ball</i>	24
<i>Friscanus DeLong & Caldwell</i>	24
<i>Fulvanus Linnnavuori</i>	5
<i>fulvicus Cheng, Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	19
<i>fulvopictus Linnnavuori, Bandaromimus</i>	11
<i>fulvula Osborn, Frequenamia</i>	38
<i>fumiae Zanol, Frequenamia</i>	38
<i>fulmina Zanol, Yungasia</i>	72
<i>furcifer Linnnavuori, Atanus</i>	7
<i>furcifer Linnnavuori, Bahita</i>	9
<i>furcillata Linnnavuori, Benibahita</i>	12
<i>furcipennis Cheng, Faltala</i>	36
<i>fuscifasciatus Cheng, Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	19
<i>fuscipennis fuscipennis Van Duzee, Paraphlepsius (Gamarex)</i>	57
<i>fuscipennis turpiculus Ball, Phlepsius</i>	57

Garapita Oman	41
Garapita (Chlamydopita) Linnavuori	41
Garapita (Garapita) Oman	41
garbosa Oman, Garapita (Garapita)	41
gigantea Linnavuori & DeLong, Megabahita	46
giganteus Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	19
<i>gilletti</i> Van Duzee, <i>Thamnotettix</i>	25
globosus DeLong & Harlan, Cozadonus	29
goniana Ball, Crassana (Crassana)	30
<i>goodi</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	27
<i>gracilis</i> Linnavuori, <i>Bahita</i>	41
gracilis Osborn, Neophlepsius (Neophlepsius)	51
gracilus Cheng, Atanus	7
graeculus Ball, Idiodonus	42
gramineus DeLong & Thambimuttu, Aequcephalus	3
grandis Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	19
grisea Linnavuori, Onura	54
grossus Linnavuori, Ollarianus	52
guajarensis Zanol, Garapita (Garapita)	41
<i>Guaporea</i> Linnavuori & DeLong	8
guerrera DeLong, Frequenamia	38
guerrerus DeLong & Martinson, Chlorotettix (Chlorotettix)	19
hamiltoni Zanol, Chlorotettix (Chlorotettix)	19
hamula DeLong & Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	19
handlirschi Ball, Texananus (Iowanus)	66
haplus Cwikla, Ileopeltus	44
harmodios Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	19
hasemani Osborn, Frequenamia	39
hastulus DeLong & Linnavuori, Ileopeltus	44
hebatus DeLong, Premanus	59
hebraeus Ball, Excultanus	33
hecaloides Linnavuori, Clorindaia	24
Hecaloidia Osborn	42
Hegira Oman	42
hemicycla DeLong, Devolana	31
herbida DeLong & Thambimuttu, Virganana	71
hilaris Linnavuori & DeLong, Parandanus	56
horridus Linnavuori & DeLong, Atanus	7
horridus DeLong, Excultanus	33
hosanus Ball, Texananus (Texananus)	67
Huachia Linnavuori	42
Huancabamba Linnavuori	42
hyalina Osborn, Bandara (Bandara)	11
hyalinipennis Stål, Copididonus	28
hypera Blocker & Fang, Kramerana	45
<i>Hypospadianus</i> Ribaut	24
Idiodonus Ball	42
igualae DeLong, Parabahita	55
Ilagia Kramer & DeLong	43
Ileopeltus Cwikla	43
ikrajubus Zanol, Pachytettix	54
impictus Linnavuori & DeLong, Atanus	7
incidus DeLong, Colladonus	26
incisa Oman, Scaphoidula	62
incisurus DeLong, Angulanus	4

<i>inconspicuus</i> Jensen-Haarup, <i>Athysanus</i>	6
inhabilis Linnavuori, <i>Frequenamia</i>	39
incurvatus Osborn & Lathrop, <i>Excultanus</i>	33
incus Zanol, <i>Frequenamia</i>	39
inermis Linnavuori, <i>Paratanus</i>	58
inermis paraguayensis Cheng, <i>Paratanus</i>	58
infuscata Osborn, <i>Bahita</i>	9
inornata Linnavuori & DeLong, <i>Bahita</i>	9
inprica Cheng, <i>Menosoma</i>	47
inscriptus DeLong, <i>Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	19
insculptus DeLong, <i>Paracolladonus</i>	55
insignis DeLong, <i>Ollarianus</i>	52
insularis Zanol, <i>Bandaromimus</i>	12
irrorata Osborn, <i>Megabahita</i>	46
irrorata Linnavuori, <i>Phlepsobahita</i>	59
irroratus DeLong, <i>Retusanus</i>	60
irroratus Zanol, <i>Tropicanus (Tropicanus)</i>	70
irrorellus Linnavuori, <i>Antoniellus</i>	4
interjecta Linnavuori & DeLong, <i>Bahita</i>	10
interrupta DeLong & Hershberger, <i>Mesamia</i>	48
Jaacunga Nielson	44
joquinus Linnavuori, <i>Atanus</i>	7
joseana Zanol, <i>Bahita</i>	10
jucunda Zanol, <i>Frequenamia</i>	39
junina Zahniser, <i>Kramerana</i>	45
kassiphone Linnavuori, <i>Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	19
kijaua Zanol, <i>Taperinha</i>	65
kinoanus Ball, <i>Ollarianus</i>	52
<i>kinonanus</i> Ball, <i>Doleranus</i>	44
Kramerana DeLong & Thambimuttu	45
Krameraxus Maldonado-Capriles	45
lacerdae Signoret, <i>Frequenamia</i>	39
lagunae Linnavuori, <i>Atanus</i>	7
Lajolla Linnavuori	45
lamina DeLong, <i>Parabahita</i>	55
languidus Linnavuori, <i>Chlorotettix (Chacottetix)</i>	16
larocai Zanol, <i>Brazosa</i>	13
Lascumbresa Linnavuori & DeLong	45
lateralis Linnavuori & Heller, <i>Brasilanus (Mascoitanus)</i>	13
latiabdoma Blocker & Fang, <i>Clorindaia</i>	24
laticeps Osborn, <i>Bahita</i>	10
laticeps Oman, <i>Brincadorus</i>	14
latidens DeLong, <i>Paranurenus</i>	56
latocinctus DeLong, <i>Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	19
latocinctus paraguayensis Cheng, <i>Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	19
leucornatus Maldonado-Capriles, <i>Krameraxus</i>	45
levis DeLong, <i>Mexicananus</i>	48
<i>Linnatanus</i> Menezes	5
lingulatus Linnavuori, <i>Dolyobius</i>	31
lingulus DeLong & Martinson, <i>Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	19
<i>lineatus</i> Osborn, <i>Chlorotettix</i>	21
linnavuorii DeLong & Thambimuttu, <i>Kramerana</i>	45
liquarus DeLong & Martinson, <i>Chlorotettix (Chlorotettix)</i>	20
lissei Zanol, <i>Tropicanus (Tropicanus)</i>	70
litigiosa Ball, <i>Omanana</i>	53

litorea Zanol, <i>Frequenamia</i>	39
lobata Zanol, <i>Bahita</i>	10
lobatus Osborn, <i>Atanus</i>	7
lobatus Osborn, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	20
lobatus DeLong, <i>Ollarianus</i>	52
Lojanus Linnavuori	45
longibrachium Cheng, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	20
longicauda Oman, <i>Alaca</i>	3
longifalx Linnavuori & DeLong, <i>Perubahita</i>	59
longipennis Linnavuori & DeLong, <i>Yungasia</i>	72
<i>longispina</i> Linnavuori, <i>Chlorotettix</i>	19
longita Cheng, <i>Menosoma</i>	47
longistylus Linnavuori, <i>Serridonus</i>	39
luctuosus Stål, <i>Exitianus</i>	35
lugens Linnavuori, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chacotettix</i>)	16
luqueatus Cheng, <i>Atanus</i>	7
luqueatus equalis Cheng, <i>Atanus</i>	7
lurida Linnavuori, <i>Parabahita</i>	55
lurida Zanol, <i>Yungasia</i>	72
luridus Zanol, <i>Serridonus</i>	63
<i>luteola</i> DeLong, <i>Frequenamia</i>	40
luteosus Baker, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	20
luteus DeLong, <i>Retusanus</i>	60
lyrata DeLong, <i>Bandara</i> (Bandara)	11
machua DeLong, <i>Sinchonoa</i>	63
<i>macilentus</i> Linnavuori, <i>Neophlepsius</i>	51
maculata Zanol, <i>Taperinha</i>	65
maculata DeLong & Thambimuttu, <i>Virganana</i>	71
maculatus Oman, <i>Caphodus</i>	14
magniceps Linnavuori, <i>Paratanus</i>	58
malevius DeLong & Martinson, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	20
malkowskiae Zanol, <i>Neophlepsius</i> (<i>Neophlepsius</i>)	51
manauara Zanol, <i>Taperinha</i>	65
manqueirana Linnavuori & DeLong, <i>Bahita</i>	10
mansuetus DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	20
maracaensis Zanol & Sakakibara, <i>Copididonus</i>	29
maracana Zanol, <i>Bahita</i>	10
<i>marginatus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	25
marginella DeLong & Hershberger, <i>Crassana</i> (<i>Macrasana</i>)	30
marinonii Zanol, <i>Taperinha</i>	65
marthae DeLong, <i>Stoneana</i>	63
martinsonae Linnavuori & DeLong, <i>Desertana</i>	30
matogrossensis Zanol, <i>Bandaromimus</i>	12
maxi Zanol & Sakakibara, <i>Copididonus</i>	29
maximus Berg, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	20
mediana DeLong, <i>Omanana</i>	53
Megabahita Linnavuori & DeLong	46
mella DeLong & Thambimuttu, <i>Kramerana</i>	45
Menosoma Ball	46
Mesadorus Linnavuori	47
Mesamia Ball	48
mexellus DeLong & Harlan, <i>Alladanus</i>	3
mexicana Kramer & DeLong, <i>Aligia</i>	3
mexicana DeLong, <i>Pseutettix</i>	60
mexicanus DeLong, <i>Atanus</i>	7

mexicanus Zanol, Carelmapu (Carelmapu)	15
<i>mexicanus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	27
mexicanus DeLong, Ollarianus	52
mexicanus Ball, Texananus (Texananus)	67
mexicanus Zanol, Tropicanus (Tropicanus)	71
Mexicananus DeLong	48
mimica Linnavuori & DeLong, Bahita	10
mimica DeLong, Bandara (Bandarana)	11
minimus Baker, Chlorotettix (Chlorotettix)	20
mimicus Osborn, Eutettix	73
Mimodorus Linnavuori	49
Mimodorus (Megadorus) Linnavuori	49
Mimodorus (Mimodorus) Linnavuori	49
<i>Mimodrylix</i> Zachvatkin	34
<i>minaturatus</i> Gibson, <i>Athysanus</i>	36
mineira Zanol, Bahita	10
mineira Zanol, Megabahita	46
<i>minor</i> DeLong, <i>Chlorotettix</i>	52
<i>Mocoa</i> Linnavuori & DeLong	49
Mocolinna McKamey	49
<i>modestus</i> Linnavuori, <i>Celsanus</i>	19
montana DeLong & Hershberger, Mesamia	48
montanus Caldwell, Chlorotettix (Chlorotettix)	21
montanus montanus Van Duzee, Colladonus	26
monticola Linnavuori, Menosoma	47
monticola Linnavuori & DeLong, Taperinha	65
moureai Zanol, Scaphoidula	62
muesebecki DeLong, Ollarianus	52
multifarius Berg, Neophlepsius (Neophlepsius)	51
multipunctata Osborn, Pseudalaca	59
nanocanthus Cwikla, Ileopeltus	44
Napo Linnavuori & DeLong	49
nauticus DeLong, Chlorotettix (Chlorotettix)	21
neocincta Osborn, Menosoma	47
necopinus Van Duzee, Chlorotettix (Chlorotettix)	21
Neocrassana Linnavuori	49
Neohegira Linnavuori & DeLong	50
Neomesus Linnavuori	50
neomexicanus Baker, Excultanus	33
Neophlepsius Linnavuori	50
Neophlepsius (Neophlepsius) Linnavuori	50
Neophlepsius (Nesolanus) Linnavuori	51
neotropicus Jensen-Haarup, Chlorotettix (Chlorotettix)	21
<i>Nerminia</i> Kocak	5
nervosa Osborn, Hecaloidia	42
nigrens DeLong, Angubahita (Mairana)	4
nigrens DeLong & Hershberger, Exitianus	35
<i>nigridens</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	25
nigrifrons DeLong, Omanana	53
nigrifrons DeLong, Paracrassana	55
nigrolabes DeLong, Chlorotettix (Chlorotettix)	21
nigromaculatus DeLong, Chlorotettix (Chacotettix)	16
nigropunctata Kramer & DeLong, Pseudaligia	60
nimbuliferus Berg, Chlorotettix (Chlorotettix)	21
nitida Osborn, Eusceloidia	31

nitidus Linnavuori, Atanus	7
nordestina Zanol, Frequenamia	39
nudatus Ball, Chlorotettix (Chlorotettix)	21
obliquus Osborn, Caphodus	14
obscurinervis Stål, Exitianus	35
obscurinervis nigellus Linnavuori, Exitianus	36
obscurus DeLong, Chlorotettix (Chlorotettix)	21
obtusiceps Berg, Neomesus	50
obvius Oman, Paraphlepsius (Gamarex)	57
ogloblini Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	22
Ollarianus Ball	51
Omanana DeLong	53
omani Zanol, Scaphoidula	62
Onura Oman	54
orbicula DeLong & Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	22
orizaba Ball, Mesamia	48
ornata Linnavuori & DeLong, Perubahita	59
ornata Linnavuori & Heller, Yungasia	72
ornatus Linnavuori & DeLong, Parandanus	56
ourensis Zanol, Bahita	10
ourensis Zanol, Taperinha	65
Orolix Ribaut	42
orthana DeLong & Linnavuori, Paraphlepsius (Gamarex)	57
ovatus Van Duzee, Texanarus (Texanarus)	67
Oxycephalotettix Zahner	54
Pachytettix Linnavuori	54
pallidanus Cheng, Aplanatus	5
<i>pallida</i> Osborn, <i>Euscelis</i>	35
pallidens DeLong, Omanana	53
palliditarsis Stål, Bahita	10
<i>pallidus</i> Brown, <i>Chlorotettix</i>	22
<i>pallidus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	26
palmirensis Linnavuori, Parabahita	55
panamensis Linnavuori & DeLong, Caphodus	14
Parabahita Linnavuori	54
Paracalladonus Nielson	55
paraconus McKamey, Excultanus	34
Paracrassana Nielson	55
Paraganus Linnavuori	56
paraguaiensis Zanol, Garapita (Garapita)	41
Paralaca Lozada	56
paralus DeLong, Excultanus	34
Parandanus Linnavuori & DeLong	56
Paranurenus Nielson	56
Paraphlepsius Baker	56
Paraphlepsius (Gamarex) Hamilton	56
Paratanus Young	57
parrai DeLong, Excultanus	34
particula DeLong, Sinchonoa	63
parvicauda Linnavuori & Heller, Bandaromimus	12
pasoensis Linnavuori & Heller, Frequenamia	39
patula DeLong, Megabahita	46
pergradus DeLong, Texanarus (Texanarus)	68
perlata Linnavuori, Lajolla	45
perplexus Linnavuori & DeLong, Atanus	7

peruana Zanol, Yungasia	72
Perubahita Linnavuori & DeLong	59
Perundanus Zanol	59
peruvianus Zanol, <i>Neophlepsius</i> (<i>Neophlepsius</i>)	51
Phlepsobahita Linnavuori	59
<i>Phlepsius</i> (<i>Josanus</i>) DeLong	42
<i>Phlepsius</i> (<i>Zioninus</i>) Ball	66
<i>phorus</i> Cheng, <i>Neophlepsius</i>	51
picatus Gibson, Exitianus	36
picchuanus Linnavuori & DeLong, Atanus	7
picta Zanol, Menosoma	47
picturella Baker, Brazosa	13
pilosa Linnavuori & DeLong, Sinchonoa	63
pinus DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
piperatus Linnavuori & DeLong, Tingolix	69
placida DeLong, Eutettix (Guadlera)	32
plena Van Duzee, Frequenamia	39
plummeri DeLong, Excultanus	34
plummeri DeLong, Idiodonus	43
polymaculatus Cheng, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
portachela DeLong, Mesamia	48
<i>pravus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	26
procera DeLong, Bandara (Bandara)	11
Premanus DeLong	59
protensus Linnavuori, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
Pseudalaca Linnavuori	59
Pseudaligia Kramer & DeLong	60
Pseutettix DeLong	60
pseudotaeniata Linnavuori & DeLong, Menosoma	47
pseudundatus Linnavuori, <i>Mimodorus</i> (<i>Megadorus</i>)	49
psidii Linnavuori, Paratanus	58
puebla DeLong & Hershberger, Mesamia	48
pulchra Kramer & DeLong, Frequenamia	40
<i>pulchripennis</i> Linnavuori, <i>Garapita</i> (<i>Garapita</i>)	41
<i>pulchripennis</i> Baker, <i>Phlepsius</i>	70
pulverus DeLong, Retusanus	60
punctata Linnavuori, Taperinha	65
punctatus DeLong, Retusanus	60
punctatus Osborn, <i>Tropicarus</i> (<i>Tropicarus</i>)	71
pungens Linnavuori & DeLong, Yungasia	72
puntigera Linnavuori, <i>Neocrassana</i>	50
pupejua Zanol, Taperinha	65
quadratulus Osborn, Exitianus	36
quimilica Linnavuori, Frequenamia	40
rafaeli Zanol, <i>Neophlepsius</i> (<i>Neophlepsius</i>)	51
ramonensis Linnavuori, Copididonus	29
ramosa Linnavuori, Frequenamia	40
ramosi Linnavuori, Carelmapu (Carelmapu)	15
ramosus Linnavuori & DeLong, <i>Tingopyx</i>	69
randali Zanol, Menosoma	47
raunoi Zanol, Perundanus	59
rava Zanol, Frequenamia	40
<i>recurvatus</i> DeLong, <i>Chlorotettix</i>	21
redimiculus DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
reflexa Osborn, Suarezilinna	64

reitteratus Baker, <i>Thamnotettix</i>	73
rencana Linnnavuori & DeLong, <i>Desertana</i>	30
Renonus DeLong	60
reticulata Oman, <i>Baroma</i>	12
reticulata Osborn, <i>Frequenamia</i>	40
<i>retrorsus</i> Menezes, <i>Neophlepsius</i> (<i>Neophlepsius</i>)	51
Retusanus DeLong	60
reversa DeLong, <i>Conversana</i>	28
rhopalus Cheng, <i>Atanus</i>	8
riepmai Blocker & Larsen, <i>Cocrassana</i>	24
Rinconada Linnnavuori & DeLong	60
Rineda Linnnavuori & DeLong	61
roblesana Linnnavuori & DeLong, <i>Desertana</i>	30
rotundiceps Linnnavuori, <i>Huancabamba</i>	42
rotundiceps Linnnavuori, <i>Paratanus</i>	58
rotundiceps Linnnavuori & DeLong, <i>Sanestebania</i>	61
<i>rubellus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	44
<i>rubidus</i> Brown, <i>Chlorotettix</i>	18
rubraviridis DeLong, Renonus	60
rubrocincta Zanol, <i>Scaphoidula</i>	62
rugosa Zanol, <i>Taperinha</i>	65
rugicollis Linnnavuori, <i>Huachia</i>	42
runguenus Linnnavuori & DeLong, <i>Atanus</i>	8
ruptura DeLong, <i>Mesamia</i>	48
Saaddevra McKamey	61
<i>Saavedra</i> Linnnavuori & DeLong	61
sagittarius Linnnavuori, <i>Pachytettix</i>	54
sagittifer Linnnavuori & DeLong, <i>Atanus</i>	8
Sanestebania Linnnavuori & DeLong	61
Sanuca DeLong	61
saranensis Osborn, <i>Frequenamia</i>	40
sativae Young, <i>Paratanus</i>	58
Scaphoidula Osborn	61
schwartzii Ball, <i>Bonneyana</i>	13
scutellaris Linnnavuori, <i>Carelmapu</i> (<i>Carelmapu</i>)	15
scutellatus Osborn, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
<i>semipullanus</i> Van Duzee, <i>Thamnotettix</i>	26
separata Linnnavuori & Heller, <i>Caranavia</i>	15
separata DeLong & Hershberger, <i>Mesamia</i>	48
separata var. quadrripunctata DeLong & Hershberger, <i>Mesamia</i>	48
separatus DeLong, <i>Stoneana</i>	63
septempunctus Linnnavuori & DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
<i>Sequoiatettix</i> Bliven	25
serius Stål, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
serrata Linnnavuori & Heller, <i>Yungasia</i>	72
Serratus Linnnavuori	62
serratus Zanol, <i>Atanus</i>	8
<i>serratus</i> DeLong, <i>Chlorotettix</i>	16
serratus Nielson, <i>Colladonus</i>	27
serratus DeLong & Harlan, <i>Cozadonus</i>	29
serratus Zanol, <i>Serridonus</i>	63
serrellus DeLong, <i>Texananus</i> (<i>Texananus</i>)	68
serricauda Linnnavuori, <i>Atanus</i>	8
Serridonus Linnnavuori	62
serrulatus Zanol, <i>Atanus</i>	8

sexmaculatus Linnavuori, Ollarianus	52
<i>sexpunctatus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	25
sexvarus DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
sicca DeLong & Martinson, <i>Desertana</i>	31
signatipennis Linnavuori, Bergolix	12
<i>signatus</i> Osborn, <i>Phlepsius</i>	39
similaris DeLong, Omanana	53
similarus Godoy, <i>Ileopeltus</i>	44
similis DeLong, Bandara (Bandara)	11
simillima Linnavuori & DeLong, <i>Taperinha</i>	65
simplex Linnavuori & DeLong, <i>Rinconada</i>	61
sinchona DeLong & Linnavuori, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
Sinchona Linnavuori & DeLong	63
singularis DeLong, <i>Tropicanus</i> (<i>Cabimanus</i>)	69
singularius Nielson, <i>Colladonus</i>	27
sinopia Zanol, Bahita	10
sinopia Zanol, <i>Garapita</i> (<i>Garapita</i>)	41
sordida Lozada, <i>Paralaca</i>	56
<i>sonorae</i> Gillette & Baker, <i>Thamnotettix</i>	26
sparsa Osborn, <i>Frequenamia</i>	40
spatulata Zanol, Bahita	10
spatulata Zanol, <i>Megabahita</i>	46
spatulatus DeLong, <i>Jaacunga</i>	44
spatulatus Van Duzee, <i>Texananus</i> (<i>Texananus</i>)	68
spiralis Zanol, Bahita	10
spinara DeLong, Omanana	53
spinella DeLong, Bandara (Bandara)	11
spinellus DeLong & Martinson, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
spiniloba Linnavuori, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
spinilobus Linnavuori & DeLong, <i>Paratanus</i>	58
spiniventris Linnavuori, <i>Frequenamia</i>	40
spinosa Linnavuori & DeLong, Cahya	14
spinosa Zanol, <i>Scaphoidula</i>	62
spinosa DeLong, <i>Spinulana</i>	63
spinosus DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	22
spinosus Zanol, <i>Exitianus</i>	36
spinosus DeLong, <i>Ileopeltus</i>	44
spinosus Linnavuori, <i>Paraganus</i>	56
Spinulana DeLong	63
Stoneana DeLong	63
stonei DeLong, <i>Usanus</i>	71
striata DeLong, Omanana	53
striatus DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	23
strictus Ball, Ollarianus	52
stylata DeLong, <i>Megabahita</i>	46
<i>Suarezia</i> Linnavuori & DeLong	64
Suarezilima McKamey	64
subfuscus DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	23
superbus Van Duzee, <i>Texananus</i> (<i>Texananus</i>)	68
sycophanthus Linnavuori, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	23
taeniata Linnavuori & DeLong, <i>Comayagua</i>	27
taeniata Linnavuori, <i>Menosoma</i>	47
<i>taeniaticeps</i> Linnavuori, <i>Chlorotettix</i>	21
Taperinha Linnavuori	64
taulipangus Zanol, <i>Tropicanus</i> (<i>Tropicanus</i>)	71

tefeigua Zanol, Taperinha	65
Tenuisanus DeLong	65
tesselatus Osborn, Atanus	8
tessellatus DeLong, Chlorotettix (Chlorotettix)	23
tessellatus Nielson, Colladonus	27
tethys Van Duzee, Ileopeltus	44
Texananus Ball	65
<i>Texananus (Aridanus)</i> DeLong & Hershberger	66
Texananus (Iowanus) Ball	66
Texananus (Texananus) Ball	66
thalla DeLong, Parabahita	55
Tingolix Linnavuori & DeLong	69
Tingopyx Linnavuori & DeLong	69
tiputini Zahniser, Oxycephalotettix	54
titulus DeLong, Colladonus	27
tolucensis Nielson, Colladonus	27
torquea DeLong, Omanana	54
torqus DeLong & Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	23
trabilis Nielson, Colladonus	27
<i>transversus</i> Metcalf, <i>Euscelis</i>	35
tricolor DeLong & Hershberger, Exitianus	36
tricolor Zanol, Yungasia	72
trifurcatus Cheng, Atanus	8
trileta DeLong, Omanana	54
trilobata Linnavuori & Delong, Huachia	42
tripartitus DeLong, Ollarianus	52
trispinosa Linnavuori, Yungasia	72
Tropicanus DeLong	69
Tropicanus (Cabimanus) Linnavuori	69
Tropicanus (Tropicanus) DeLong	69
truncata Zanol, Bahita	10
<i>truncatus</i> Osborn, <i>Chlorotettix</i>	21
<i>Tubulanus</i> Linnavuori	5
<i>tubulus</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	26
<i>turpiter</i> DeLong, <i>Idiodonus</i>	26
ultimus Nielson, Colladonus	27
umbrina Linnavuori, Parabahita	55
uncinatus DeLong, Texananus (Texananus)	68
uncus DeLong, Texananus (Texananus)	68
undata Linnavuori, Neocrassana	50
undatus DeLong, Chlorotettix (Chlorotettix)	23
undatus Linnavuori, Mesadorus	47
unica Oman, Scaphoidula	62
unicampi Menezes, Zabrosa	72
uniformis Linnavuori & DeLong, Ollarianus	52
Usanus DeLong	71
valenciae Linnavuori, Chlorotettix (Chlorotettix)	23
variabilis Zanol, Bahita	10
variabilis DeLong, Cahya	14
variatus Zanol, Atanus	8
variegatus Linnavuori & DeLong, Paratanus	58
varigata DeLong, Spinulana	63
venosa DeLong, Costamia	29
venosula Berg, Frequenamia	40

venosus DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	23
ventriculus Cwikla, <i>Ileopeltus</i>	44
venustula Zanol, <i>Frequenamia</i>	41
verecundus DeLong, <i>Colladonus</i>	27
vermiculatus DeLong, <i>Texananus</i> (<i>Texananus</i>)	68
vestigii DeLong, <i>Ollarianus</i>	53
vezenyii Linnavuori, <i>Parabahita</i>	55
vicosa Linnavuori & DeLong, <i>Frequenamia</i>	41
vilhena Zanol, <i>Bahita</i>	11
vinculus DeLong, <i>Jaacunga</i>	44
v-nigrum Linnavuori, <i>Eusceloidia</i>	31
Virgana DeLong & Thambimuttu	71
virgus Linnavuori & DeLong, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	23
viridis Linnavuori, <i>Atanus</i>	8
viridius Van Duzee, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	23
vittatus Osborn, <i>Chlorotettix</i> (<i>Chlorotettix</i>)	23
vittulatus Berg, <i>Copididonus</i>	29
wagneri Linnavuori, <i>Lojanus</i>	45
webbi Zanol, <i>Scaphoidula</i>	62
wickhami Ball, <i>Idiodonus</i>	43
wygodzinskyi Linnavuori, <i>Paratanus</i>	58
wygodzinskyi recurvatus Linnavuori, <i>Paratanus</i>	58
xanthopus Linnavuori, <i>Atanus</i>	8
xavantinense Zanol, <i>Menosoma</i>	47
Yuraca Linnavuori & DeLong	72
yacapana DeLong, <i>Sanestebania</i>	61
yungasensis Linnavuori, <i>Parabahita</i>	55
Yungasia Linnavuori	71
yusti Young, <i>Paratanus</i>	58
Zabrosa Oman	72
zebula Kramer & DeLong, <i>Ilagia</i>	43

Recebido em 22 de fevereiro de 2008.