

**ATUALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA E DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE PLANORBIDEOS
NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL.**

ENNIO LUZ¹; SEBASTIÃO MARTINS SILVA²; ANTÔNIO PLÁCIDO DE CARVALHO²; NELSON CASTRO²

¹Departamento de Patologia Básica, Setor de Ciências Biológicas –Universidade Federal do Paraná.

²Fundação Nacional de Saúde, Paraná.

Os autores fazem uma atualização da distribuição dos Planorbideos que ocorrem no Estado do Paraná, discutindo as classificações de autores anteriores com relação às designações genérica e específica. Encontram 9 espécies, sendo 7 *Biomphalaria*, 2 de *Drepanotrema* e uma de *Antilorbis*: *Biomphalaria glabrata*, (53 municípios) *B. intermedia* (6 mun.) *B. occidentalis* (31 mun.) *B. oligoza* (3 mun.) *B. peregrina* (81 mun.) *B. straminea* (22 mun.) *B. tenagophila* (40 mun.) *Drepanotrema cimex* (51 mun.) *D. lucidum* (10 mun.) e *Antilorbis nordestensis*. (17 mun.).