

विषिंजम में ट्यूना मत्स्यन के लिए जीवंत चारा मछली की उपलब्धता

भूमिका

पोल आन्ड लाइन मत्स्यन केलिए जिवंत चारा मछलियों की माँग पड़ती है। स्किप जाक ट्यूना को पकड़ने केलिए पसिफिक, अटलांटिक और भारत महासागर में चारा मछलियों की कई जातियों का प्रयोग किया जाता है। चारा मछलियों में 34 कुटुम्बों की 230 जातियाँ पहचानी गई हैं। लक्षद्वीप, पोलआन्ड लाइन द्वारा ट्यूनाओं का व्यापक मत्स्यन होने वाला क्षेत्र है, वहाँ

चारा मछलियों की कमी महसूस होने पर विषिंजम में इसकी अपलब्धता पर अध्ययन चलाया गया। अध्ययन काल मई 1986 से एप्रैल 1987 है। अध्ययन का परिणाम नीचे के अनुसार है।

अनुयोग्य चारा मछली का मुख्य अभिलक्षण

ये नीचे के अनुसार हैं 1) अति प्रतिबिंबन होनेवाले पार्श्व वश (2) भ्रमणशील स्वभाव (3) छोड़ने पर पोत में वापस आने की प्रवणता (4) 6-8 से मी का लंबा अकार (5) प्रचुरता और

सारणी - 1 विषिंजम में बेटमछली की उपलब्धि और उनके मिलने का मौसम

कुटुम्ब	जाति	आकार मि मि में	मिलने का मौसम
सेसियोडिडे	सेसियो सेयरल्लास्यू	85-145	जनवरी-मार्च
एम्पेलिच्थिडे	डिप्लोरिगोनोटस	43-57	मार्च-अप्रैल
	ल्यूकोग्रामिकस	35-45	फरवरी-मार्च
लाक्रिडे	लाक्रोइड्सडियडस	75-90	फरवरी-मार्च
पोमासेन्ड्रिडे	पोमासेन्टस पावो	115-122	जनवरी-मार्च
	क्रोमिस सेरुलस	112-115	मार्च-अप्रैल
एपोगोनिडे	एपोगोन सांगियेनासिस	25-76	अप्रैल-अक्टूबर
एथेशिनिडे	प्रामिसस ड्यूओ डेसिमालिस	20-88	अक्टूबर-फरवरी
एम्बासिड	एम्बासिस जिम्नोसेफालस	10-140	अप्रैल अक्टूबर
क्लूपिडे	स्टोलेफोरस जातियाँ	20-215	अप्रैल-अक्टूबर और दिसंबर
	साराडिनेल्ला जातियाँ		अक्टूबर-दिसंबर

रिपोर्टर

पी.एस.बी.आर. जेम्स, एस. लाज़रस और सी.एस.जी. पिल्लै
सी एम एफ आर आइ कोची, केरल

आसानी से मिलना (6) संग्रहण स्थिति में अधिक समय जिंदा रहने की क्षमता।

विषिंजम से मिलनेवाली चारा मछलियाँ

विषिंजम और मिनिकॉय समान भूमध्यरेखा प्रदेश में स्थित



है ($8^{\circ}22' 30''$ N और $76^{\circ} 59' 15''$ E)। इन दोनों क्षेत्रों में वर्णित अभिलक्षणयुक्त जिवंत चारा मछली पाई जाती है। स्टोलेफोरस और सारडिनेल्ला की जातियाँ और वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण (नोनावु) के पश्च डिंभक व तरुण जो उचित

चारा मछलियाँ हैं यहाँ से पूरे वर्ष में प्राप्त होती हैं। यहाँ की प्रवाल झाड़ियों में पोमासेंट्रिडे, अपोगोनिडे और लाब्रिडे कुटुम्ब की मछलियाँ भी छोटी मात्रा में पाई जाती हैं। विषिंजम में उपलब्ध चारा मछलियों का विवरण सारणी - 1 में दिया गया है।

मुख्य शब्द/Keywords

- बैट मछली - bait fish/चारा मछली
- पोल आन्ड लाइन - pole and line
- स्टोलेफोरस - stolephorus
- सारडिनेल्ला - sardinella
- पोमासेंट्रिडे - pomacentridae
- लाब्रिडे - labridae



समुद्री मछलियों के बढ़त और प्रवास समझने को साटलैट अध्ययन

सी एम एफ आइ में मछलियों का प्रवास और बढ़त समझने को टैगिंग अध्ययन पहले भी चालू था। इसे अधिक प्रभावी बनाने को सी एम एफ आर आइ ने पोप - अप टैगों से येलोफिन ट्यूना का टैगन करके साटलैटों के ज़रिए अध्ययन करने की परियोजना में सहयोग दिया। INCOIS की निधिबद्धता से satellite telemetry studies on Migration pattern of Tuna in Indian seas नामक इस परियोजना से भारत का नाम पीत पश्च ट्यूनाओं के टैगन से साटलैट ट्रॉकिंग करनेवाले अग्रणी देशों में जोड़ा गया है।



सी एम एफ आइ के कर्मी दल द्वारा येलोफिन ट्यूना का टैगन करने का दृश्य

