

Annals d'Urologia, Vol. 5, num. 3, jul. 2005

ANÀLISI EPIDEMIOOLÒGICA I PATOLÒGICA DELS TUMORS GERMINALS TESTICULARS DURANT EL PERÍODE 1996-2004

A. Celma, E. Trilla, S. Esquena, JM. Abascal, R. Martos, C. Ramirez, C. Salvador, E. Gómez, J. Bestard, C. Raventós, Ll. Cecchini, J. Planas, J. Morote.

*Servei d'Urologia. Hospital General Universitari Vall d'Hebrón.
UAB. Barcelona*

INTRODUCCIÓ

Els tumors germinals testiculares són neoplàssies poc freqüents, representant un 1-2% dels tumors que afecten al varó jove. No obstant sembla que en els últims anys estem assistint a un augment de la seva incidència tal i com ho reflexen algunes dades de la literatura mèdica. La cirurgia juntament amb els protocols de quimioteràpia actuals permeten assolir alts nivells de curació.

MATERIAL I MÈTODES

Revisem retrospectivament la nostra sèrie de tumors testiculares germinals, durant el període comprés entre gener de 1996 i juliol de 2004. Evaluem la seva incidència i les característiques histopatològiques més importants.

RESULTATS

Durant el període estudiat, hem registrat un total de 66 tumors germinals (no valorem els tumors no germinals) dels quals 32 son drets i 34 esquerres. L`edat mitja al diagnòstic dels pacients és de 33.8 anys (rang 18-79). La incidència per anys ha estat: 4 casos al 1996, 4 al 1997, 2 al 1998, 6 al 1999, 4 al 2000, 5 al 2001, 13 al 2002, 19 al 2003 i 9 durant els primers sis mesos de 2004. Dels tumors evaluats, 31 son TG seminomatosos (26 clàssics i 5 anaplàsics) i la resta, 35 casos, TGNS majoritàriament de composició mixta. En quant a l'estadiatge, 45 casos foren pT1 i 11 pT2.

CONCLUSIÓ

En relació a les nostres dades, destaquem un important augment de la incidència de tumors germinals en els últims anys amb un clar punt d`inflexió al 2002. No trobem, en canvi diferencies en quant a la proporció de TGS i TGNS. Per tant hauriem d`evaluar possibles factors relacionats amb aquest augment del número de casos mitjançant estudis epidemiològics.