

Agenda del cunicultor

Tabla de operaciones periódicas a efectuar en una granja de conejos

P. Arveux

(*Cuniculture*, 60: 307, 1984)

Frecuencia	Operaciones
Diariamente...	<ul style="list-style-type: none"> –Control del medio ambiente y regulación del mismo. –Eliminar las deyecciones, si es preciso. –Alimentar los animales racionados, especialmente a partir del mediodía. –Presentación de conejas vacías al macho. –Instalación de nidales para partos a las conejas próximas a parir. –Control de los partos. –Control de gazapos en el nido. –Efectuar los registros necesarios en las fichas individuales y anotaciones en el planning.
Dos veces por semana...	<ul style="list-style-type: none"> –Efectuar los destetes, si se aplica el sistema de reproducción intensiva. –Efectuar palpaciones. –Llenar los comederos de los animales no sometidos a racionamiento.
Cada semana...	<ul style="list-style-type: none"> –Efectuar los destetes si se aplica el ritmo de reproducción semi-intensivo, según el planning. –Efectuar los registros generales de la granja. –Venta de gazapos. –Selección de animales de reposición. –Limpieza general del conejar (pasillos, suelos, pediluvios) –Desinfección de nidales, comederos, bebederos, etc., después de cada venta de animales.
Cada mes...	<ul style="list-style-type: none"> –Limpieza y escurrido de bebederos y depósitos con desinfectantes. –Limpieza de bombillas. –Limpiar el polvo y suciedad en general. –Comprobar el estado del material: cables, ventanas, tuberías, etc.
Cada cuatro meses...	<ul style="list-style-type: none"> –Aplicación de insecticidas sobre las paredes del edificio y junto a las fosas de deyecciones. –Realizar una fumigación del silo, tras haber procedido a la limpieza del mismo. –Controlar el grado de infestación parasitaria de los animales. –Vacunar a los reproductores y animales de reposición contra la mixomatosis.