

<sup>1</sup> Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju ♦ Klinika za unutarnje bolesti  
Klinička bolnica "Dubrava" ♦ Avenija G. Šuška 6 ♦ 10000 Zagreb  
<sup>2</sup>Imunološki institut ♦ Rockefellerova 2 ♦ 10000 Zagreb

## EKSPRESIJA TOLL-U SLIČNIH RECEPTORA U STANICAMA PERIFERNE KRVI BOLESNICA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM

### EXPRESSION OF TOLL-LIKE RECEPTORS IN PERIPHERAL BLOOD CELLS OF FEMALE PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOUS

Dragica Soldo-Jureša<sup>1</sup> ♦ Mirko Škoro<sup>1</sup> ♦ Melanie-Ivana Čulo<sup>1</sup>  
Jadranka Morović-Vergles<sup>1</sup> ♦ Alma-Martina Cepika<sup>2</sup> ♦ Alenka Gagro<sup>2</sup>

Sistemski eritemski lupus (SLE) je kronična autoimuna bolest vezivnoga tkiva koja se očituje upalom unutrašnjih organa, seroznih opni, kože i zglobova. Iako

etiologija bolesti još uvijek nije poznata, prepostavlja se da i zarazne bolesti mogu potaknuti razvoj SLE-a i biti okidač kasnijih relapsa.

Stanice urođene imunosti prepoznaju mikroorganizme putem Toll-u sličnih receptora (TLR; od engl. Toll-like receptors). Rezultati istraživanja posljednjih godina upućuju da su u patogenezi SLE-a značajni i TLR, posebice TLR9 i nešto manje TLR2. TLR9 prepoznaje nemetiliranu dvostruko-uzvojitu DNA, koja je najčešće bakterijskog ili virusnog porijekla. TLR2 prepoznaje različite komponente staničnog zida više vrsta mikroorganizama. Aktivacija TLR2 može, pod određenim uvjetima, poništiti supresivni efekt regulacijskih T-limfocita tijekom upale i time dokinuti održavanje periferne tolerancije.

Cilj našeg istraživanja bio je odrediti ekspresiju TLR2 i TLR9 u stanicama periferne krvi 11 novootkrivenih bolesnica sa SLE-om i 11 zdravih dobrovoljaca (kontrola) metodom protočne citometrije.

Bolesnice uključene u studiju bile su one u kojih je liječenje zahtijevalo primjenu hidroksiklorokina, koji blokira TLR9-signalizacijsku kaskadu. Ekspresija TLR2 određena je na CD14<sup>+</sup> monocitima, TLR9 u CD19<sup>+</sup> B-limfocitima, a rezultati su izraženi kao srednji intenzitet

fluorescencije (MFI; od engl. mean fluorescence intensity; odgovara broju receptora po pojedinoj stanici). Bolesnici su analizirani u tri vremenske točke: pri dijagnosticiranju SLE (a prije započinjanja liječenja), nakon 3 tjedna od početka liječenja kortikosteroidima (kada je uvođen u terapiju i antimalarik) te nakon 3 mjeseca.

U bolesnica sa SLE ekspresija TLR2 i TLR9 prije početka liječenja nije se razlikovala od ekspresije u zdravim kontrolama. Po uvođenju terapije, došlo je do smanjenja ekspresije TLR2 na monocitima u bolesnica u odnosu na izmjerenu ekspresiju u zdravim kontrolama. Suprotno tome, opazili smo statistički značajan prolazan porast ekspresije TLR9 u B-limfocitima u bolesnica nakon 3 tjedna terapije u usporedbi sa zdravim kontrolama ( $p=0,017$ ). Dakle, kad je klorokin dodan u terapijsku shemu, ekspresija TLR9 se snizila na vrijednosti koje su utvrđene u zdravim kontrolama. Daljnje istraživanje je u tijeku ne bi li se utvrdilo jesu li primijećene promjene posljedica liječenja ili aktivnosti same bolesti.

*Ključne riječi:* sistemski eritemski lupus, Toll-u slični receptori