

Odjel kliničke imunologije i reumatologije ♦ Klinika za unutarnje bolesti
Klinička bolnica "Dubrava" ♦ Avenija G. Šuška 6 ♦ 10000 Zagreb

***MIJEŠANA BOLEST VEZIVNOG TKIVA**
***MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASE**

Mirko Škoro ♦ Marija Škoro ♦ Magdalena Karadža ♦ Ankica Hrsan ♦ Dragica Soldo Jureša

U radu je prikazana 45 godišnja bolesnica koja je prvi puta u našoj klinici liječena 1994. godine. U prvom boravku su dominirali simptomi od strane mišićnog sustava: jaki bolovi i slabost mišića zdjeličnog i ramenog pojasa kao i otekline šaka. Od laboratorijskih nalaza sedimentacija je bila 100, CK 1350, ANF 1 1280. PHD mišića je potvrdila dijagnozu polimiozitisa. Liječena je kortikosteroidima i Metotrexatom. Kod sljedećeg boravka pojavljuju se simptomi sistemnog lupusa te znakovi sustavne progresivne skleroze. Bolesnica je tako praćena i liječena 12 godina. Tijekom svih ovih godina bolesnica se nije u potpunosti izdiferencirala u klasični entitet reumatske upalne bolesti nego su jednom dominirali simptomi jedne a u drugom navratu simptomi druge upalne reumatske bolesti. U siječnju 2005 godine dominantni simptomi su bili simptomi sustavnog lupusa i progresivne sustavne skleroze sa simptomima početne renalne insuficijencije. Mnogi autori osporavaju dijagnozu miješane bolesti vezivnog tkiva. Kod miješane bolesti vezivnog tkiva na-

padnuto je više sustava. Kod naše bolesnice u kliničkoj slici bili su dominantni preklapajući simptomi: sustavnog lupusa, polimiozitisa, sustavne progresivne skleroze i reumatoidnog artritisa. Bolest je znatno češća kod žena. Javlja se u srednjoj životnoj dobi. Naziv potječe od 1972 godine od Sharpa. Kod bolesnice su nađena anti RNP protutijela u visokom titru, visoki ANF (1:1280), pozitivan RF, protutijela na leukocite i limfocite, pozitivan DIF. Zbog imunološkog vaskulitisa javile su se ulceracije na prstima šaka, crijevima, plućima i bubrezima. Prvih pet godina bolesnica je bila liječena redovno, zatim se prestala liječiti četiri godine te se zadnje dvije godine ponovno liječi. U početku je bila liječena Metotrexatom i kortikostereoidima a od zadnjeg boravka Endoxanom 50 mg dnevno te Leflunomidom 20 mg dnevno. Prati se učinak lijekova leflunomida, endoxana i kortikostreoida.

Ključne riječi: miješana bolest vezivnog tkiva, klinička slika, laboratorijski nalazi, komplikacije, prognoza