



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دانشکده پرستاری و مامائی رازی

پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش داخلی - جراحی

عنوان:

بررسی ارتباط تکامل اخلاقی با دیسترس اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی

بیم در سال ۱۳۹۳

استاد راهنما اول: دکتر سبزواری

استاد راهنما دوم: دکتر میرزایی

توسط: اعظم رحمانیان

سال تحصیلی ۹۴-۹۳



**Investigating the relation between moral development and moral
distress in Bam University medical sciences nurses in 2014.**

A Thesis
Presented to
The Graduate Studies

By:

Rahmanian

In Partial Fulfilment
Of the Requirements for the degree
Master of Science in Nursing:

Kerman University Medical Sciences-International Campus

Jol 2015

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران جهت انجام مراقبت های روزمره خود باید از سطح مناسب تکامل اخلاقی برخوردار باشند. دیسترس اخلاقی یکی از مسائل اخلاقی شایع در حرفه بهداشتی است که می تواند عواقب متفاوتی را برای پرستاران به دنبال داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارتباط تکامل اخلاقی و دیسترس اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بم صورت گرفت.

روش: این مطالعه توصیفی بر روی پرستاران بیمارستان دانشگاهی شهر بم به صورت سرشماری، بر روی ۱۶۶ نفر در سال ۱۳۹۳ انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه دیسترس اخلاقی Corly و پرسشنامه تکامل اخلاقی Kohlberg بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون های توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون t با نمونه های مستقل و آنالیز واریانس استفاده شد.

یافته ها: ۱۰ نفر (۶/۰ درصد) از پرستاران در سطح پیش عرفی، ۵۱ نفر (۳۰/۷ درصد) در سطح عرفی، ۹۴ نفر (۵۶/۶ درصد) در سطح پس عرفی (NP) بودند. در سطح پیش عرفی افراد تابع اطاعت محض اند در سطح عرفی تابع قوانین و اصول اجتماعی و در سطح پس عرفی تابع اصول شاخص اخلاقی اند. بین تکرار دیسترس و سن رابطه معناداری وجود داشت ($P < 0/05$). یعنی هرچه سن پرستاران بالاتر بود شدت دیسترس کم تر بود. همچنین جنسیت بر روی شدت دیسترس اخلاقی پرستاران تأثیر داشت ($P < 0/05$) بطوری که در زنان شدت دیسترس بیشتر بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، هیچ گونه ارتباطی بین تکامل اخلاقی و دیسترس اخلاقی وجود نداشت، به بیان دیگر استرس های محیط کار هیچ تاثیری بر روی عملکرد اخلاقی پرستاران مورد مطالعه نداشت. سطح دیسترس اخلاقی در ابعاد شدت و تکرار در حد متوسط بود. همچنین تنها نیمی از پرستاران مورد مطالعه در سطح پس عرفی قرار داشتند که در کل بیانگر تناسب بودن سطح تکامل اخلاقی پرستاران بود که نشان دهنده لزوم توجه بیشتر مسئولین پرستاری به امر تربیت اخلاقی پرستاران می باشد.

واژگان کلیدی: تکامل اخلاقی، دیسترس اخلاقی، بیمارستان بم، پرستاری

Abstract

Background and Objectiv: Nurses for their daily care should have the appropriate level of moral development. Moral distress is one of the most common ethical issues in health profession that can have different consequences for nurses to be followed .This study aims to develop ethical and moral distress communication was in the Nursing Bam.

Methods: This study, a descriptive survey, was carried on 166 Bam medical science university hospitals' nurses in 2014, questionnaire based on Corley's Moral Distress and Kohlberg moral distress. Data were analyzed using SPSS 20 software, descriptive statistics Spearman's correlation coefficient, independent samples t-test and ANOVA were used.

Results: 10 Person (0.6%) of nurses in the pre-conventional level, 51 (30.7%) in conventional, 94 (56/6%) in the post-conventional (NP). At the pre-conventional level, individuals are mostly self-oriented and prefer obedience to avoid blame. At the conventional level people apply laws and social principles to decision-making, and at the post-conventional level they try to guide their actions and behaviors with regard to ethical principles and make humanist and ethical decisions. There was a significant relationship between age and repeated distress ($P < 0.05$), the age of nurses is lower the higher the intensity of distress. Gender also has an effect on the severity of moral distress nurses . So that women were more severe distress.

Conclusion: The results of this study, there was no relation between moral development and moral distress, in other words, workplace stress has no effect on the ethical performance of nurses do not study. Moral distress level was moderate in severity and recur. Also, only half of the nurses in the study were pre-conventional level of moral perfection in the expression of inadequate nursing care, indicating the need for more attention to the moral education of nurses.

Keywords: Moral development, Moral distress, Bam hospitals, nursery