

Beberapa Sifat Operator Hilbert-Schmidt Pada Ruang $L_2(M)$

Muslim Ansori

Jurusan Matematika, FMIPA Universitas Lampung
 Email : ansomath@yahoo.com

Abstract

Let $M_1 \subset \Re^m$ and $M_2 \subset \Re^n$ be measurable sets, respectively. A continuous linear operator $K : L_2(M_1) \rightarrow L_2(M_2)$ is a Hilbert-Schmidt operator if and only if there is a function $k \in L_2(M_2 \times M_1)$ such that

$$(Kf)(x) = \int_{M_1} k(x, y) f(y) dy$$

almost everywhere for every $f \in L_2(M_2)$; the function k is called kernel of K . If $\|K\|$ is the norm of K , then

$$\|K\| = \left(\int_{M_2} \int_{M_1} |k(x, y)|^2 dy dx \right)^{\frac{1}{2}} = \|k\|$$

The collection of the Hilbert-Schmidt operator from $L_2(M_1)$ into $L_2(M_2)$ is denoted by $K(M_1, M_2)$.

Further, we shall show that $K(M, M), M \subset \Re^n$, is *-algebra in $L_c(M, M)$.

Keywords : *involution, adjoint, *-algebra*

Abstrak

Diberikan himpunan-himpunan terukur $M_1 \subset \Re^m$ dan $M_2 \subset \Re^n$. Suatu operator linear kontinu $K : L_2(M_1) \rightarrow L_2(M_2)$ merupakan operator Hilbert-Schmidt jika dan hanya jika terdapat suatu fungsi $k \in L_2(M_2 \times M_1)$ sehingga

$$(Kf)(x) = \int_{M_1} k(x, y) f(y) dy$$

hampir di mana-mana, untuk setiap $f \in L_2(M_2)$; fungsi k tersebut dinamakan kernel atau pembangkit operator K . Jika $\|K\|$ menyatakan norm operator K , maka

$$\|K\| = \left(\int_{M_2} \int_{M_1} |k(x, y)|^2 dy dx \right)^{\frac{1}{2}} = \|k\|.$$

$K(M_1, M_2)$ oleksi seluruh operator Hilbert-Schmidt dari $L_2(M_1)$ ke $L_2(M_2)$. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa, $K(M, M), M \subset \Re^n$, dengan $K(M_1, M_2)$ menyatakan koleksi seluruh operator Hilbert-Schmidt dari $L_2(M_1)$ ke $L_2(M_2)$, merupakan aljabar-* di dalam $L_c(M, M)$.

Kata kunci : *involusi, adjoint, aljabar-**

1. PENDAHULUAN

Salah satu klas operator kompak yang penting dan banyak dikaji hingga saat ini, yaitu klas operator Hilbert-Schmidt. Penggunaan operator ini pada berbagai bidang, baik matematika sendiri maupun bidang aplikasi, lihat [3],[4] dan [5], merupakan pendorong

munculnya kajian-kajian baru sebagai pengembangan, yang disesuaikan dengan tantangan terkini. Pada paper ini, akan disajikan beberapa karakteristik operator Hilbert-Schmidt dalam bentuk integral. Misal H_1 dan H_2 merupakan ruang Hilbert separabel. Suatu operator terbatas $K : H_1 \rightarrow H_2$ dinamakan operator Hilbert-Schmidt, $K \in \text{HS}(H_1, H_2)$ dengan $\text{HS}(H_1, H_2)$ menyatakan koleksi semua operator Hilbert-Schmidt dari H_1 ke H_2 , jika terdapat basis ortonormal $\{e_n\} \subset H_1$ sehingga

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|Ae_n\|^2 < \infty.$$

Norm Hilbert-Schmidt-nya $\|K\|$, didefinisikan sebagai

$$\|K\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|Ae_n\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

dengan $Ae_n = \sum_{k=1}^{\infty} \langle Ae_n, d_k \rangle d_k$, $\{d_k\}$ merupakan basis ortonormal pada H_2 , dan

$$\|Ae_n\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle Ae_n, d_k \rangle|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle e_n, A^* d_k \rangle|^2 = \|A^*\|^2.$$

Berdasarkan pernyataan terakhir, diperoleh sifat berikut.

Teorema 1.1. Suatu operator terbatas $K \in \text{HS}(H_1, H_2)$ jika dan hanya jika operator adjoint $K^* \in \text{HS}(H_2, H_1)$ merupakan operator Hilbert-Schmidt, yaitu

$$\|K\| = \|K^*\|.$$

Sifat-sifat lain yang dapat diturunkan, antara lain:

- (i) $\|K\| \leq \|K\|$
- (ii) $\|\alpha K\| = |\alpha| \|K\|$,
- (iii) $\|K_1 + K_2\| \leq \|K_1\| + \|K_2\|$, dengan $K_1, K_2 \in \text{HS}(H_1, H_2)$.

Berdasarkan sifat (i), (ii) dan (iii) dapat disimpulkan bahwa $\text{HS}(H_1, H_2)$ merupakan ruang Hilbert, dengan perkalian dalamnya, $\langle \langle ., . \rangle \rangle$ didefinisikan sebagai

$$\langle \langle K_1, K_2 \rangle \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle K_1 e_n, K_2 e_n \rangle,$$

untuk setiap $K_1, K_2 \in \text{HS}(H_1, H_2)$.

Pada paper ini, akan dikaji operator Hilbert-Schmidt dari $H_1 = L_2(M_1)$ ke $H_2 = L_2(M_2)$, dengan $M_1 \subset \mathbb{R}^m$ dan $M_2 \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terukur, $L_2(M), M \subset \mathbb{R}^n$ merupakan ruang Lebesgue. Ditinjau sifat aljabar-* pada ruang koleksi seluruh operator Hilbert-Schmidt dari $L_2(M)$ ke $L_2(M)$, $M \subset \mathbb{R}^n$ dan kekompakannya.

2. OPERATOR HILBERT-SCHMIDT DARI $L_2(M_1)$ KE $L_2(M_2)$

Diberikan himpunan-himpunan terukur $M_1 \subset \mathbb{R}^m$ and $M_2 \subset \mathbb{R}^n$. Maka $M_2 \times M_1$ merupakan himpunan terukur di dalam $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$. Jika $k \in L_2(M_2 \times M_1)$, maka berdasarkan teorema Fubini,

$$\int_{M_1} |k(x, y)|^2 dy < \infty$$

hampir di mana-mana pada M_2 , yaitu $k(x, \cdot) \in L_2(M_1)$ hampir di mana-mana pada M_2 .

Didefinisikan operator $K : L_2(M_1) \rightarrow L_2(M_2)$ dengan rumus

$$(Kf)(x) = \int_{M_1} k(x, y) f(y) dy$$

h.d pada M_2 . Maka

$$|(Kf)(x)| \leq \|f\| \left\{ \int_{M_1} |k(x, y)|^2 dy \right\}^{\frac{1}{2}}$$

dengan $Kf \in L_2(M_2)$. Sehingga

$$\|Kf\| \leq \|f\| \left\{ \int_{M_2} \int_{M_1} |k(x, y)|^2 dy dx \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

Karena pemetaan $f \rightarrow Kf$ linear, maka K merupakan operator linear kontinu dari $L_2(M_1)$ ke $L_2(M_2)$ yang dibangkitkan oleh kernel k . Selanjutnya, K merupakan operator Hilbert-Schmidt, dengan norm

$$\|K\| = \left\{ \int_{M_2} \int_{M_1} |k(x, y)|^2 dy dx \right\}^{\frac{1}{2}}$$

seperti tertuang dalam teorema berikut.

Teorema 2.1. Diberikan himpunan-himpunan terukur $M_1 \subset \mathbb{R}^m$ and $M_2 \subset \mathbb{R}^n$. Operator $K \in L_c(L_2(M_1), L_2(M_2))$ merupakan operator Hilbert-Schmidt jika dan hanya jika terdapat suatu kernel $k \in L_2(M_2 \times M_1)$ sehingga

$$(Kf)(x) = \int_{M_1} k(x, y)f(y)dy$$

h.d pada M_2 , untuk setiap $f \in L_2(M_2)$

Bukti: Berdasarkan uraian sebelumnya, jika K memiliki sifat seperti di atas maka $K \in L_c(L_2(M_1), L_2(M_2))$ dan merupakan operator Hilbert-Schmidt yang dibangkitkan oleh k . Sebaliknya, diberikan basis ortonormal $\{e_n\} \subset L_2(M_1)$ dan $\{f_m\} \subset L_2(M_2)$, maka $\{g_{nm}\}$ dengan $g_{nm}(x, y) = f_m(x)\overline{e_n(y)}$ merupakan basis ortonormal pada $L_2(M_2 \times M_1)$, lihat [1]. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \|Ke_n\|^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} |\langle Ke_n, f_m \rangle|^2 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left| \int_{M_2} \int_{M_1} \overline{k(x, y)} e_n(y) dy f_m(x) dx \right|^2 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left| \int_{M_2} \int_{M_1} \overline{k(x, y)} e_n(y) f_m(x) dy dx \right|^2 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} |\langle k, g_{nm} \rangle|^2 \\ &= \|k\|^2 < \infty. \end{aligned}$$

Selanjutnya, koleksi operator Hilbert-Schmidt dari $L_2(M_1)$ ke $L_2(M_2)$ dinyatakan dengan $K(M_1, M_2)$.

Teorema 2.2. $K(M_1, M_2)$ merupakan ruang Banach.

Bukti: Jelas bahwa $K(M_1, M_2)$ merupakan ruang linear bagian dari $L_c(M_1, M_2)$. Selanjutnya, cukup ditunjukkan bahwa $K(M_1, M_2)$ lengkap. Karena $K(M_1, M_2) \subset L_c(M_1, M_2)$ dan $\|K\| \leq \|K\|$, untuk setiap $K \in K(M_1, M_2)$, maka untuk setiap barisan cauchy $\{K_n\} \subset K(M_1, M_2)$, juga merupakan barisan cauchy di dalam

$L_c(M_1, M_2)$. Karena kelengkapan $L_c(M_1, M_2)$, maka terdapat $K \in L_c(M_1, M_2)$, sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|K_n - K\| = 0.$$

Akan ditunjukkan bahwa $K \in K(M_1, M_2)$ dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|K_n - K\| = 0.$$

Diberikan sebarang bilangan real $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan positif n_0 , sedemikian hingga untuk $m, n \geq n_0$,

$$\|K_n - K\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Oleh karena itu,

$$\sum_{k=1}^s \|(K_n - K_m)e_k\|^2 \leq \|K_n - K_m\|^2 < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2$$

untuk setiap $m, n \geq n_0$, dan sebarang bilangan positif s . Selanjutnya, jika $m \rightarrow \infty$ dan mengingat $\lim_{n \rightarrow \infty} \|K_n - K\| = 0$, maka

$$\sum_{k=1}^s \|(K_n - K)e_k\|^2 \leq \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2$$

untuk setiap $n \geq n_0$ dan untuk $s \rightarrow \infty$ diperoleh

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|(K_n - K)e_k\|^2 = \|K_n - K\|^2 \leq \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2$$

untuk setiap $n \geq n_0$ dan $K_n - K \in K(M_1, M_2)$. Karena $K = K_n - (K_n - K)$ anggota $K(M_1, M_2)$. Dengan kata lain, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|K_n - K\| = 0$.

Selanjutnya juga dapat ditunjukkan bahwa jika k_1, k_2 masing-masing kernel dari $K_1, K_2 \in K(M, M)$, dengan $M \subset \Re^n$, maka fungsi $k \in L_2(M \times M)$ dengan

$$k(x, y) = \int_M k_1(x, z) k_2(z, y) dz$$

merupakan kernel dari $K = K_1 K_2 \in K(M \times M)$, lihat[2, exercise 4.5].

Akibat 2.3. $K(M)$ merupakan alabar Banach dan tertutup didalam $L_c(M)$.

Teorema 2.4. $K(M)$ merupakan suatu aljabar-* terhadap involusi $K \mapsto K^*$ dengan K^* merupakan adjoint dari K .

Bukti: Untuk setiap $H, K \in K(M)$ dan skalar α

(i) $(H + K)^* = H^* + K^*$, sebab, untuk sebarang basis ortonormal $\{f_n\} \subset L_2(M)$

$$\begin{aligned}\langle\langle (H + K)^*, L^* \rangle\rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle (H + K)^* f_n, L^* f_n \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle f_n, (H + K) L^* f_n \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle f_n, (HL^* + KL^*) f_n \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle f_n, HL^* f_n \rangle + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f_n, KL^* f_n \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle H^* f_n, L^* f_n \rangle + \sum_{n=1}^{\infty} \langle K^* f_n, L^* f_n \rangle \\ &= \langle\langle H^*, L^* \rangle\rangle + \langle\langle K^*, L^* \rangle\rangle \\ &= \langle\langle H^* + K^*, L^* \rangle\rangle\end{aligned}$$

(ii) $(HK)^* = K^* H^*$, sebab, untuk sebarang basis ortonormal $\{f_n\} \subset L_2(M)$

$$\begin{aligned}\langle\langle (HK)^*, L^* \rangle\rangle &= \sum \langle (HK)^* f_n, L^* f_n \rangle \\ &= \sum \langle f_n, (HK) L^* f_n \rangle \\ &= \sum \langle H^* f_n, KL^* f_n \rangle \\ &= \sum \langle K^* H^* f_n, L^* f_n \rangle \\ &= \langle\langle K^* H^*, L^* \rangle\rangle\end{aligned}$$

(iii) $(K^*)^* = K$, sebab, untuk sebarang basis ortonormal $\{f_n\} \subset L_2(M)$

$$\begin{aligned}\langle\langle (K^*)^*, L \rangle\rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle (K^*)^* f_n, L f_n \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle f_n, K^* L f_n \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle K f_n, L f_n \rangle \\ &= \langle\langle K, L \rangle\rangle\end{aligned}$$

(iv) $(\alpha K)^* = \bar{\alpha} K^*$, sebab, untuk sebarang basis ortonormal $\{f_n\} \subset L_2(M)$

$$\begin{aligned}\langle\langle (\alpha K)^*, L^* \rangle\rangle &= \sum \langle (\alpha K)^* f_n, L^* f_n \rangle \\ &= \sum \langle f_n, (\alpha K) L^* f_n \rangle \\ &= \sum \bar{\alpha} \langle f_n, K L^* f_n \rangle \\ &= \bar{\alpha} \sum \langle K^* f_n, L^* f_n \rangle \\ &= \sum \langle \bar{\alpha} K^* f_n, L^* f_n \rangle \\ &= \langle\langle \bar{\alpha} K^*, L^* \rangle\rangle\end{aligned}$$

Teorema 2.5. Setiap operator $K \in K(M)$

Bukti: Akan digunakan pengertian: K kompak jika dan hanya jika terdapat suatu barisan operator dengan rank hingga $\{K_n\} \subset L_c(M)$ sehingga $\|K_n - K\| \rightarrow 0$. Untuk setiap $k \in L_2(M \times M)$ terdapat skalar (α_{ij}) sehingga

$$k(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} \rho_i(x) \bar{\psi}_j(y)$$

dan

$$k_n(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \rho_i(x) \bar{\psi}_j(y)$$

dengan $\{\rho_i\}, \{\psi_j\}$ basis ortonormal pada $L_2(M \times M)$. Diperoleh

$$(K_n f)(x) = \int_M k_n(x, y) f(y) dy ,$$

dengan $\dim R(K_n) < \infty$. Karena $f \mapsto K_n f$ linear dan kontinu, maka $R(B)$ tertutup dan terbatas, dengan $B \subset L_2(M)$ dan $\|B\| \leq 1$. Oleh karena itu, $R(B)$ relatif kompak dan berakibat K_n kompak. Jelas bahwa K_n juga merupakan operator Hilbert-Schmidt.

Karena $K \in K(M)$, maka

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|K \rho_i\|^2 < \infty .$$

Oleh karena itu, untuk setiap bilangan real $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan bulat positif n_0 , sehingga

$$\sum_{i=n_0}^{\infty} \|K\rho_i\|^2 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Karena $K_n f \rightarrow Kf$, maka

$$\begin{aligned}\|Kf - K_n f\|^2 &= \left\| \sum_{i=n_0}^{\infty} \langle f, \rho_i \rangle K\rho_i \right\|^2 \\ &\leq \sum_{i=n_0}^{\infty} |\langle f, \rho_i \rangle|^2 \|K\rho_i\|^2 \\ &\leq \sum_{i=n_0}^{\infty} |\langle f, \rho_i \rangle|^2 \sum_{i=n_0}^{\infty} \|K\rho_i\|^2 \\ &\leq \|f\|^2 \sum_{i=n_0}^{\infty} \|K\rho_i\|^2\end{aligned}$$

dan

$$\|K - K_n\| \leq \sum_{i=n_0}^{\infty} \|K\rho_i\|^2 < \varepsilon$$

Terbukti.

3. PENUTUP

Berdasarkan kenyataan di atas, banyak hal yang dapat dikembangkan antara lain: pengembangan struktur aljabar-* pada $K(M)$ jika dipandang dari segi modul dan pengembangan konsep operator Hilbert-Schmidt dari ruang Hilbert ke ruang Banach dengan memperhatikan sifat-sifat mendasar pada operator Hilbert-Schmidt.

DAFTAR PUSTAKA

- [1].Conway, J.B.,1990. *A Course in Functional Analysis*, Springer Verlag, New York.
- [2].Weidmann, J., 1980. *Linear Operators in Hilbert Spaces*, Springer Verlag, New York.
- [3].Beukema, R.,2003. *Positive Operator-Valued Measures and Phase Space Representations*,Proeschrift,Technische Univ. Eindhoven.
- [4].Cirnu, M., 2004. *Contribution to The Mathematical Theory of Physical System*, Proceedings of The 3-rd International Colloquium, Math. in Engineering and Numerical Physics, Bucharest.
- [5].De Vito, E., Rosaco, L., 2005. *Learning From Examples As An Inverse Problems*, journal of Machine Learning Research.