

7

Imagerie des lésions lymphomateuses primitives mammaires, à propos de 9 cas

M.S. Bennani^{1,2}, R. Latib², H. Amrani³,
I. Chami², M. Boudida² et L. Jroundi²

Objectif

Analyse et illustration des caractéristiques d'imagerie du lymphome du sein.

Méthode utilisée

Étude rétrospective de cas de lymphome primitif diagnostiqués au service de radiologie d'INO avec description de leurs caractéristiques en fonction des différents moyens d'imagerie.

Résultats

La plupart des lymphomes primitifs étaient de type B et tous les cas se sont présentés avec une opacités nodulaire ; le plus souvent le nodule était solitaire, de densité moyenne et sans spiculation, des microcalcifications ou des distorsions architecturales associées ; au plan échographique, la plupart des nodules étaient hypoéchogènes et avaient des limites nettes et des contours bien définis.

Conclusion

Les lésions lymphomateuses primitives du sein ont des aspects mammographiques très variées mais dont certains aspects échographiques sont similaires et malgré leur rareté, ils tiennent une place à part parmi les tumeurs primitives mammaires.

1 CHU Limoges, 87000 Limoges

2 Institut national Oncologie, Rabat, Maroc

3 CHU Casablanca/Centre privé de sénologie, Casablanca Maroc