

# 85

## **Approche épidémiologique du diagnostic du cancer du sein féminin chez une population de l'ouest algérien Année 2010-2012**

K. Terki<sup>\*1</sup>, H. Messi<sup>2</sup>, S. Benmohamed<sup>3</sup> et N. Midoun<sup>1</sup>

Le cancer du sein est fréquent et touche toutes les populations mais avec des variations importantes de présentation et surtout de diagnostic [1].

Le profil épidémiologique reste commun pour certaines caractéristiques et diffère sur d'autres. Il est le premier cancer chez la femme et le plus fréquent des cancers féminins. En Algérie et plus particulièrement à Oran, le cancer du sein survient chez la femme jeune : le pic est enregistré à 45 ans [2]. Des actions d'information et de sensibilisation sont réalisées de façon permanente, vue l'absence d'un programme organisé de dépistage. La plupart des malades arrivent à un stade avancé avec une extension locorégionale : un constat fait par les praticiens [3]. La précocité du diagnostic reste la seule méthode de prévention de la pathologie. Notre travail est de donner une approche épidémiologique du stade de diagnostic du cancer du sein féminin à Oran.

Une étude rétrospective est réalisée sur 500 dossiers de femmes atteintes de la maladie. Les résultats montrent que le diagnostic est généralement fait par la malade: elle se présente à un stade avancé de la maladie avec un signe clinique palpable (nodule 56,3 % localisé surtout au quadrant supéro-externe 34,5 %, ou une masse mammaire : 17,6%). Les adénopathies axillaires sont retrouvées chez les 53 % des cas. Le type histologique le plus retrouvé est le carcinome canalaire infiltrant (55 %) et 6 % des patientes arrivent déjà avec des métastases.

Devant cette situation, la prise en charge devient de plus en plus complexe et mobilise des ressources beaucoup plus importantes et impose une surcharge

---

\* Auteur correspondant

1 Établissement hospitalier et universitaire, Oran, Algérie

2 Centre Hospitalo-Universitaire, Oran, Algérie

3 Établissement hospitalier et universitaire, service d'épidémiologie et de médecine préventive, Oran, Algérie

économique sans résultat attendu : la survie diminue chez ces malades. Devant l'absence d'un programme de dépistage organisé [4], ce dernier peut être individuel associé à l'information et la sensibilisation de la population féminine de l'importance du diagnostic à un stade précoce pour améliorer la qualité de la prise en charge.

## Références

1. Espié M, Tournant B, Cuvier C, Cottu PH (2001) Épidémiologie des lésions malignes du sein. *Encycl Méd Chir (Elsevier SAS) 840-A-15*
2. Mokhtari L et al. Le registre du cancer à Oran : Rapport de l'année 2010. – Edition 2013
3. Hamdi Cherif M (2010) Enregistrement du cancer en Algérie : Registre du Cancer de Sétif Algérie : Contexte et évolution, Journées Francophones de Lutte Contre le Cancer pour les pays en voie de développement, Montpellier 8-9 avril 2010
4. Dépistage organisé du cancer du sein : Special issue – the french breast cancer screening programme: *Bull Epidemiol Hebd* du 26 septembre 2012 / n° 35-36-37