

EQUINOS

Alimentação de cavalos árabes na Fazenda Canchim

Airton Manzano

Ha alguns anos a alimentação dos equinos vem entrando em fase de grande progresso tecnológico, melhorando e se tornando mais econômica.

Iniciaram-se, em 1975, na Unidade de Execução de Pesquisa de âmbito Estadual de São Carlos, (Fazenda Canchim), Embrapa, algumas experiências sobre alimentação de cavalos árabes, na qual, segundo se admite, repousam 80% do êxito na criação dessa espécie. Ante a falta de investigação, a alimentação dos equinos tem sido mais arte do que propriamente ciência. Assim, a maioria dos criadores ainda utiliza antigas teorias de alimentação baseadas no trinômio milho-aveia-alfafa, a qual se assemelha a uma receita culinária.

Nos últimos anos, graças ao fenômeno conhecido como o "retorno ao cavalo", a nutrição dos equinos está atravessando uma fase de grande progresso tecnológico. Na Europa, e principalmente nos Estados Unidos, as Estações Experimentais têm-se dedicado intensivamente ao assunto. Esses trabalhos têm permitido que os criadores estabeleçam programas práticos, de forma que os

27 sobre nutrição, com 215 técnicos. Infelizmente, em nosso meio, poucos são os pesquisadores que se dedicam a esse campo da nutrição animal. Conseqüentemente, os criadores não dispõem de elementos que lhes permitam estabelecer programas suficientes para alimentação dos animais.

Com o objetivo de proporcionar aos criadores soluções eficientes e econômicas para os inúmeros problemas da alimentação, a Fazenda Canchim desenvolveu um trabalho visando a substituir o arraçoamento tradicional, isto é, o fornecimento de concentrado e volumoso, três vezes ao dia, (7 horas: metade do concentrado; 13 horas: metade do concentrado e um terço do volumoso; 17 horas: dois terços do volumoso) por uma ração completa peletizada, três vezes ao dia, no mesmo horário.

A ração utilizada era constituída de 60% de feno de alfafa, 34% de milho e 6% de farelo de soja. Os animais tiveram sempre, dentro das

Características	RCP	AT
Ganhos médios diários (kg)	0,786	0,711
Consumo médio diário (kg) de matéria seca	5,563	5,275
Conversão alimentar média	7,345	7,740

AT - Arraçoamento tradicional
RCP - ração completa peletizada.

Os resultados indicaram que não houve diferenças entre os dois métodos de alimentação em qualquer dos critérios de avaliação utilizados. Em vista disso foi possível substituir plenamente o arraçoamento tradicional pela ração completa peletizada. Esse tipo de ração, peletizado, elimina uma série de inconvenientes, tais como corte diário de verde, desperdício da ordem de 20% do feno quando fornecido nas baias, produção, estocagem e fornecimento diário de feno, impossibilidade de automatizar o fornecimento de ração etc. Além das vantagens expostas, esse processo influi de forma acentuada no custo de produção, redução da possibilidade de incorporação às rações, de alimentos menos palatáveis porém de bom valor nutritivo. Esse tipo de arraçoamento é aconselhável para animais em regime de confinamento.

Dentro dessa mesma linha de pesquisa, outro estudo visou à substitui-

ção total ou parcial do feno de alfafa por feno de forrageiras tropicais. Começou-se com o feno de rodes, graminéa excelente para fenação, com boa produção e valor nutritivo, como demonstram os trabalhos de Vida Pedroso de Faria e Moacyr Corsi, do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", de Piracicaba. As rações eram constituídas de 60% de concentrado, 40% de feno de rodes 60% de concentrado, 20% de feno de rodes e 20% de feno de alfafa e 60% de concentrado e 40% de feno de alfafa. Utilizaram-se na experiência 24 fêmeas em crescimento, 12 da raça árabe e 12 da raça mangalarga, com a idade média de 20 meses e peso médio de 276 kg aproximadamente.

O concentrado na forma farelada, com cerca de 19% de proteína bruta, era constituído de 40% de torta de algodão, 40% de rolão de milho e 20% de farelo de trigo. Os resultados foram os seguintes:

Características	60% concentrado nas três rações 40% feno de rodes 20% feno rode, 20% feno alfafa 40% feno alfafa		
Ganhos médios diários	0,446	0,509	0,659
Consumo médio diário (kg) de matéria seca	0,976	9,032	8,329
Conversão alimentar média	21,402	19,578	12,855
Custo diário com alimentação animal (CRS)	9,281	12,897	18,273

Embora os resultados tenham mostrado diferença significativa entre ganhos diários de peso, mostrando-se superior a terceira ração, os ganhos de peso obtidos com as duas outras rações são superiores aos recomendados por tabelas norte-americanas para animais de 18 meses e peso adulto entre 400 kg e 500 kg. Acrescida a esses ganhos, a esti-

mativa econômica indicou que a melhor forma de arraçoamento foi a de feno de rodes. Os resultados dessas pesquisas já têm sido comprovados na criação da própria empresa, não só em sua ação, como, principalmente, na produtividade, que atingiu, em 1977, um índice de natalidade de 85% para os plantéis puros e de 60% para o rebanho mestiço.