

# Repetición de la prueba de tuberculina en una cohorte local de pacientes con artropatía inflamatoria en tratamiento biológico. Estudio preliminar.

Santos Ramírez C<sup>1</sup>, Rosas Gómez de Salazar J<sup>2</sup>, Senabre Gallego JM<sup>2</sup>, Santos Soler G<sup>2</sup>, Barber Vallés X<sup>3</sup>, Sánchez Barrioluengo M<sup>4</sup>, Salas Heredia E<sup>2</sup>, Llahí Vidal N<sup>5</sup>, Cano Pérez C<sup>5</sup>, Riestra Juan R<sup>5</sup>. Hospital Marina Salud, Denia<sup>1</sup>. Hospital Marina Baixa, Villajoyosa<sup>2</sup> CIO-UMH de Elche<sup>3</sup>. INGENIO (CSIC-UPV)<sup>4</sup>. Enfermería de Reumatología, Hospital Marina Baixa, Villajoyosa<sup>5</sup>

## Objetivo


Conocer el porcentaje de positivización de la prueba de la tuberculina (PPD) en un registro local de pacientes con artropatía inflamatoria en tratamiento biológico durante más de 2 años.

## Material y Métodos

- **Tipo de estudio:** observacional transversal.
- **Población de estudio:** 195 pacientes en tratamiento biológico en seguimiento habitual en la Consulta de Reumatología del Hospital Marina Baixa.
- **Método:**
  - Repetición del PPD en aquellos pacientes en los que previamente fue negativo (incluido booster) al momento de iniciar el primer tratamiento biológico.
  - PPD o booster positivo: induración  $\geq 5\text{mm}$ , a las 72h.

## Resultados

• N total (pacientes):	188
• Excluidos (falta de datos):	7
• Resultado primer PPD (%):	
• Positivo:	43
• Negativo:	145
• Analizados segundo PPD (%):	26
• Positivo:	0
• Negativo:	26
• Tiempo medio entre PPD 1º y 2º:	46,88 meses (DE 31,92)



**Tabla 1.** Distribución por patologías y por resultado de la primera prueba de tuberculina

Diagnóstico (N total)	N	Negativo
		% de N
AIJ (7)	7	100
Aps (18)	16	88,89
AR (93)	74	79,57
EA (63)	43	68,25
Otros (7)	5	71,43
<b>Total (188)</b>	<b>145</b>	<b>77,13</b>

AIJ: artritis idiopática juvenil. Aps: artritis psoriásica. AR: artritis reumatoide. EA: espondilitis anquilosante.

## Conclusiones

- El 100% de las pruebas de tuberculina repetidas en nuestra cohorte local de pacientes con artropatía inflamatoria continuó siendo negativa.
- El tiempo medio transcurrido entre la realización de la primera y la segunda es de aproximadamente 4 años.