

*** Marcadores virais das hepatites B, C, e Delta, em pacientes com Cirrose Hepática.** Janice Barros Monteiro(*); Gecildo Soriano dos Anjos; Fernando L. Ferreira(**); Júlia M. L. Sacramento(***); Leila Inês A. R. C. Coelho(***). Universidade do Amazonas.

Objetivando associar e correlacionar infecções pelos vírus B, C e DELTA da hepatite e Cirrose Hepática (C.H.), foram atendidos no Serviço de Hepatopatias do Ambulatório Araújo Lima no período de junho de 1992 à maio de 1994, 78 pacientes com diagnóstico clínico de tal patologia, e realizado sorologia para hepatite.

Dos 78 pacientes, 51 (65.38%) apresentaram-se positivos para o vírus B, e os demais (34.61%) negativos. Em relação aos pacientes com C.H. Alcoólica, 23 (85.18%) eram HBsAg (-), enquanto que nos pacientes com C.H. pós-necrótica, este percentual de negatividade foi bem inferior, como seja, 29.51%, contra 70.58% de positividade. Neste mesmo estudo, observou-se que dos 9 pacientes portadores de Hepatocarcinoma, 4 (44.44%) foram sorologicamente positivos para HBsAg.

Neste presente estudo, pôde-se concluir o seguinte:

- 1 - Mais da metade dos pacientes com C.H. (65.38%) foram HBsAg(+);
- 2 - A grande maioria dos pacientes com C.H. pós-necrótica (70.58%) mostraram-se positivos para o vírus B da Hepatite, evidenciando a participação deste agente na etiologia de tal patologia;
- 3 - Como apenas 4 (14,18%) pacientes com C.H. Alcoólica apresentaram HBsAg(+), o álcool etílico passa a representar o principal envolvido na gênese de tal entidade clínica.

(*) Bolsista de Iniciação Científica

(**) Orientador

(***) Colaborador