

## Formigues de Cadaquers (província de Girona)

Capturades en setembre de 1929

Determinades per C. MEN ZZI

pel

Dr. R. ZARIQUEY (fill)

- Crematogaster auberti* v. *iberica* (For.).  
*Tetramorium semilaevis* (Andre).  
*Camponotus sylvaticus* v. *massiliensis*.  
     "    *lateralis spissinodis* v. *figaro* (Em.).  
*Formica subrufa* (Rop.).  
*Pheidole pallidula* (Nyl.).  
*Leptothorax niger* (For.).  
*Mesor barbarus* (L.).  
*Lasius flavus* (F.).  
     "    *niger* (L.).  
*Plagiolepis pygmaea* (Latr.).  
*Solenopsis fugax* (Latr.).

## Notes bibliogràfiques

**Los Escólidos de la Península Ibérica.** — José M.<sup>a</sup> DUSMET i ALONSO. «Eos», Revista Española de Entomología. Junta para Ampliación de Estudios, t. VI, cuad. 1.º, 10 de abril 1930, pgs. 5-82. Madrid. — Els Escòlids ibèrics tenen ara un acurat estudi, adés en conjunt adés en relació amb les regions limitrofes mercès a la diligència i provat crèdit científic de l'autor d'aquest nou treball per a l'aclariment de la nostra embrollada fauna himenopterològica, especialment, quan, com en aquesta família; es tan accentuat el dimorfisme sexual. Després dels caràcters generals, història, nombre d'espècies i distribució geogràfica, diferències amb d'altres famílies i llista bibliogràfica, exposa l'autor en cada gènere, després de