

NOTA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL LAGARTO VERDINEGRO (*LACERTA SCHREIBERI* BEDRIAGA, 1878)

Antonio Bea *

Rebut: abril 1980

SUMMARY

Note on the distribution of the Schreiber's green lizard (*Lacerta schreiberi* Bedriaga, 1878)

Two new quotations of *Lacerta schreiberi* are presented. Both of them are from Guipúzcoa and that permits to extend the oriental limit of the area of distribution of the species and also to check definitively its presence in the Basque Country.

Las primeras citas sobre la distribución de esta especie datan de 1878, fecha en que Bedriaga la describió: dio como *terra typica* Asturias. BOSCA (1880) reconoce la especie y cita varias localidades, de entre las que cabe destacar Vitoria como más oriental. BOULENGER (1884; ver MERTENS & WERMUTH, 1960) reconoce la especie y da como *terra typica* Algarbe (Portugal); posteriormente, en 1919, reconoce las citas de Bosca y da una primera distribución de la especie, situándola en el norte, Asturias, León, Castilla la Nueva y Vascongadas. DÜRIGEN (1897; ver MERTENS & WERMUTH, 1960) sitúa como *terra typica* el norte de España.

Recientemente se poseen los datos de CRESPO (1972, 1975) para Portugal; este autor sitúa la especie en el oeste y noroeste de la península. SALVADOR (1974) da la siguiente distribución: Portugal, Sistema Central, Galicia y Asturias. ARNOLD & BURTON (1978) amplían la anterior distribución a todo el norte de la península, comprendidas las Vascongadas.

En la presente nota se hacen públicas dos nuevas localidades para la especie, a la vez que se confirma su presencia en las Vascongadas, concretamente en Guipúzcoa, donde se sitúa el límite más oriental de su distribución, representado por la localidad de Fuenterrabía.

Un ejemplar fue capturado por miembros de Aranzadi (San Sebastián) en Cestona (Zumaya, 30TWN68) el 24 de agosto de 1972; en la actualidad este ejemplar se encuentra depositado en la colección del Dr. F. Palacios (Madrid). Una hembra adulta con 11 huevos en su interior fue capturada por el autor en Guadalupe (Fuenterrabía, 30TWN90) el 29 de junio de 1979; este ejemplar presentaba ciertas irregularidades en la disposición de las hileras de escamas ventrales, por lo que fue definitivamente catalogado por el Dr. J. P. Martínez-Rica (Jaca). Actualmente está depositado en la colección del autor.

* Sección de Vertebrados. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo de San Telmo. San Sebastián. Guipúzcoa.

BIBLIOGRAFIA

- ARNOLD, E. N. & BURTON, J. A. 1978. *Guía de campo de los Reptiles y Anfíbios de España y de Europa*. Omega. Barcelona.
- Boscá, E. 1880. Catalogue des Reptiles et amphibiens de la Péninsule Ibérique et des îles Baléares. *Bull. Soc. Zool. France*, V: 240-287.
- BOULENGER, G. A. 1918. Le lézard vert de la Péninsule Ibérique, ses variations et sa distribution. *Bull. R. Soc. Española Hist. Nat.*, XIX: 59-66.
- CRESPO, E. G. 1972. Répteis de Portugal continental das colecções do Museu Bocage. *Arq. Mus. Boc. (2a. Serie)*, III (17): 447-612.
- CRESPO, E. G. 1975. Aditamento aos catálogos dos Répteis e Anfíbios de Portugal continental das colecções do Museu Bocage. *Arq. Mus. Boc. (2a. Serie)*, V (3): 479-498.
- MERTENS, R. & WERMUTH, H. 1960. *Die Amphibien und Reptilien Europas*. W. Kramer. Frankfurt am Main.
- SALVADOR, A. 1974. *Guía de los Anfíbios y Reptiles españoles*. ICONA. Madrid.