

Contribución al conocimiento de los lepidópteros del Valle de Arán

Algunas capturas nuevas para España

POR

MARIANA YBARRA

En mis vacaciones en el Valle de Arán (Lérida) he tenido la agradable sorpresa de ver volar una *Procris* negra cerca de Lès, sobre una colina pedregosa con escasa vegetación de tipo atlántico: algunos arbustos de *Prunus spinosa* en medio de gran cantidad de *Calluna vulgaris*.

Deseando conocer la identidad de mi captura, tan parecida a otras *Procris* (p. e. *ampelophaga*), he pedido a mi colega francés, Mr. YVES DE LAJONQUIERE, de examinar la genitalia, resultando ser, sin lugar a dudas, *Rhagades (Procris) pruni* D. y SCHIFF., especie que si bien conocida de Francia, no había sido, hasta el presente, citada de España, no figurando en el Catálogo Ordenador del Sr. AGENJO.

Rhagades pruni (18 ejemplares, del 2-VI al 3-VII, 1964) no es ni mucho menos la única especie descubierta por mí en el Valle de Arán, pudiendo asimismo señalar la interesante captura de más de 30 ejemplares de *Araschnia levana*, forma estival *prosa*, del 30-VI al 12-VII de 1963, fecha en la que regresé del Valle, aún cuando la caza estaba en su apogeo. El año anterior, en mayo, había ya cazado un solo ejemplar de la forma de primavera, *levana*. Los numerosos ejemplares capturados en 1963, prueban que esta especie se halla bien establecida en España.

Por referencias de mis colegas franceses, parece ser que *A. levana*, nórdica en un principio, se está extendiendo hacia los Pirineos, en cuya vertiente francesa mi colega YVES DE LAJONQUIERE cogió un único ejemplar el 10-IX-1958, no lejos del Valle de Arán (Capvern, Htes. Pyrénées).

No menos interesante es el descubrimiento en el repetido Valle de *Plusia bractea* D. y SCHIFF. y *Plusia aemula* D. y SCHIFF. que no figuraban en la fauna española, como tampoco en la pirenaica francesa, y sólo conocidas hasta el momento de los Alpes, tal como consta en el artículo que el prestigioso especialista de *Noctuidae*, Mr. CH. BOURSIN ha publicado en el Bull. Mens. de la Soc. Linnéenne de Lyon, 33e Ann. 1-I-1964.

He capturado estas dos especies en los alrededores de Salardú y Viella, a unos 1550 m. de altitud, durante tres años casi consecutivos y en cantidad relativamente importante tal como indica el siguiente cuadro:

1958.	13-VII al 4-VIII.-20	<i>P. bractea</i> y	9	<i>P. aemula</i>
1961.	1-VIII al 14-VIII.-	id.	14	id.
1962.	17-VII al 2-VIII.-30	id.	19	id.
Total.....	56	id.	42	id.

La última especie que señalo hoy es un ropalócero de la familia *Hesperidae*, *Pamphila palaemon* PALL., del que capturé un único ejemplar en los prados de Lès (Valle de Arán) en la primera quincena de mayo de 1963.

Se trata de una especie nada frecuente en regiones tan meridionales y que mi colega francés Mr. YVES DE LAJONQUIERÉ me dijo haber cogido hace tiempo un ejemplar en Mont Ayre, Bareges (Htes. Pyrénées).

Hasta el presente, *P. palaemon* tampoco había sido señalada de la fauna española.