

**Algunas formas nuevas del género *Dorcadion* Dalm.  
de la Península Ibérica (Col. Cerambycidae)**

POR

ST. VON BREUNING

***Dorcadion* (*Iberodorcadion*) *becerrae* Lauff. ssp. *pulvipenne* m. *partereductum* nov.**

Como *pulvipenne*. Esc. pero la banda humeral reducida tan sólo a unas pequeñas manchas.

*Holotipo*, macho de la provincia de Soria: Puerto de Oncala, 1 de julio 1969, leg. J. Vives, en la coll. Vives. *Paratipos* 7 ejemplares, ídem.

***Dorcadion* (*Iberodorcadion*) *segovianum* Chvrl. m. *postdorsale* nov.**

Como m. *merceti* Schr., pero sobre cada élitro dos bandas postdorsales blancas; una corta y muy estrecha interna, y otra ancha externa, iniciándose un poco antes de la base y alcanzando el tercio apical.

*Holotipo*, macho de la provincia de Avila: Puerto de Villafranca, Piedrahita, 5 de junio 1966, 1.800 m., leg. F. Español en la col. del Museo de Barcelona. Un paratipo ídem.

***Dorcadion* (*Iberodorcadion*) *fuliginator* L. ssp. *urgulli* nov.**

Como m. *monticola* Muls., pero el tubérculo lateral del pronoto sensiblemente más largo y menos obtuso; pronoto sin restos de banda longitudinal mediana lisa.

*Holotipo*, macho de San Sebastián; Mte. Urgull, leg. Muntada, en la col. del Museo de Zoología de Barcelona.

*Paratipos* 1 macho Mt. Urgull, VI. 1953, leg. Bernáldez; 1 hembra Mt. Urgull, VII. 1952, leg. Bernáldez, en col. Vives.

***Dorcadion* (*Iberodorcadion*) *mimomucidum*, nov. sp.**

Próximo a *mucidum* Dalm., pero con el escapo sin cicatriz; los últimos artejos antenares apenas mayores que los anteriores; la cabeza con puntuación densa y grosera; el pronoto con puntuación irregular, bastante densa y grosera a diferencia de los élitros que son muy finamente puntuados. Long. 14 mm. Anch.: 4,5 mm.

*Holotipo*: macho de Portugal, Extremadura, Canecas, 19 abril 1963.

*Paratipo*, un macho ídem, en la col. Vives.