

BOTANICA

Targionia Lorbeeriana K. Mull. en Mallorca

Por C. Casas de Puig

Estando en prensa mi pequeña aportación a la flora hepaticológica balear publicada en el anterior Boletín, llegaron a mi conocimiento dos notas recientes de V. ALLORGE (1) y S. JOVET-AST (2) sobre la *Targionia Lorbeeriana* K. Mull. En una de ellas se describen con todo detalle los caracteres diferenciales entre esta especie descrita por K. MULLER y *Targionia hypophylla* L. en la otra se da a conocer su presencia en España donde había pasado desapercibida anteriormente, confundida con a *T. hypophylla*. La lectura de estas dos notas me hizo sospechar que *T. Lorbeeriana* de dispersión atlántico-oeste-mediterránea se encontrase también en Mallorca y como los anteriores briólogos la hubiese confundido con la *T. hypophylla*. Revisé nuevamente mis recolecciones y las que el Sr. J. Palau y el Sr. J. Orell me habían proporcionado y efectivamente todos los ejemplares estudiados pertenecen a *T. Lorbeeriana* sin que entre las numerosas muestras examinadas se encuentre ninguna *T. hypophylla*. Estas dos especies son muy parecidas y pueden vivir en las mismas localidades; los caracteres diferenciales son pequeños, pero están bien descritos en el trabajo de V. ALLORGE y S. JOVET-AST el cual me permitió indentificar bien esta especie. No obstante tuve ocasión de estudiar unos ejemplares en el mismo Laboratorio de Criptogamia de Paris conjuntamente con las Sras. ALLORGE y JOVET-AST que confirmaron la determinación.

No he podido comprobar si la *T. hypophylla* citada anteriormente por BARCELO, NICHOLSON y KNOCHE pertenece verdaderamente a esta especie o a la nuevamente descrita por K. MULLER. Es posible que *T. hypophylla* se encuentre en Mallorca pero en este caso puedo creer que será poco fre-

-
- (1) ALLORGE, V. et JOVET-AST, S.—*Targionia Lorbeeriana* K. M. dans la Péninsule ibérique, aux Açores et aux Canaries. Rev. Bryol. et Lij. T. XXV fasc. 1-2, 1956.
 (2) JOVET-AST, S.—*Trois Hépatiques marocaines*. Rev. Bryol. et Lij. T. XXV, fasc. 1-2, 1956.

cuenta puesto que entre todo el material observado no la he visto ni una sola vez. Las citas y comentarios que daba en mi nota aparecida en el anterior Boletín deben referirse pues a *T. Lorbeeriana*, añadiendo así una nueva hepática a la flora balear. Se debe admitir con reservas la *T. hypophylla* citada por los autores, mientras no se tenga un conocimiento más amplio que permita asegurar su presencia con certeza.