

Tratamiento quirúrgico para mucocele labial

Pablo Lazo; Magdalena Casas; Faustino Tau

Residencia odontológica social y comunitaria (ROSyC). Facultad de odontología, UNLP.

Categoría: Casos Clínicos

Resumen

La presentación de este caso tiene como objetivo la descripción clínica de una lesión frecuente en niños y el correcto abordaje para su tratamiento.

Son lesiones que se manifiestan en la mucosa oral como consecuencia de una alteración de los conductos de las glándulas salivales menores, siendo el tratamiento indicado su exéresis para evitar que se desarrollen excesivamente por una mayor acumulación de la saliva que generaría esa glándula. Paciente de 11 años se presenta al servicio con una elevación indurada en el labio inferior. Se procede a la intervención quirúrgica con fines de estudio de diagnóstico (biopsia). Se llega a la conclusión que la incisión quirúrgica es el tratamiento indicado para esta lesión, ya que es una intervención simple, sencilla, con la obtención de buenos resultados postoperatorios.




Introducción

Son lesiones que se manifiestan en la mucosa oral como consecuencia de una alteración de los conductos de las glándulas salivales menores, mayormente producidas por extravasación por causas traumáticas tales como mordeduras, aparatología ortodóncica, complicación de una intervención. Pueden presentarse en cualquier área de la boca, con mayor frecuencia en el labio inferior, algo fácilmente detectable por con una simple exploración, siendo el tratamiento de estos quistes su exéresis para evitar que se desarrollen excesivamente por una mayor acumulación de la saliva que generaría esa glándula, que podría tener consecuencias negativas para el paciente.



Descripción del Caso

Paciente de 11 años se presenta al servicio con una elevación indurada en el labio inferior con características compatibles con un mucocele. Se procede a la intervención quirúrgica siguiendo con el protocolo de intervención, anestesia local de la zona, Incisión con bisturí en la base del mucocele, eliminación de la mucosa dañada, extirpación de las glándulas salivales menores afectadas, y posterior sutura. Tras el procedimiento quirúrgico, Se aconseja aplicarse gel de clorhexidina en la zona para evitar la infección de la herida. Los puntos se retiran luego de una semana. La intervención se realiza con fines de estudio de diagnóstico (biopsia).



Conclusiones

Se llega a la conclusión que la incisión quirúrgica es el tratamiento indicado para esta lesión, ya que es una intervención simple, sencilla, con la obtención de buenos resultados postoperatorios.

Referencias

1. Mucocele Labial, Odontología vasca de odonto-estomatología, 2009
2. Mucocele de mucosa labial, Acta pediátrica, 2008