

Promuklost kao netipičan simptom akutne mijeloične leukemije-prikaz slučaja

Matej Rezo, Mirjana Grebenar Čerkez^{1,2}

¹Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, ²Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KBC Osijek

Promuklost ili disfonija čest je simptom s kojim se bolesnici javljaju u ordinacije obiteljske medicine ili u hitnu otorinolaringološku službu. Najčešće se javlja usljed upalnih bolesti grkljana, kod tumora glave i vrata, u sklopu pojedinih neuroloških, pulmoloških ili gastroenteroloških oboljenja, kao i uslijed traume grkljana ili povratnoga živca. Može nastati kao posljedica upotrebe pojedinih lijekova, kao profesionalna bolest ili uslijed atrofičnih promjena glasnice koje nastupaju s dobi. Osim ovih učestalijih uzroka, postoje i druga stanja u kojima se promuklost rijetko javlja kao jedan od početnih simptoma, no diferencijalno dijagnostički ih trebamo uzeti u obzir. Prezentirati ćemo slučaj 77-godišnje bolesnice koja se javila u hitnu otorinolaringološku službu deseti dan bolesti s grloboljom, te disfonijom do potpune afonije, bez febriliteta i smetnji gutanja i disanja. Kliničkim pregledom ororafingoskopski se uočila voluminoznija lijeva tonzila, te slabija pomičnost lijeve polovine grkljana, bez vidljivih tumorskih tvorbi. Učini se hitna kompjuterizirana tomografija vrata i prsnoga koša koja pokaže voluminozniju lijevu tonzilu, uz uredan limfni status vrata, te prisutne sitne nespecifične noduse u donjem režnju lijevoga plućnog krila. Hitna laboratorijska obrada pokazala je izraženu leukocitozu $55,9 \times 10^9/L$, te se učini hitna obrada hematologa i postavi dijagnoza akutne mijeloične leukemije, te se započne s terapijom. Unatoč brzo postavljenoj dijagnozi i početku liječenja, kod bolesnice je unutar četiri mjeseca nastupio letalni ishod. Promuklost se kod leukemija uglavnom javlja kao posljedica terapije ili pojave sekundarnih malignih oboljenja, iznimno rijetko kao jedan od simptoma u ranim fazama bolesti. Ovim prikazom želimo naglasiti važnost pravovremenog otkrivanja uzroka promuklosti, te skrenuti pozornost na ne tako učestale uzroke koji mogu dovesti do poremećaja glasa.

Ključne riječi: promuklost, akutna mijeloična leukemija, pareza glasnice