

アケボノリンドウ(新品種)

著者	米澤 信道
著者別表示	Yonezawa Nobumichi
雑誌名	植物地理・分類研究
巻	33
号	2
ページ	81-81
発行年	1985-12-15
URL	http://doi.org/10.24517/00056210



and a stramineous rachis and stipe (except at the base).

Another form of this fern, which grows in Baguio, and is very close to *T. eugracilis* (COPEL.) REED from Mindanao, the Philippines, has a still

narrower lamina (up to 3 cm wide). But this form doesn't perfectly agree with COPELAND's original description, by which it has a stramineous stipe except at the base.

(Received Mar. 29, 1985)

○ アケボノリンドウ (新品種) (米澤信道) Nobumichi YONEZAWA: A New Form of *Gentiana scabra* BUNGE var. *buergeri* (MIQ.) MAXIM.



昨年(1983年), 滋賀県比良山で, 写真のように花冠が淡紅色(内部に緑色の細点がある)のリンドウを見つけた。リンドウの花は普通青紫色であるが, このものは, 青みを全く欠く。また, リンドウは茎・葉が多少とも紫色を帯びるが, このものは帯びない。

持ち帰り, 自宅で普通のリンドウ(比良山産, 同日付近で採取したもの)とともに1つの鉢で培養したところ, 今秋このものだけは淡紅色の花を咲かせ, 目を楽ませてもらった。

写真では, 花冠・がくは4裂, 雄ずい4と4数性であったが, 今秋咲いたものは5数性であった。このような数性の変化は, 普通のリンドウでも見られる。

Gentiana scabra BUNGE var. *buergeri* (MIQ.) MAXIM. form. *alborosea* YONEZAWA, form. nov.

Flores alborosei.

Nom. Jap. Akebono-rindo (nov.)

Hab. Honshu. Pref. Shiga: Mt. Hira, alt. ca. 720m (N. YONEZAWA; Oct. 10, 1983; Holotype in KANA no. 114974).

(〒606京都市左京区上高野大塚町2-16, Kamitakano-otsukamachi 2-16, Kyoto-shi, Kyoto Prefecture 606)
(Received Nov. 27, 1984)

○ ミドリヒメザゼンソウ (大原準之助) Jyunnosuke ŌHARA: A New Form of *Symplocarpus nipponicus*

1984年8月下旬, 岐阜県高山市の長瀬秀雄氏の案内により, 本品の自生地を知った。高山市下切町の諏訪神社境内の湿ったヒノキ林内で, 林床に100株以上の群落がある。隣接する同環境の地には母種も大群生し, 明らかに住み分けている。本品の佛炎苞は緑色でよく目立つ。

Symplocarpus nipponicus MAKINO forma *viridispathus* ŌHARA, f. nov.

Spatha viridis.

Nom. Jap. Midori-hime-zazenso (nov.)

Hab. Hondo: Shimogiri-cho, Takayama-shi, Prov. Hida (leg. Hideo NAGASE et J. ŌHARA, Aug. 26, 1984—Typus in Herb. AICH)

(Received Apr. 18, 1984)

○ 大原準之助著 身近な薬草 続 風媒社 (〒460名古屋市中区上前津2-9-14, 久野ビル), 昭和59年11月15日発行。B 6版286頁。1,300円

前篇につづき身近な薬草120種の採集法や調整・保存・用法は勿論, 栽培法も記されている。(里見信生)