

## 11997 - Diagnostico radiestésico e uso da homeopatia em área de cultivo de Cupuaçu

### *Diagnose dowsing and use of homeopathy in cropped area under Cupuaçu*

Oliveira, Henrique José de<sup>1</sup>; Carvalho, José Orestes Merola de<sup>2</sup>; Leonidas, Francisco das Chagas<sup>2</sup>; Santos, Diona Alves<sup>3</sup>; Almeida, Gislaine Gera<sup>3</sup>; Machado, Marcos Antonio Ribeiro<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Diocese de Ji Parana-RO, [riqueoliveira2008@hotmail.com](mailto:riqueoliveira2008@hotmail.com); <sup>2</sup>Embrapa Rondônia, [orestes@cpafro.embrapa.br](mailto:orestes@cpafro.embrapa.br); <sup>3</sup>Projeto RECA, [dionaalves16@hotmail.com](mailto:dionaalves16@hotmail.com); <sup>4</sup>Emater Rondônia, [marcos@emater-ro.com.br](mailto:marcos@emater-ro.com.br)

**Resumo:** A radiestesia vem sendo utilizada como método de diagnóstico em várias áreas, sendo recentemente estudada para localizar pontos sensíveis a aplicações homeopáticas em agroecossistemas. O objetivo deste trabalho foi verificar a manifestação dos campos energéticos aos tratamentos indicados pelo método radiestésico. O experimento foi conduzido na propriedade da família do Sr. Arnaldo Breckenbrock, no município de Porto Velho, Rondônia. A área experimental tem tido cultivo de cupuaçu em consórcio com castanha do Brasil e pupunha e esta em declínio nos últimos 5 anos. O uso do diagnóstico radiestésico com respectiva aplicação de homeopatia proporcionou produção de frutos comerciais por planta 1,65kg maior do que na testemunha.

**Palavras -Chave:** *Theobroma grandiflorum*, campos energéticos, Amazônia

**Abstract:** *Dowsing has been used as a method of diagnosis in many areas, and recently studied to find points sensitive to applications of homeopathic preparations in agroecosystems. The objective of this study was to investigate the manifestation of energy fields to the treatments indicated by dowsing method. The experiment was conducted on the family farm of Mr. Arnaldo Breckenbrock in the municipality of Porto Velho, Rondônia. The experimental area has been growing of cupuaçu in a consortium with Brazil nuts and peach palms and it in decline in the last 5 years. The use of dowsing diagnostic with their application of homeopathy provided commercial fruit production per plant 1.65 kg higher than in the control.*

**Key Words:** *Theobroma grandiflorum*, energy fields, Amazon

### Introdução

A radiestesia é aplicada aos trabalhos de Homeopatia na agricultura como instrumento de diagnóstico para localização e identificação da natureza de pontos ou campos energéticos, escolha de homeopatias, dosagens e frequências de uso (ANDRADE & CASALI, 2011).

Para a ciência da Homeopatia, os desequilíbrios iniciam em níveis anteriores: emocional, mental, energético/campo, sendo que o nível físico é o último nível de manifestação dos desequilíbrios/doenças. A homeopatia estimula o sistema de defesa dos organismos de modo que resistam às doenças, aos insetos-praga e aos impactos dos fatores climáticos ou ambientais. A homeopatia promove o equilíbrio sem extinguir: vírus, fungos, bactérias, insetos e outros tipos de agentes (RESENDE, 2003).

Desta forma, o estudo ao nível dos Campos energéticos visa o diagnóstico e a orientação de intervenções para prevenção e cura de desequilíbrios antes ou após sua manifestação

no nível físico como forma de promover a saúde do solo, da água, das plantas, dos animais e do ser humano promovendo o retorno ao equilíbrio natural do meio ambiente.

O objetivo deste trabalho foi verificar a manifestação dos campos energéticos aos tratamentos indicados pelo método radiestésico. .

## Metodologia

O experimento foi conduzido na propriedade do Sr. Arnoldo Breckenbrock, sócio fundador do Projeto RECA (Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado), localizada na linha da Baixa Verde, distrito de Nova Califórnia, município de Porto Velho, Rondônia. A área esteve em cultivo consorciado com cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*. Schum), castanha do Brasil (*Bertholletia excelsa*) e pupunha (*Bactris gasipaes*), por 18 anos. O agricultor tem relatado declínio da produção nos últimos cinco anos, com maior incidência da broca do cupuaçu (*Conotrachelus humeropictus*) e da podridão dos frutos (defeito fisiológico). Inicialmente, realizou-se a teleradiestesia da área (CAMARGO, 2006), que consistiu-se na localização dos pontos energéticos utilizando-se um pêndulo sobre o croqui da área confeccionado em uma folha de cartolina. A identificação dos pontos seguiu metodologia descrita por SAEVARIUS (1994). Na sequência, posicionando-se o pêndulo sobre cada um dos pontos energéticos determinou-se se havia a necessidade de aplicação de homeopatia para cada ponto; quais homeopatias utilizar, a partir de uma lista de homeopatias mais empregadas para o solo e plantas; qual a centesimal hahnemanniana – CH, iniciando-se pela CH6, CH7, CH8, ...; qual a metodologia de aplicação, se regador, pulverizador, gotejador e por quantos dias. Foram realizadas revisões periódicas, no total de cinco no intervalo de 1 ano. A cada revisão, reiniciou-se o processo a partir da pergunta “os pontos energéticos continuam sendo os mesmos identificados anteriormente?” E, na sequência repetindo-se todos os passos, tendo por ponto de partida a pergunta “este ponto aceita homeopatia?”. A cada visita efetuada, de posse das recomendações obtidas a partir da teleradiestesia, a família Breckenbrock e os técnicos do projeto RECA, acessorados pela Sra. Zelinda Sordi (agricultora e homeopata da comunidade), realizaram a preparação e aplicação das homeopatias, de acordo com a metodologia proposta por RESENDE (2003). Para comparação de resultados utilizou-se uma parcela da área como testemunha, à qual não foi aplicada a teleradiestesia e a homeopatia. Em ambas as áreas, na testemunha e na tratada com homeopatia, as plantas foram adubadas com torta de cupuaçu (obtida como subproduto da prensagem a quente das sementes para extração do óleo) e com uma calda biofertilizante tipo “supermagro” aplicadas diretamente ao solo sob as copas; e, nas entrelinhas foram semeadas as leguminosas puerária (*Pueraria phaseoloides*) e feijão de porco (*Canavalia ensiformis*) para cumprirem as funções de cobertura verde, fixadoras de nitrogênio e fonte de biomassa. Para todas as plantas foram realizadas as podas de produção e de controle da vassoura de bruxa. O efeito dos tratamentos foi observado através da produção de frutos obtida na safra 2010-2011.

## Resultados e discussão

Inicialmente, foram localizados 6 pontos energéticos, todos nos limites da área a ser trabalhada, sendo diagnosticados 3 pontos deletérios e 3 pontos neutros (Figura 1). Os três pontos deletérios, denominados de pontos 1, 2 e 6, ficaram localizados todos do mesmo lado do talhão, que corresponde as proximidades do igarapé, enquanto os pontos

neutros, denominados de pontos 3, 4 e 5, se localizaram todos do lado correspondente à estrada.




Figura 1. Croqui de área de cultivo de cupuaçu onde foram determinados os pontos energéticos através da radiestesia. Embrapa Rondônia, 2011.

Na primeira e na segunda revisões, detectou-se que somente nos pontos deletérios, p1, p2 e p6, seria necessário realizar aplicação de homeopatia (Tabela 1). Já na terceira revisão, além dos pontos p1, p2 e p3, também o p4 pediu a aplicação de homeopatia. Na quarta revisão, a radiestesia indicou a aplicação de homeopatia somente para o ponto 6. A primeira, segunda e quarta revisão foram realizadas pelo Sr. Henrique, enquanto que a terceira revisão foi realizada pelo Sr. Marcos. Com a troca do radiestesista para a terceira revisão, os agricultores refizeram o croqui da área, verificando se os pontos energéticos seriam os mesmos identificados pelo Sr. Henrique. E, no novo croqui, sem ter conhecimento dos resultados anteriores, o Sr. Marcos detectou os mesmos pontos energéticos, com as mesmas naturezas. Em setembro de 2011, foi realizada a última revisão radiestésica. Nesta, nenhum ponto pediu a aplicação de homeopatia. Porém, a partir de sugestões do grupo, obteve-se resposta positiva para a necessidade de aplicação de nosódio da broca dos frutos (*Conotrachelus humeropictus*), na CH06, e de Pulsatilla na CH12, que tem conhecida ação em favorecer o florescimento das plantas, em toda a área, através de pulverização e, negativa para a utilização de inoculante natural (mix de microorganismos para o solo).

Na revisão do dia 06/06/2011, logo após o final da safra, o agricultor relatou que houve menor incidência de podridão e quase não ocorreu broca dos frutos. Com os dados de produção consolidados, em setembro de 2011, pode-se observar que, para a parcela onde foram aplicadas as homeopatia, a produção de frutos por planta foi de 13,23 kg de

frutos comerciais enquanto que na parcela testemunha a produção foi de 11,58 kg.

Tabela 1. Recomendações de aplicação de homeopatas obtidas através da radiestesia. Embrapa Rondônia, 2011.

Ponto energético	Natureza do ponto	Data da revisão	Homeopatia recomendada	Volume de Aplicação	Método de aplicação	Intervalos de Aplicação
1	Deletério	24/09/10	<i>Aluminium metallicum</i> CH9	20 mL em garrafão de 5L	Gotejamento	Durante 30 dias
			Plantas espontâneas CH6			
		11/11/10	<i>Silicea</i> CH12	20 mL em garrafão de 5L	Gotejamento	Durante 30 dias
			Solo CH6			
			<i>Phosphorus</i> CH12			
		30/03/11	<i>Natrum muriaticum</i> CH6	2 garrafões	Gotejamento	1 vez
<i>Thuya occidentalis</i> CH9						
08/06/11	-	-	-	-		
2	Deletério	24/09/10	<i>Silicea</i> CH6	20mL em garrafão de 5L	Gotejamento	Durante 30 dias
			Solo CH6			
		11/11/10	Solo CH6	20mL em garrafão de 5L	Gotejamento	Durante 30 dias
			<i>Aluminium metallicum</i> CH9			
		30/03/11	<i>Thuya occidentalis</i> CH9	05 gotas	no ponto	Repetir após 30 dias
			<i>Medorrhinum</i> CH6	2 garrafões (5L)	Gotejamento	1 vez
08/06/11	-	-	-	-		
3	Neutro	24/09/10	-	-	-	-
		11/11/10	-	-	-	-
		30/03/11	-	-	-	-
		08/06/11	-	-	-	-
4	Neutro	24/09/10	-	-	-	-
		11/11/10	-	-	-	-
		30/03/11	<i>Thuya occidentalis</i> CH8	05 gotas	Direto no ponto	2 vezes com 7 dias de intervalo
			<i>Sulphur</i> CH6	05 gotas	Direto no ponto	1 vez
			<i>Natrum muriaticum</i> CH6	10 gotas	Pulverizador de 20L	3 vezes com 14 dias

						de intervalo
			Lachesis trigonocephalus CH6	5 gotas em regador de 10L	Através de regador de 10 litros	Iniciar 4 dias após os demais; Repetir 5 vezes com 9 dias de intervalo
		08/06/11	-	-	-	-
5	Neutro	24/09/10	-	-	-	-
		11/11/10	-	-	-	-
		30/03/11	-	-	-	-
		08/06/11	-	-	-	-
6	Deletério	24/09/10	Natrum muriaticum CH12	20mL em garrafão de 5L	Gotejamento	Durante 30 dias
			Solo CH6			
		11/11/10	-	-	-	-
		30/03/11	Nux vomica CH6	20mL em 1 garrafão de 5L	gotejamento	1 vez
			Carbo vegetalis CH8			
			Kalium iodatum CH6	5 gotas	Direto no solo	5 vezes com intervalo de 7 dias
		08/06/11	Nux Vomica CH6	20ml em 3 garrafões de 5L	gotejamento	1 vez
			Aluminum metallicum CH6			

## Agradecimentos

Ao Sr. Arnaldo Breckenbrock e a sua esposa Sra. Arlete; à Sra. Zelinda Sordi, agente de saúde e homeopata da comunidade de Nova Califórnia e seu esposo Silvino; ao Reginaldo e ao Marcos, técnicos agrícolas e filhos de agricultores do projeto RECA; ao Sr. Eugênio Vacari, agricultor e presidente do RECA; à todos os funcionários do projeto RECA; Ao Francisco da Costa Mendes, técnico agrícola da Diocese de Ji Paraná.

## Bibliografia Citada

ANDRADE, F.M.C.; CASALI, V.W.D. Homeopatia, agroecologia e sustentabilidade. Rev. Bras. de Agroecologia, v.6, n.1, p.49-56, 2011.  
 CAMARGO, M.L. Difusão Auto-Ecologia. [http://www.difusaoautoecologia.com/auto\\_ecologia/radiestesias.htm](http://www.difusaoautoecologia.com/auto_ecologia/radiestesias.htm). 2006. (acesso em 17 de outubro de 2011).

RESENDE, J.M. (Coord.). Cartilha de homeopatia: instruções práticas geradas por agricultores sobre o uso da homeopatia no meio rural. 1. ed. Viçosa: UFV/DFT/CCA, 2003.

SAEVARIUS, E. Manual teórico e prático de radiestesia. São Paulo: Pensamento, 1994, 264p.