

OUTROS

779

Mal-do-panamá em Rondônia: levantamento da ocorrência e distribuição da doença.

(Mal-do-Panamá disease in Rondônia: Evaluation of occurrence and disease distribution.)

Alves, R.C.^{1,*}; Fernandes, C.F.²; Vieira Junior, J.R.²; Silva, L.F.C.¹; Almeida, U.O.³; Bezerra, J.V.B.³

¹Graduando Farmácia, Faculdades FIMCA; ²Pesquisador, Embrapa Rondônia; ³Graduando Agronomia, UNIRON-RO; *Bolsista PIBIC-CNPq/Embrapa. E-mail: cleberson@cpafro.embrapa.br.

O mal-do-Panamá é uma doença endêmica por todas as regiões produtoras de banana do mundo. No Brasil, o problema é ainda mais grave em função das variedades cultivadas, que na maioria dos casos são suscetíveis. O mal-do-Panamá é causado por *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* (E.F. Smith) Sn e Hansen. Em Rondônia, a bananeira é a fruteira de maior importância agrícola. Entretanto, esta cultura enfrenta o ataque de doenças, como o mal-do-panamá. Esta doença foi detectada em diversos municípios do estado. Com o objetivo de mapear a distribuição da doença no estado, uma parceria firmada entre a Embrapa Rondônia e a Agência Idaron permitiu um levantamento da ocorrência da doença no período de 2004 a 2012. As amostras coletadas foram remetidas ao Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Rondônia. Foram coletadas até o presente momento 589 amostras de pseudocaule e a doença foi detectada em 31 municípios do estado. Os resultados demonstram a importância da doença para a bananicultura rondoniense e a necessidade de continuação do levantamento nos demais municípios do estado.

Apoio: CNPq.