

2.1.1.25.  
RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE O  
COMPORTAMENTO DE CULTIVARES E HÍBRIDOS  
DE MILHO NORMAL EM SOLOS DE CERRADO  
NA REGIÃO DE BRASÍLIA

Luiz Alberto Rocha Batista\*  
Fernando Faria Duque\*  
Jairo Silva\*\*

Os resultados obtidos em condições de campo durante o ano agrícola 1975/76, sobre o comportamento de 30 cultivares e híbridos de milho normal em três locais sob condições de cerrado da Região de Brasília, mostraram que apesar da produção média de grãos ter variado significativamente em dois locais, os tratamentos que obtiveram melhores comportamentos foram: C-111 e C-111 X.

A produção média dos melhores tratamentos em cada local foi de 4.200; 4.300 e 7.700 kg. de grãos/ha para CPA Cerrado-DF; Cristalina-GO e Água Limpa-DF, respectivamente. Destacou-se também o tratamento C-111 quanto a prolificidade, chegando a atingir um índice de 1.6 para um dos locais.

PROCI-1976.00021  
BAT  
1976  
SP-1976.00021

In: Anais da XI Reunião Brasileira de milho e sorgo, Piracicaba, ESALQ, 26 a 30 de julho de 1976. Anais

\* Engenheiros Agrônomos do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, EMBRAPA.

\*\* Engenheiro Agrônomo do Departamento Técnico Científico da EMBRAPA.