

---

**SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTOS CONSERVADORES PARA CARIES PROFUNDA EN  
PRIMEROS MOLARES PERMANENTES DE NIÑOS ATENDIDOS ENTRE LOS AÑOS  
2008-2010**

**GABRIELA VACCARO TEJADA  
CIRUJANO DENTISTA**

**RESUMEN**

Eliminación completa de caries, recubrimiento indirecto y remoción paso a paso, son las terapias indicadas para el manejo de caries profunda cuando el diagnóstico pulpar corresponde a una pulpa vital o con sintomatología compatible a una pulpitis reversible.

El propósito de este estudio es hacer un seguimiento para evaluar el éxito de las terapias conservadoras para el manejo de caries profunda en primeros molares permanentes de niños atendidos entre los años 2008-2010.

Este estudio de tipo retrospectivo de cohorte longitudinal se realizó en una muestra de 28 molares permanente (23 niños), de los cuales 7 molares fueron tratados con eliminación completa, 12 molares con recubrimiento indirecto y 9 molares con eliminación paso a paso. Estos fueron evaluados clínica y radiográficamente.

**Resultados**

El éxito total respecto a los 28 molares corresponde a un 75%. En el seguimiento entre 12 a 23 meses las tres terapias propuestas presentaron un 100% de éxito, entre 24 a 35 meses la terapia de recubrimiento indirecto tuvo un éxito del 100%(4), y entre 36 a 48 meses la terapia de eliminación completa tuvo un éxito del 100%(1).

**Conclusión**

A medida que transcurre el tiempo las 3 terapias conservadoras presentan una disminución del porcentaje de éxito.

El principal criterio identificado que induce al fracaso del tratamiento es el dolor.