

Abordagem da obstrução das vias aéreas superiores por pletismografia corporal total

Abordagem da obstrução das vias aéreas superiores por pletismografia corporal total

- Determinação da resistência das vias aéreas (R_{aw})
- Factores que afectam a R_{aw}
- R_{aw} e obstrução das vias aéreas superiores (OVAS)

Resistência das vias aéreas

$$R_{aw} = \frac{\Delta P}{\dot{V}}$$

R_{aw} – medida da resistência ao débito aéreo oferecida pelas estruturas anatómicas entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares.

Factores que afectam a resistênciã ao d bito a reo



- Calibre das vias a reas
 - R ao fluxo laminar = $1/\text{raio}^4$
- Tipo de fluxo
 - R ao fluxo turbulento   superior   R ao laminar
- Gera  o das vias a reas
 - maior R ao n vel da 4^a gera  o br nquica

Factores que afectam a resist ncia ao d bito a reo (2)

- Volume pulmonar
 - **R_{tot} diminui com o aumento do volume pulmonar**

R_{tot} composta por:


- R perif rica (gen. 7 - gen. 23): baixa resist ncia
- R central (nariz - gen. 6): alta resist ncia
- R central >>> R perif rica



Raw nas VAS

- $\pm 1 \text{ cmH}_2\text{O} / \text{L} / \text{seg}$
- doentes com OVAS sintomáticos – 4 a 15 $\text{cmH}_2\text{O} / \text{L} / \text{seg}$ (volume corrente)
- resistência das vias aéreas superiores não é constante e aumenta em débitos mais elevados – dispneia de esforço nos doentes com OVAS

Pletismografia corporal total e OVAS



<http://spirometer.ch/spirometer-history.html>

Fundamentação

- débito aéreo é laminar na respiração de repouso

gradiente de pressão proporcional ao débito

- passa a turbulento, se o débito aumenta, ao nível das vias aéreas de maior calibre

necessário um gradiente de pressão adicional proporcional ao quadrado do débito

Fundamentação (2)


- segundo a lei de Poiseuille a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio

pequena diminuição do calibre




grande aumento na resistência

Resistência das vias aéreas




<http://www.encolombia.com/medicina/neumologia/neumo13101-medicion1.htm>


A.R. 47A



26-11-92 orifício de 5mm (fez broncofibroscopia nesse dia)




após dilatação



14-01 1997	18-02 1997	04-03 1997
---------------	---------------	---------------

→ após dilatação





18-02
1997

04-03
1997


08-04
1997

12-05
1997



02-09
1997

21-10
1997



TESTE	%REFER	TESTE	%REFER	TESTE	%REFER	TESTE	%R
1		2		3		4	
09-12 1997		20-01 1998		22-04 1998		08-07 1998	

Conclusão

- Pletismografia corporal total poderá detectar OVAS
- É necessário mais investigação...