

Images in medicine

Diastasis des grands droits avec nécrose cutanée sur une grossesse à terme

Mohamed Amine Ben Haj Hassine^{1,*}, Haythem Siala¹

¹A¹Service de Gynécologie , Hôpital Militaire de Tunis, MontFleury 1008 Tunis, Tunisie

^{*}Corresponding author: Mohamed Amine Ben Haj Hassine, Service de Gynécologie , Hôpital Militaire de Tunis, Mont FLeury 1008 Tunis, Tunisie

Key words: Diastasis, grossesse, nécrose cutanée

Received: 30/09/2015 - Accepted: 12/10/2015 - Published: 02/11/2015

Pan African Medical Journal. 2015; 22:207 doi:10.11604/pamj.2015.22.207.8076

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/22/207/full/>

© Mohamed Amine Ben Haj Hassine et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Image en médecine

Les grossesses, à fortiori les grossesses multiples, engendrent des séquelles fonctionnelles et esthétiques majeures de la paroi abdominale. L'augmentation importante de la hauteur utérine a pour conséquence une distension musculaire et cutanée de l'étage sous ombilical et sus ombilical entraînant un défaut musculo-aponévrotique. Nous rapportons une observation exceptionnelle de nécrose cutanée avec diastasis des grands droits chez une femme âgée de 37 ans présentant un utérus bicatriciel. L'évacuation utérine a été faite par césarienne à terme avec excision de la zone cutanée infectée et confection d'une plaque de Vicryl sous aponévrotique après avoir rapproché les deux muscles grands droits. La technique chirurgicale comprend: la résection cutanée et la plastie des muscles abdominaux. La résection cutanée consiste en une excision chirurgicale de tous les tissus nécrosés jusqu'aux fascias superficiels et profonds. La plastie musculaire est réalisée

par des points inversés de rapprochement des muscles droits sur la ligne médiane. Les suites opératoires ont été simples. La grossesse peut être responsable dans de rares cas de séquelles pariétales. Toutefois, la durabilité du traitement chirurgicale reste à prouver, une récurrence étant toujours possible.



Figure 1: diastasis des grands droits et nécrose cutanée