



Stereopsis in patients with ambliopia in absence of strabismus

Estereopsis en pacientes con ambliopía en ausencia de estrabismo

Adriana Restrepo S, MD¹; Tatiana Palacio G, MD¹; Adriana Solano, MD²

- 1 Residente de Oftalmología Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – Hospital de San José de Bogotá
- 2 Oftalmóloga. Supra especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo.
Profesor asociado, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - Hospital de San José de Bogotá – ORCID: 0000-001-6028-041X

Institución: Servicio de Oftalmología – Hospital de San José de Bogotá.

Autor de correspondencia: Adriana Solano F. MD; Email: adrisolano@yahoo.com, Dirección: Bogotá, Calle 10 # 18-75., Teléfono: (571) 3538000 extensión 141-167.

Conflictos de interés: No se tiene ningún conflicto de interés.

Financiación del proyecto: No se recibió ningún tipo de financiación.

Cómo citar este artículo: Restrepo A, Palacio T, Solano A. Estereopsis en pacientes con ambliopía en ausencia de estrabismo. Revista Sociedad Colombiana de Oftalmología. 2019; 52(2):101-109

INFORMACIÓN ARTÍCULO

Recibido: 06/05/2019
Aceptado: 28/09/2019

Palabras clave:
Estereopsis; ambliopía; niños.

RESUMEN

Introducción: Los pacientes con estrabismo comúnmente tiene algún grado de compromiso en la estereopsis, y existe evidencia clara que el tratamiento de la ambliopía severa mejora este compromiso; sin embargo, no hay datos que reporten grados de estereopsis en pacientes con ambliopía en ausencia de estrabismo.

Objetivo: Determinar y comparar el grado de estereopsis en pacientes sin ambliopía, con ambliopía leve y moderada en ausencia de estrabismo, que asistieron a consulta de oftalmología pediátrica en el Hospital de San José entre Enero de 2015 y Agosto de 2017.

Diseño del estudio: Estudio de tipo transversal.