

Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC)

ABORDAGEM CIRÚRGICA EM PACIENTE INFANTIL COM ANQUILOGLOSSIA: RELATO DE CASO CLÍNICO

Felipe Evangelista Verissimo; Antonio Ylderlandio Batista dos Santos; Diego Felipe Silveira Esses; Karla Shangela da Silva Alves

O freio lingual é uma região anatômica que por vezes, pode apresentar alterações no seu tamanho, dificultando a fala e alguns movimentos da língua. A anquiloglossia, que popularmente é conhecida como língua presa é caracterizada pelo freio lingual curto, logo, a frenectomia lingual é a intervenção cirúrgica para correção desse freio com crescimento anormal onde a prevalência de alteração do frênulo lingual em crianças é de 18%. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de anquiloglossia tratado por frenectomia lingual em um paciente infantil atendido na Clínica Odontológica da FCRS. O paciente, sexo feminino, 1 ano e 3 meses compareceu acompanhada da mãe que após uma consulta ao médico, relatou que a criança precisava fazer uma cirurgia na língua. O bebê tinha dificuldade na amamentação e de colocar a língua para fora da boca. Após anamnese e exame clínico, constatou-se que ela apresentava anquiloglossia sendo planejado a frenectomia lingual. Foi realizado o condicionamento do comportamento infantil, porém sem sucesso, havendo muita resistência e choro no momento da cirurgia. Após anestesia local com lidocaína 2% na base da língua e no freio lingual que iria ser incisado, este foi pinçado com um porta-agulha realizando-se a incisão com o bisturi desde a inserção no assoalho bucal até a base da língua, seguido pela divulsão dos tecidos e sutura com fio reabsorvível. Após um controle pós-operatório de 15 dias, a cicatrização estava satisfatória, sendo indicada a fonoaudiologia. A dificuldade da amamentação é um dos problemas gerados pelo frênulo lingual curto, indicando o tratamento cirúrgico assim que diagnosticado. As técnicas cirúrgicas devem apresentar os mesmos princípios básicos, havendo na literatura diversos tipos de técnicas como a laser, incisão com uma ou duas pinças. Portanto, a frenectomia é uma técnica eficaz na remoção de freios anormais, apresentando um bom prognóstico desde que seja diagnosticado e tratado o mais precoce possível. A participação do odontopediatra se torna importante para o controle do comportamento do paciente no atendimento, que nessas situações cirúrgicas, há normalmente a falta da capacidade para colaborar, por conta de ser uma criança muito nova que não possui ainda comunicação e nem compreensão.

Palavras-chave: Frenectomia lingual. Anquiloglossia. Freio lingual.