

## **SÍFILIS CONGÊNITA COMO INDICADOR DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA 8ª REGIÃO DE SAÚDE DO CEARÁ**

Rafhael Fonseca<sup>1</sup>, Karleandro Pereira do Nascimento<sup>1</sup>, Ana Karollaine da Silva<sup>1</sup>,  
Kamila Elen Alves Nogueira<sup>2</sup>, Igor Cordeiro Mendes<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Discente de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem (GEPsAE) e do Grupo de Pesquisa Enfermagem na Promoção da Saúde do Homem (GPEPSH). Bolsista do Programa de Iniciação Científica da UNICATÓLICA. E-mail: karleandro.pereira@aluno.uece.br, rafhaelfonseca@hotmail.com, karollaine\_ana@yahoo.com.br.

<sup>2</sup> Discente de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem (GEPsAE) e do Grupo de Pesquisa Enfermagem na Promoção da Saúde do Homem (GPEPSH). E-mail: kamilaelennog@hotmail.com

<sup>4</sup> Enfermeiro. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Docente do Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA). Coordenador do Grupo de Pesquisa Enfermagem na Promoção da Saúde do Homem (GPEPSH). E-mail: igorcordeiro@unicatolicaquixada.edu.br

### **RESUMO**

**Introdução:** Doenças infecciosas durante a gravidez são frequentes, entre essas, destaca-se a sífilis, que persiste como um grave problema de saúde no Brasil, sendo factível a transmissão materno-fetal, quando isto acontece chamamos de Sífilis Congênita (SC). Como elementos fundamentais no enfrentamento da transmissão vertical da sífilis, o Ministério da Saúde Brasileiro recomenda a realização dos testes de sífilis durante o pré-natal e o tratamento imediato dos casos encontrados. Desde 1995, o Brasil, juntamente com outros países da América Latina assumiu o compromisso para elaboração do plano para eliminação da SC até o ano de 2000, sendo aceitável o registro de até um caso de SC por 1.000 nascidos vivos/ano. A SC é uma doença de Notificação Compulsória desde o ano de 1986 tendo sido incluída no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Assim sendo, apresenta-se como um bom indicador da qualidade da assistência pré-natal. **Objetivo:** Analisar epidemiologicamente os casos de SC na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde do estado do Ceará (CRES) nos anos de 2008 a 2013 e realizar uma crítica dos apanhados. **Método:** Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, documental, transversal com abordagem quantitativa. Foi realizada uma verificação direta nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, presentes no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sobre os casos de sífilis gestacional e sífilis congênita que aconteceram no período de 2008 a 2013 na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde do Ceará. A 8ª CRES é constituída pelo agrupamento de 10 municípios e tem o objetivo de organizar, planejar e executar ações e serviços de saúde em toda a região. Foram buscados também dados relacionados à assistência pré-natal das gestantes diagnosticadas com sífilis. **Resultados:** O estudo revelou que no período e região supracitados houve a confirmação de 145 casos de sífilis gestacional e que estes resultaram em 28 casos de sífilis congênita, com relação às consultas pré-natal das mães com bebês diagnosticados com SC o estudo mostrou que 26 (92,85%) mães realizaram adequadamente as consultas pré-natais. O município de

Quixeramobim apresentou uma taxa de 8,41 casos de SC para 1.000 nascidos vivos no ano de 2012, um número bastante superior à meta esperada pelo plano de eliminação da SC que era de um caso para 1.000 nascidos vivos/ano. Houve também situações onde a sífilis materna só foi descoberta no momento do parto ou no pós-parto sendo 6 casos (21,42%) e 2 casos (7,14%) respectivamente. **Conclusão:** A sífilis é uma doença totalmente passível de prevenção, diagnóstico e tratamento durante a gestação. A assistência pré-natal de qualidade permite a identificação precoce dos casos de sífilis gestacional e seu tratamento para se evitar os casos de sífilis congênita. No entanto, os indicadores aqui apresentados podem estar refletindo a baixa qualidade dessa assistência na região ou a pouca importância que os profissionais de saúde têm dado as notificações, diagnóstico e ao tratamento da sífilis gestacional e congênita.

**Descritores:** Sífilis Congênita. Cuidado Pré-Natal. Epidemiologia descritiva.

## REFERÊNCIAS

LEITÃO, E. J. L. et al. Sífilis gestacional como indicador da qualidade do pré-natal no Centro de Saúde n. ° 2 Samambaia-DF. **Comun. Ciênc. Saúde**, v. 20, n. 4, p. 307-14, 2009.

MINISTÉRIO DA SAÚDE PROGRAMA NACIONAL DE DST/AIDS. Diretrizes para o controle da sífilis congênita. 2005.

SARACENI, V. et al. Vigilância da sífilis na gravidez. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 16, n. 2, p. 103-11, 2007.