

Sylejman Rexhepi¹
Afrim A. Gashi¹
Idriz Berisha¹
Vjollca Sahatçiu-Meka²
Mjellma Rexhepi¹
Blerta Rexhepi¹
Ali Lahu¹
Avni Kryeziu¹
Jehona Ismaili¹
Arta Baftiu¹
Arian Brovina¹
Ismet Bajraktari¹
Bastri Durmishi¹

¹Klinika za reumatologiju
Univerzitetski i klinički centar Kosova
Priština, Kosovo

²Klinika za fizikalnu medicinu
Univerzitetski i klinički centar Kosova
Priština, Kosovo

Učinkovitost i sigurnost liječenja tocilizumabom u reumatoidnom artritisu

Efficacy and safety of tocilizumab treatment in rheumatoid arthritis

Tocilizumab (TCZ) je učinkovit u liječenju reumatoidnog artritisa (RA). Naš je cilj bio procijeniti učinkovitost i sigurnost TCZ-a u malom broju bolesnika s refrakternim RA.

Pet bolesnica s RA tretirano je jednom biološkom supstancijom u 12-mjesečnoj studiji u Reumatološkoj klinici u Prištini. Analizirali smo parametre kao dob, spol, trajanje bolesti, indeks tjelesne mase (BMI), prethodnu terapiju, kliničke manifestacije – DAS28 i laboratorijske analize. Bolesnice su procjenjivane na početku, nakon tri i šest mjeseci.

Srednja je vrijednost trajanja bolesti 18,75 godina. četiri bolesnice bile su FR-pozitivne, jedna je bila FR-negativna. Četiri bolesnice prethodno su bile liječene najmanje jednim DMARD-om, dok je jedna prethodno liječena s dvije različite vrste biološke supstancije. Zapaženo je progresivno smanjenje svih kliničkih manifestacija. Analizirajući RF, CRP, DAS28, ustanovili smo bolji klinički odgovor u trećem i šestom mjesecu ($p < 0,05$).

Tretman TCZ-om u bolesnica s refrakternim RA učinkovit je i siguran.

Ključne riječi: reumatoidni artritis; tocilizumab