

Intratireoidna lokalizacija tireoglosalne ciste

Tamara Tačigin, Boris Grdinić

Odjel za otorinolaringologiju Opća bolnica Pula, Pula

Tireoglosalna cista jedna je od najčešćih benignih razvojnih tvorbi područja medijalne linije vrata. Tireoglosalne ciste nastaju zbog nepotpunog srašćavanja tireoglosalnog duktusa koji se proteže od foramena cekuma, područja korijena jezika do mjesta štitnjače u medijalnoj regiji vrata. U šestom tjednu fetalnog života tireoglosalni duktus nestaje, ali ukoliko zaostanu pojedinačne stanice ili nakupine embrionalnih stanica, iz njih se kasnije mogu razviti tireoglosalne ciste. Najčešće se javljaju u dječjoj dobi. Tireoglosalne ciste mogu biti različitog smještaja, a prema literaturi se opisuje lokalizacija ovisno o jezičnoj kosti – suprahiodno (20%), infrahiodno (65%), transhiodno (15%).

U ovom prikazu slučaja želimo prikazati rijedak smještaj tireoglosalne ciste, također u dobi za koju razvojna anomalija nije učestala. U našem slučaju riječ je o bolesnici u dobi od 60 godina s intratireoidnom lokalizacijom tireoglosalne ciste. Intratireoidno smještena tireoglosalna cista u odrasloj dobi je rijetka pojava, a u literaturi je prikazano samo nekoliko slučajeva.

Ključne riječi: tireoglosalna cista, štitnjača