

**Науковий вісник Львівського національного університету  
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.**  
**Серія: Харчові технології**

**Scientific Messenger of Lviv National University  
of Veterinary Medicine and Biotechnologies.  
Series: Food Technologies**

ISSN 2519-268X print  
ISSN 2707-5885 online

doi: 10.32718/nvlvet-f9603  
<https://nvlvet.com.ua/index.php/food>

UDC 664.3:665.325.2

## **Organoleptic characteristics and nutritional value of roasted peanuts from the chain of hotel and restaurant complexes in Kiev region**

L. Korol-Bezpala, S. Merzlov, V. Marshalok, H. Merzlova, Y. Shurckova, H. Kalinina, O. Hrebelnyk

Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

*Article info*

Received 05.04.2021

Received in revised form

10.05.2021

Accepted 11.05.2021

**Korol-Bezpala, L., Merzlov, S., Marshalok, V., Merzlova, H., Shurckova, Y., Kalinina, H., & Hrebelnyk, O. (2021). Organoleptic characteristics and nutritional value of roasted peanuts from the chain of hotel and restaurant complexes in Kiev region. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 23(96), 15–18.**  
doi: 10.32718/nvlvet-f9603

Bila Tserkva National Agrarian University, Pl. Soborna 8/1, Bila Tserkva, 09117, Ukraine.  
Tel. : +38-098-551-42-50  
E-mail: lesy25@ukr.net

Foods must contain all the nutrients necessary to maintain human health, development and life. These components include protein, fats, carbohydrates, vitamins, minerals and other biologically active substances, which must be in sufficient quantity and ensure the proper functioning of the body. One such food that contains significant amounts of nutrients is peanuts. Peanuts are a source of protein, carbohydrates, fats, fiber, trace elements and vitamins. The nutrients of the product are easily absorbed. The article presents the results of a study of the nutritional value of roasted salted peanuts of various manufacturers, which are used for consumption in hotel and restaurant complexes in the Kiev region. The studies were carried out in the laboratory of the State Research Control Institute of Veterinary Drugs and Feed Additives (Lviv). Nutritional value was determined according to different methods, which are intended for each indicator, and also used statistical methods. According to the research results, it was revealed that the content of moisture, protein, fat and fiber in peanuts Big Bo, Felix Peanuts and Cossack Slava ranges, respectively, in the range from 0.73 to 1.37 %, from 26.3 to 26.9, from 46.01 to 48.6 g/100 g of product and 3.56 to 3.92 %. According to organoleptic parameters, prototypes of peanuts from different manufacturers meet the standard requirements. Promising research is the study of trace elements in roasted salted peanuts from various manufacturers.

**Key words:** food products, moisture, protein, fat, ash, fiber, carbohydrates, energy value.

## **Органолептичні показники та харчова цінність арахісу смаженого із мережі готельно-ресторанних комплексів Київщини**

Л. П. Король-Безпала, С. В. Мерзлов, В. А. Маршалок, Г. В. Мерзлова, Ю. О. Шурчкова, Г. П. Калініна, О. П. Гребельник

Білоцерківський національний аграрний університет, м Біла Церква, Україна

Харчові продукти мають містити усі поживні речовини, необхідні для підтримання здоров'я, розвитку та життєдіяльності людини. До таких компонентів належать протеїн, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини та інші біологічно активні речовини, які повинні бути в достатній кількості та забезпечувати належне функціонування організму. Одним із таких харчових продуктів, який містить значну кількість поживних речовин є арахіс. Арахіс є джерелом білка, вуглеводів, жирів, клітковини, мікроелементів та вітамінів. Поживні речовини продукту легко засвоюються. У статті представлена результатами дослідження поживної цінності арахісу смаженого солоного різних виробників, які використовують для вживання в готельно-ресторанних комплексах Київщини. Дослідження проводили в умовах лабораторії Державного науково-дослідного контролюючого інституту ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів). Поживну цінність визначали за різними методиками, які призначенні для кожного показника, а також використовували статистичні методики. За результатами досліджень виявлено, що вміст води, білка, жиру та клітковини у арахісах Big Bo, Felix Peanuts та Козацька Слава коливається, відповідно, в межах від 0,73 до 1,37 %, від 26,3 до 26,9, від 46,01 до 48,6 г/100 г продукту та від 3,56 до 3,92 %. За органолептичними показниками дослідні зразки арахісу

різних виробників відповідають стандартним вимогам. Перспективними дослідженнями є вивчення мікроелементів в арахісі жа-реному солоному різних виробників.

**Ключові слова:** харчові продукти, волога, білок, жир, зола, клітковина, вуглеводи, енергетична цінність.

## Вступ

Збалансоване харчування є однією з найактуальніших проблем людства нашого тисячоліття. Сьогодні у більшості населення планети виявляється незбалансованість раціонів за білками, вітамінами, мінеральними речовинами, поліненасиченими жирними кислотами та іншими нутрієнтами (Hachak et al., 2020; 2021).

Одними із харчових продуктів, які насичені різними поживними речовинами, необхідними для організму, є горіхоплідні. Їхні поживні можливості ще не повною мірою розкриті. Вони застосовуються як в харчуванні так і в промисловому виробництві (Zubar, 2010; Dubinina et al., 2017).

Представником горіхоплідних є арахіс, який дуже цінний в першу чергу завдяки вмісту жирів у яких велика кількість ненасичених кислот. Тому, цей горіх є важливим продуктом у боротьбі з багатьма захворюваннями: серцево-судинних, інсульті, неврозі, депресії, фізичне виснаження, також корисний за діабету оскільки контролює цукор у крові (Settaluri et al., 2012).

За поживною цінністю арахіс підходить як вегетаріанцям так і любителям м'ясної продукції, забезпечуючи при цьому організм великою кількістю вітамінів, мінералів та амінокислот (Zolotukhina, 2017).

Araxic (Arachis) – дуже пошиrena однорічна невисока трав'яниста культура родини бобових, вона відрізняється від інших представників сімейства бобових за своєю біологічною особливістю. Арахіс, або земляний горіх, відрізняється однією особливістю. Після його запилення відбувається перетворення в гінофор (плодоносний пагін), який на перших стадіях розвит-

ку росте вгору, а потім міняє напрямок росту вниз, в ґрунт, де пізніше розвивається і формується плід (Simakhina & Ukrainets, 2010; Dubinina et al., 2017; Romanova et al., 2021).

Арахіс має високу поживну цінність, яка безпосередньо пов'язана з високим рівнем білків (25,8 %), жирів (46 %), вуглеводів (10,1 %), містить велику кількість вітамінів різних груп та мінеральних речовин, які легко засвоюються в організмі, та задовільняють фізіологічні потреби людини в поживних речовинах та енергетичній цінності (Satina et al., 2011; Dubinina et al., 2017).

Арахіс використовують у свіжому, смаженому, солоному та вкритому солодкою глазур'ю вигляді. Горіхи застосовують за виробництва олії, в кондитерських виробах, косметології, промисловому виробництві, медичні для приготування різних емульсій (Alper & Mattes, 2003; Vlasenko et al., 2020).

Мета дослідження – встановлення фактичної поживної цінності арахісу смаженого солоного, різних виробників, які використовують для споживання в готельно-ресторанах комплексах Київщини.

## Матеріал і методи досліджень

Дослідні зразки арахісу були придбані у готельно-ресторанах комплексах розташованих на трасі Київ–Одеса та в м. Біла Церква. Дослідження проводили в умовах лабораторії Державного науково-дослідного контролюального інституту ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів).

Для дослідження брали арахіс сорту Спеніш смажений солоний різних виробників (рис. 1).



Рис. 1. Дослідні зразки

Вміст вологи та золи визначали гравіметричним методом. Білок методом Кельдаля, визначення жиру проводили в апараті Сокслета. Вміст клітковини методом проміжного фільтрування. Енергетичну цінність і вміст вуглеводів в 100 гр. продукту визначали за допомогою розрахунків (RI 2017; RI 2019).

Органолептичні показники: зовнішній вигляд, смак та запах, твердість визначали за ДСТУ 4504:2005 методом контролювання (DSTU 4504:2005, 2006).

## Результати та їх обговорення

Дослідження були направлені на встановлення поживної цінності арахісу. Результати досліджень подані в (табл. 1).

Експериментально встановлено, що арахіс смажений має дуже високу харчову цінність. Найбільший

вміст вологи виявлений у зразках арахісу Felix Peanuts, який становить 1,37 % від сухої речовини. Також виявлено, що у зразках арахісу Козацька Слава вміст вологи становив 1,20 %, що на 0,17 % менше ніж у арахісу Felix Peanuts. Встановлено, що вміст вологи арахісу Big Bov на 0,64 % ( $P \leq 0,05$ ) менший ніж у Felix Peanuts.

**Таблиця 1**

Поживна цінність арахісу смаженого солоного в 100 г продукту,  $M \pm m$ ,  $n = 3$

Показники	Araxic Big Bov	Araxic Felix Peanuts	Araxic Козацька Слава
Волога, %	$0,73 \pm 0,008^*$	$1,37 \pm 0,104$	$1,20 \pm 0,091$
Білок, г	$26,40 \pm 0,557$	$26,90 \pm 0,633$	$26,30 \pm 0,733$
Жир, г	$46,30 \pm 2,037$	$46,01 \pm 1,067$	$48,60 \pm 2,057$
Зола, %	$2,67 \pm 0,105$	$2,44 \pm 0,296$	$2,83 \pm 0,107$
Клітковина, %	$3,92 \pm 0,333$	$3,56 \pm 0,232$	$3,71 \pm 0,257$
Вуглеводи, г	$23,89 \pm 2,152$	$23,28 \pm 0,008$	$21,07 \pm 0,006$
Енергетична цінність, ккал	$617,86 \pm 4,121$	$614,72 \pm 8,240$	$626,88 \pm 9,314$

Примітка: \* $P \leq 0,05$  – по відношенню до “Araxic Felix Peanuts” та “Арахіс Козацька Слава”

Уміст білка був найбільший у зразках горіхів фірми Felix Peanuts – 26,90 г, що на 0,5 % більше показника в арахіси Big Bov. Відносно вмісту білка у продукті Козацька Слава то цей показник був нижчим ніж у Felix Peanuts на 0,6 %.

Дослідження показали, що в арахісі знаходиться великий вміст жиру. Найбільша кількість жиру була у горішках Козацька Слава, цей показник становив 48,60 г. Горішки Big Bov на 4,7 % мали нижчий вміст жиру у порівнянні із арахісом Козацька Слава. Analogічно на 5,3 % виявлено нижчий вміст жиру у продукті Felix Peanuts.

Найвищий вміст золи було виявлено у горішках Козацька Слава порівнюючи із продукцією Big Bov та Felix Peanuts показник був більшим, відповідно, на 0,16 % та 0,39 %. Розбіжність у показниках золи може пояснюватись вмістом NaCl у продукті та регіоном вирощування горіхів.


Вміст клітковини на 100 г продукту був найбільший в зразках арахісу Big Bov, і становив 3,92 %.

Показник переважав дані отримані у зразках виробників Felix Peanuts і Козацька Слава, відповідно, 0,36 % та 0,21 %.

Вміст вуглеводів у горішках змінювався в залежності від виробника. Найнижчий вміст вуглеводів був у продукті Козацька Слава і становив 21,07 г на 100 г. Порівнюючи із арахісом Big Bov та Felix Peanuts різниця за вмістом вуглеводів становила, відповідно, 11,8 % та 9,5 %.

Експериментально встановлено, що найбільша енергетична цінність була у арахісі смаженому солоному Козацька Слава 626,88 ккал у 100 г продукту. Показник переважав арахіс зразків фірми Big Bov та Felix Peanuts на 1,4 % і 1,9 %. Підвищений рівень енергії пояснюється високим вмістом жиру у горішках Козацька Слава.

За органолептичними показниками всі зразки відповідали вимогам ДСТУ 4504:2005 “Ядра бобів арахісу” (рис. 2).



**Рис. 2.** Показники якості арахісу, бал

За середньою бальною оцінкою арахіс смажено солоний Big Bob має 4,96 бали, арахіс Felix Peanuts – 4,97 бали та продукт Козацька Слава – 4,99 бали.

## Висновки

1. Встановлено, що вміст вологи, білка, жиру та клітковини у горіхах арахісу різних виробників коливається, відповідно, в межах від 0,73 до 1,37 %, від 26,3 до 26,9, від 46,01 до 48,6 г/100 г продукту та від 3,56 до 3,92 %.

2. За органолептичними показниками дослідні зразки арахісу різних виробників відповідають стандартним вимогам.

Перспективи подальших досліджень. Перспективними дослідженнями є вивчення мікроелементів в арахісі жареному солоному різних виробників.

## References

- Alper, C., & Mattes, R. (2003). Peanut consumption improves indices of cardiovascular disease risk in healthy adults. *J. Am. Coll. Nutri.*, 22(2), 133–141. doi: 10.1080/07315724.2003.10719286.
- DSTU 4504:2005 (2006). Yadra bobiv arakhisu. Zahalni tekhnichni umovy. K.: Derzhspozhyv standart Ukraine (in Ukrainian).
- Dubinina, A. A., Lenert, S. O., Khomenko, O. O., & Cherevychna, N. I. (2017). Doslidzhennia khimichnogo skladu ta otsinka yakosti sortiv arakhisu, adaptovanykh do vyroshchuvannia v Ukraine: monohrafiia. Elektron. dani. Kh.: KhDUKhT (in Ukrainian).
- Hachak, Y., Nagovska, V., Gutyj, B., Mykhaylytska, O., & Koberniuk, V. (2020). Technological characteristics of processed and prophylactic processed cheese with a new phytospection “Ukrainska kukhnia”. *Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies*, 22(93), 67–71. doi: 10.32718/nvlvet-f9312.
- Hachak, Y., Nahovska, V., & Gutyj, B. (2021). The use of cryopowder from seafood in the technology of thermostatic yogurt for therapeutic and prophylactic purposes. *Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies*, 23(95), 83–90. doi: 10.32718/nvlvet-f9514.
- RI 5.4-52/k (2017). Rozrakhunok vuhlevodiv u kormakh (in Ukrainian).
- RI 5.4-85/k (2019). Rozrakhunok enerhetychnoi tsinnosti kharchovykh produktiv (in Ukrainian).
- Romanova, S. V., Demeshko, O. V., Mykhailenko, O. O., Volochai, V. I., Kozyra, S. A., & Duchenko, M. A. (2021). Biolohichno aktyvni rechovyny arakhisa kulturnoho. “Planta + Nauka, Praktyka ta osvita” Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, 165–169. URL: <http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24950> (in Ukrainian).
- Satina, H. M., Oleshchenko, F. H., Koshlakova, N. M. ta in. (2011). Naukovi osnovy ta skladovi haluzevoi prohramy rozvytku horikhivnytstva v Ukraine. Kyiv: Lohos (in Ukrainian).
- Settaluri V. S., Kandala, C. V. K., Puppala, N., & Sundaram, J. (2012). Peanuts and Their Nutritional Aspects – A Review. *Food and Nutrition Sciences*, 3(2), 25267. doi: 10.4236/fns.2012.312215.
- Simakhina, H. O., & Ukrainets, A. I. (2010). Innovatsiini tekhnolohii ta produkty: ozdorovche kharchuvannia. K.: NUKhT (in Ukrainian).
- Vlasenko, N. M., Romanova, S. V., Kozyra, S. A., & Volochai, V. I. (2020). Khimichnyi sklad arakhisa kulturnoho. Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii. Kharkiv, 69. URL: <https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/24040/1/69.pdf> (in Ukrainian).
- Zolotukhina, I. V. (2017). Konspekt lektsii z kursu “Innovatsiini restoranni tekhnolohii” (dlia studentiv 5 kursu dennoi formy navchannia osvitnokvalifikatsiinoi rivnia mahistr, spetsialnosti 241 – Hotelna i restoranna sprava). Kharkiv. nats. un-misk. hosp-va im. O. M. Beketova. Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova (in Ukrainian).
- Zubar, N. M. (2010). Osnovy fiziologii ta hihieny kharchuvannia: Pidruchnyk. K.: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).