
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Primeros registros de *Cyanocompsa cyanea* en la provincia de Buenos Aires y notas sobre su presencia en Entre Ríos

Montaldo, N. H.
1984

Cita: Montaldo, N. H. (1984) Primeros registros de *Cyanocompsa cyanea* en la provincia de Buenos Aires y notas sobre su presencia en Entre Ríos. *Hornero* 012 (03) : 219-220

PRIMEROS REGISTROS DE *Cyanocompsa cyanea* EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y NOTAS SOBRE SU PRESENCIA EN ENTRE RÍOS*

NORBERTO H. MONTALDO**

SUMMARY: The Ultramarine Grosbeak (*Cyanocompsa cyanea*) is reported for the first time for Buenos Aires Province. Data on the general distribution of the species in Argentina (particularly Entre Ríos) is given.

Tradicionalmente (Zotta, 1944; Olrog, 1963 y 1979) se ha señalado que la Reina Mora (*Cyanocompsa cyanea*), con dos subespecies en nuestro país, habita el norte, al oeste de los ríos Paraguay y Paraná hasta Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Rioja (*C. c. argentina*) y en el este, las provincias de Misiones y Corrientes (*C. c. sterea*).

Sin embargo, Pereyra (1942) la había citado previamente para la provincia de Entre Ríos en "las costas al norte del Paraná"; al referirse a *Aimophila stringiceps* dice que "Esa zona de Entre Ríos en la cual se encuentra, es muy semejante por su terreno calcáreo, su vegetación, y mayor altura con el de las Sierras de Córdoba; por la misma causa se encuentran allí otras especies propias de lugares de más altura y con las mismas características físicas o ambientales, como la *C. c. argentina*, —Reina Mora— y otras que no se hallan en la hondonada de Santa Fe".

Con posterioridad, Freiberg (1943) incluye Entre Ríos (costa del río Uruguay) en la distribución de *C. c. sterea*, adicionando que "esta especie es relativamente frecuente en la zona del Paraná aunque no ha sido señalada todavía". También es mencionada por Navas (1982) en el Parque Nacional El Palmar, en el departamento Colón, e indica como subespecie probable a *C. c. sterea*.

Para Short (1975), *C. c. argentina* "occurs from Central Bolivia and western Mato Grosso S through the Chaco and dry subtropical forest to San Luis, Córdoba, and Santa Fe, and perhaps sporadically farther", luego agrega "Birds from eastern Chaco tend toward the more eastern race *sterea*". En el mapa de distribución que adjunta, el área sombreada no comprende a Entre Ríos ni a Buenos Aires. Tampoco fue registrada por Narosky (1978) entre la avifauna bonaerense.

Durante noviembre de 1982, en dos visitas sucesivas a la localidad de Lima, partido de Zárate, NE de Buenos Aires, se observaron machos adultos: dos el día 5 y otro el 8 de ese mes. Fueron hallados en un bosque xeromórfico nativo situado en las barrancas del Paraná, en el que predominaban el tala (*Celtis tala*), la sombra de toro (*Jodina rhombifolia*) y el molle (*Schinus longifolius*); existiendo también numerosos manchones de chañar (*Geoffroea decorticans*) e individuos aislados de algarrobo (*Prosopis alba*) y de ombú (*Phytolacca dioica*).

Teniendo en cuenta la distribución considerada y las características del lugar de estudio, puede suponerse que se trataba de ejemplares silvestres y no escapados de cautiverio. Para complementar la observación se entrevistó a un cazador de pájaros de la zona quien manifestó que la Reina Mora es escasa en el área, donde aparece en forma espaciada e irregular. Entre las aves utilizadas como señuelo poseía machos de esta especie y también de la Reina Mora Chica (*Cyanoloxia glaucocerulea*), que frecuenta el paraje y

* Estos registros fueron realizados junto con Héctor E. López, quien posee documentación fotográfica de uno de los ejemplares observados.

** Ing. Agr., observador independiente. Fray Cayetano Rodríguez 711; 1406 Capital Federal, Argentina.

ISSN 0073-3407	EL HORNERO	Buenos Aires	v. XII	n. 3	pág. 219-220	Diciembre 1984
-------------------	---------------	-----------------	--------	------	-----------------	-------------------

conocen como "azulejillo". Descartamos así la posible confusión entre ambos emberízidos, considerando además el buen conocimiento de la avifauna lugareña demostrado por esa persona.

AGRADECIMIENTOS

Al Lic. Rosendo M. Fraga por la colaboración y el asesoramiento prestados y al Dr. Jorge R. Navas, del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", por facilitar el acceso a la colección de su cargo.

BIBLIOGRAFIA

- FREIBERG, M. A., 1943. Enumeración sistemática de las aves de Entre Ríos y lista de los ejemplares que las representan en el Museo de Entre Ríos. Mem. Mus. Entre Ríos (Zool. 21):1-110.
- NAROSKY, T., 1978. Aves argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asociación Ornitológica del Plata, Bs. As.
- NAVAS, J. R., 1982. Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar. Anales de Parques Nacionales XV: 35-64.
- OLROG, C. C., 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Op. Lilloana 9:1-377.
- , 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27:1-324.
- PEREYRA, J. A., 1942. Avifauna argentina. Contribución a la ornitología. Mem. Jardín Zool. La Plata:173-274.
- SHORT, L. L., 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 154 (3):163-352.
- ZOTTA, A. R., 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Tirada aparte de la Asociación Ornitológica del Plata.