



MOSTRA CIENTÍFICA DE FARMÁCIA

**PERFIL DE UTILIZAÇÃO DA VARFARINA EM PACIENTES
ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM – CE**

fors
CATÓLICA DE QUIXADÁ

**Formando pessoas,
transformando realidades!**

PERFIL DE UTILIZAÇÃO DA VARFARINA EM PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM – CE

Géssica Oliveira Duarte de Menezes¹; Anizia Sabina Campelo Malveira¹; João Pedro de Sousa Lima¹; Regilane Matos da Silva Prado²; Leina Mércia de Oliveira Vasconcelos²

¹Discente do curso de Farmácia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

²Docente do curso de Farmácia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

RESUMO

A Varfarina, derivado cumarínico, é um medicamento amplamente utilizado na profilaxia e no tratamento de distúrbios tromboembólicos. Destaca-se como fármaco de alto risco devido ao índice terapêutico estreito, ampla variabilidade dose-reposta e potencial de Interações Medicamentosas. O presente estudo teve como objetivo geral verificar o perfil de utilização da Varfarina em pacientes atendidos na Farmácia Básica da Secretaria de Saúde do Município de Quixeramobim – CE no período de abril a maio de 2014. A pesquisa foi do tipo observacional, analítica e transversal, com abordagem quantitativa. Fizeram parte da pesquisa 15 pacientes com média de idade 56,2 anos e que recebem o medicamento na unidade de saúde. Os dados foram coletados através de um questionário composto de perguntas estruturadas e semiestruturadas. Os resultados evidenciaram que 57% dos pacientes eram do sexo masculino, 60% casados, 47% possuem renda familiar de 2 a 4 salários mínimos e 40 % possuem somente ensino fundamental incompleto. Em relação à terapia com a Varfarina, 60% dos pacientes apresentaram posologias diferenciadas, 47% afirmaram sentir efeitos indesejáveis, 87% não apresentaram dúvidas em relação ao uso do medicamento e 93% afirmaram fazer uso de medicamentos concomitantes com ocorrência de interações medicamentosas. Em relação à realização do exame do Tempo de Protombina, 73% disseram realizar regularmente a cada 30 dias. Quanto às informações recebidas do médico a respeito do uso da Varfarina, 93% relataram receber e 53% afirmaram receber informações do farmacêutico sobre a terapia medicamentosa. A Atenção Farmacêutica tem grande importância para a terapia anticoagulante, pois o farmacêutico, além de orientar e esclarecer as dúvidas do paciente na hora da dispensação do medicamento, pode também intervir no tratamento se houver riscos de hemorragias ou tromboembolismo para o indivíduo, interferindo positivamente na adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Anticoagulantes Orais. Varfarina. Distúrbios Tromboembólicos. Interações Medicamentosas.