

20

**“ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA SÍFILIS EN LA CAVIDAD BUCAL”****AUTORES: MERCADO M. L.; ROM M. G.; BERNARDI H. A.  
FOLP. (UNLP.). - 50 e/1 y 115**

**Introducción:** La Sífilis, enfermedad de transmisión sexual, cuya incidencia ha aumentado considerablemente desde la aparición del VIH; presentando múltiples manifestaciones, algunas localizadas a nivel de la mucosa bucal.

**Objetivos:** 1- Describir mediante los métodos semiológicos las localizaciones más frecuentes de las lesiones del secundarismo sifilítico en la mucosa bucal. 2- Considerar distintas variables en relación a la patología en estudio.

**Material y métodos:** Se tuvieron en cuenta pacientes de ambos sexos recepcionados en la Unidad Hospitalaria de la Asignatura Patología y Clínica Estomatológica. Se confeccionaron las Historias Clínicas. Todos los pacientes fueron VDRL+. Las variables consideradas fueron: edad, sexo, ocupación, lugar de procedencia, localización de la lesión, tiempo de evolución e inmunocompetencia.

**Resultados:** sobre un total de 6 pacientes se registraron los siguientes datos: edad X: 48 años; rango 14 a 68 años; sexo: masculino (4) y femenino (2); ocupación: jubilados (3), estudiante (1), ama de casa (1), procedencia: La Plata (4), Magdalena (1), Alejandro Korn (1); localización: lengua (6), mucosa yugal (3), mucosa labial (3), orofaringe (1), comisura (1). Todos presentaron adenopatías. Tiempo de evolución: 3 a 9 meses. Todos los pacientes eran inmunocompetentes.

**Conclusiones:** 1- Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la localización más frecuente fue en la lengua, seguida por mucosa yugal y labial y con menor incidencia comisura y orofaringe. 2- De las variables estudiadas el sexo masculino fue más frecuente y el rango de edad entre 14 y 68 años. Llama la atención la mayor incidencia en pacientes jubilados.