




Politeknik Kesehatan  
Kemenkes Semarang



# **PANDUAN FASILITATOR *ONLINE CLASS* PERSIAPAN PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI**

**PANDUAN FASILITATOR  
*ONLINE CLASS* PERSIAPAN  
PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI**

**Tim Penyusun :**

Diki Retno Yuliani, SST, M.Tr.Keb

Riza Amalia, SST, M.Kes

**Penerbit :**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

# **Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

## **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Ketentuan Pidana Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **Penting Diketahui!**

### **Pembajakan Buku adalah Kriminal!**

Anda jangan menggunakan buku bajakan, demi menghargai jerih payah para pengarang yang notabene adalah para guru.

# **PANDUAN FASILITATOR ONLINE CLASS PERSIAPAN PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI**

## **Tim Penyusun :**

Diki Retno Yuliani, SST, M.Tr.Keb  
Riza Amalia, SST, M.Kes

**Edisi I, Cetakan Pertama 2021**

## **Diterbitkan Oleh :**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang  
Telp. 0247477208  
perpustakaanpoltekkessmg@yahoo.com  
Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Jawa Tengah 50268

ISBN : 978-623-6730-89-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menterjemahkan  
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari  
penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku “PANDUAN FASILITATOR *ONLINE CLASS* PERSIAPAN PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI”. Buku panduan ini disusun untuk digunakan sebagai panduan bagi fasilitator dalam pengelolaan *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku panduan ini dan kami mengharapkan buku panduan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Purwokerto, September 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN HAK CIPTA .....	ii
HALAMAN VERSO .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I TEKNIS PELAKSANAAN <i>ONLINE CLASS</i> PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN.....	2
C. MANFAAT.....	2
D. SASARAN.....	3
E. FASILITATOR.....	3
F. PERENCANAAN KEGIATAN.....	3
G. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
H. EVALUASI KEGIATAN .....	8
I. PENUTUP.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
<b>BAB II MODUL KELAS PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI</b>	
A. MENJAGA KEHANGATAN BAYI.....	10
1. PRINSIP-PRINSIP MENJAGA KEHANGATAN BAYI .....	10
2. PERAWATAN METODE KANGURU .....	12
B. MENJAGA KEBERSIHAN DIRI BAYI .....	15
1. CARA MENGGANTI POPOK .....	15
2. CARA MERAJAT TALI PUSAT .....	16
3. CARA MENCEGAH INFEKSI .....	18
4. CARA MEMANDIKAN BAYI .....	19

5. KEPERLUAN BAYI.....	28
C. MENYUSUI BAYI.....	29
1. DEFINISI ASI EKSKLUSIF .....	29
2. PAYUDARA.....	29
3. INISIASI MENYUSU DINI (IMD) .....	30
4. MANFAAT ASI.....	32
5. TAHAPAN-TAHAPAN ASI.....	33
6. POSISI MENYUSUI.....	35
7. TEKNIK MEYUSUI YANG BENAR .....	38
8. LAMA DAN FREKUENSI MENYUSUI .....	42
9. TANDA BAYI MENDAPATKAN ASI YANG CUKUP .....	42
10.CARA MEMPERBANYAK ASI.....	43
11.MASALAH DALAM MENYUSUI .....	44
12.MENYUSUI BAGI IBU BEKERJA .....	46
D. MENGENAL TANDA BAHAYA BAYI .....	52
1. TANDA BAYI BARU LAHIR SEHAT .....	52
2. TANDA BAHAYA BAYI BARU LAHIR .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **TEKNIS PELAKSANAAN *ONLINE CLASS* PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI**

### **A. LATAR BELAKANG**

Selama masa kehamilan, ibu hamil di fasilitasi mengikuti kelas ibu hamil, salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang perawatan bayi sebagai persiapan ketika sudah bersalin. Pada pertemuan ke empat kelas ibu hamil ada materi dengan tema perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal.<sup>1</sup> Pemberian materi tersebut pada ibu hamil diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang perawatan bayi baru lahir, serta meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam perawatan bayi ketika bayi yang sedang dikandung sudah lahir.

Sejak tahun 2020, pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam yang berdampak pada segala aspek kehidupan, salah satunya pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, yang terkena dampak baik secara akses maupun kualitas. Banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil.<sup>2</sup>

Pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari 1 tahun, dan untuk meminimalkan dampak pembatasan akses pelayanan maternal terhadap persiapan perawatan bayi baru lahir, dapat dilakukan upaya merubah

penyampaian materi tentang persiapan menyusui dari kelas ibu hamil secara tatap muka menjadi *online class*. Diharapkan dengan *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari, pengetahuan ibu hamil tentang perawatan bayi semakin baik sehingga akan meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayinya. Untuk mengelola *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari, diperlukan sebuah buku panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator dalam membentuk dan mengelola *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari.

## **B. TUJUAN**

Tujuan disusunnya buku panduan ini adalah untuk digunakan sebagai panduan bagi fasilitator dalam pengelolaan *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari.

## **C. MANFAAT**

### 1. Bagi fasilitator/unit pelayanan kesehatan

Fasilitator atau unit pelayanan kesehatan dapat menginisiasi/membentuk *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari, sehingga meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil untuk merawat bayinya setelah bersalin.

### 2. Bagi ibu hamil

Ibu hamil mendapatkan komunitas sosial tentang persiapan perawatan bayi sehari-hari dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang persiapan perawatan bayi sehari-hari, sehingga

meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayinya setelah bersalin.

### 3. Bagi Masyarakat

Melalui pelaksanaan *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari, dapat menunjang optimalisasi kesehatan bayi sebagai bagian dari masyarakat.

## D. SASARAN

Sasaran *online class* persiapan menyusui adalah ibu hamil primigravida yang ingin mengetahui informasi tentang persiapan perawatan bayi sehari-hari secara *online* dan mempunyai android, aplikasi whatsapp serta dapat mengakses *google form*.

## E. FASILITATOR

Seseorang yang dapat menjadi fasilitator dalam *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari adalah tenaga kesehatan yang memahami tentang persiapan perawatan bayi sehari-hari seperti bidan, perawat atau dokter dan tenaga non kesehatan yang telah mengikuti pelatihan tentang persiapan perawatan bayi sehari-hari. Fasilitator harus dapat melakukan *share* materi ke grup whatsapp dan membuat *google form*.

## F. PERENCANAAN KEGIATAN

Perencanaan dalam pembentukan *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari meliputi :

1. Mengurus perizinan
2. Mengidentifikasi peserta yang akan mengikuti *online class*
3. Membentuk grup whatsapp untuk peserta *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari
4. *Share* biodata fasilitator dan teknis pelaksanaan *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari
5. Mencetak modul
6. Pengisian kuesioner pengetahuan tentang perawatan bayi sehari-hari dan *breastfeeding self efficacy short form (BSE-SF)<sup>3</sup> pretest*
7. Mengirimkan modul kepada masing-masing peserta melalui jasa pengiriman

## G. PELAKSANAAN KEGIATAN

HARI KE	KEGIATAN FASILITATOR	KEGIATAN PESERTA
1	<i>Share</i> materi ke I : menjaga kehangatan bayi (prinsip-prinsip menjaga kehangatan bayi dan perawatan metode kanguru)	Membaca materi melalui grup whatsapp atau modul
2	Grup whatsapp open sementara, memberi kesempatan peserta untuk bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain  Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta	Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi  Menyimak jawaban dari fasilitator
4	<i>Share</i> materi ke II : menjaga kebersihan diri (cara mengganti popok, cara merawat tali pusat dan cara mencegah infeksi)	Membaca materi melalui grup whatsapp atau modul

HARI KE	KEGIATAN FASILITATOR	KEGIATAN PESERTA
5	Grup whatsapp open sementara, memberi kesempatan peserta untuk bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain	Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi
	Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta	Menyimak jawaban fasilitator dari
7	<i>Share</i> materi ke III : menjaga kebersihan diri (cara memandikan bayi dan keperluan bayi)	Membaca materi melalui grup whatsapp atau modul
8	Grup whatsapp open sementara, memberi kesempatan peserta untuk bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain	Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi
	Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta	Menyimak jawaban fasilitator dari
10	<i>Share</i> materi ke IV : menyusui bayi (definisi ASI eksklusif, payudara, inisiasi menyusui dini, manfaat ASI, tahapan ASI)	Membaca materi melalui grup whatsapp atau modul
11	Grup whatsapp open sementara, memberi kesempatan peserta untuk bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain	Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi
	Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta	Menyimak jawaban fasilitator dari

HARI KE	KEGIATAN FASILITATOR	KEGIATAN PESERTA
13	<i>Share</i> materi ke V : menyusui bayi (posisi menyusui dan teknik menyusui yang benar)	Membaca materi melalui grup whatsapp atau modul
14	Grup whatsapp open sementara, memberi kesempatan peserta untuk bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain  Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta	Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi  Menyimak jawaban dari fasilitator
16	<i>Share</i> materi ke VI : menyusui bayi (lama dan frekuensi menyusui, tanda bayi mendapatkan ASI yang cukup, cara memperbanyak ASI dan masalah dalam menyusui)	Membaca materi melalui grup whatsapp atau modul
17	Grup whatsapp open sementara, memberi kesempatan peserta untuk bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain  Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta	Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi  Menyimak jawaban dari fasilitator
19	<i>Share</i> materi ke VII : menyusui bayi (menyusui bagi ibu bekerja)	Membaca materi melalui grup whatsapp atau modul
20	Grup whatsapp open sementara, memberi kesempatan peserta untuk	Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi

HARI KE	KEGIATAN FASILITATOR	KEGIATAN PESERTA
	bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain	
	Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta	Menyimak jawaban fasilitator dari
22	<i>Share materi ke VIII : mengenal tanda bahaya bayi (tanda bayi baru lahir sehat dan tanda bahaya bayi baru lahir)</i>	Membaca materi melalui grup whatsapp atau modul
23	Grup whatsapp open sementara, memberi kesempatan peserta untuk bertanya atau berdiskusi dengan peserta lain	Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi
	Menjawab pertanyaan yang diajukan peserta	Menyimak jawaban fasilitator dari
24	<i>Share link google form kuesioner pengetahuan tentang perawatan bayi sehari-hari dan breastfeeding self efficacy short form (BSE-SF) posttest</i>	Mengisi <i>google form</i> kuesioner pengetahuan tentang perawatan bayi sehari-hari dan <i>breastfeeding self efficacy short form (BSE-SF) posttest</i>
Grup whatsapp akan di hapus setelah semua mengisi link evaluasi		

## H. EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui :

- Pengisian kuesioner pengetahuan ibu tentang perawatan bayi sehari-hari pretest dan posttest
- Pengisian kuesioner *breastfeeding self efficacy short form (BSE-SF)* pretest dan posttest

## I. PENUTUP

Buku “PANDUAN FASILITATOR *ONLINE CLASS* PERSIAPAN PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI” ini telah disusun secara sistematis, untuk memudahkan fasilitator dalam mengelola *online class* persiapan perawatan bayi sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

1. KEMENKES RI. Pegangan Fasilitator Kelas Ibu Hamil. Jakarta: KEMENKES RI, 2014.
2. Direktorat Kesehatan Keluarga. Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19, [http://www.kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Pedoman bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan BBL di Era Pandemi COVID 19.pdf](http://www.kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Pedoman%20bagi%20Ibu%20Hamil,%20Bersalin,%20Nifas%20dan%20BBL%20di%20Era%20Pandemi%20COVID%2019.pdf) (2020).
3. Dodt RCM, Ximenes LB, Almeida PC, et al. *Psychometric and maternal sociodemographic assessment of the breastfeeding self-efficacy scale-short form in a brazilian sample. J Nurs Educ Pract* 2012; 2: 66.

## **BAB II**

### **MODUL KELAS PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI**

#### **A. MENJAGA KEHANGATAN BAYI**

##### **1. PRINSIP-PRINSIP MENJAGA KEHANGATAN BAYI**

Bayi berada dalam suhu hangat saat di dalam perut ibu, ketika bayi lahir ke dunia suhu ruangan lebih dingin dibandingkan di dalam Rahim,<sup>1</sup> dan bayi juga belum mampu mengatur suhu tubuh. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan bayi lebih mudah mengalami kedinginan (hipotermi) dan itu merupakan kondisi berbahaya,<sup>2</sup> yaitu dapat menyebabkan kegagalan nafas (asfiksia) dan berdampak pada kematian.<sup>1</sup> Sehingga menjaga kehangatan bayi adalah hal yang sangat penting agar bayi tetap sehat.<sup>3</sup>

Hipotermi pada bayi dapat terjadi pada bayi setiap saat terutama pada 6-12 jam pertama kelahiran. Hipotermi pada bayi dapat terjadi jika bayi berada pada lingkungan yang rendah atau prinsip-prinsip menjaga kehangatan bayi tidak diterapkan dengan baik.<sup>2</sup> Suhu normal bayi adalah 36,5-37,5 °C.<sup>1</sup>

Cara menjaga kehangatan bayi adalah :

- a. Setiap kali bayi basah, segera keringkan tubuh bayi dan ganti pakaian/kainnya dengan yang kering dan bersih

- b. Bayi baru boleh dimandikan dengan air hangat 6 jam setelah lahir, dengan syarat kondisi bayi stabil.
- c. Segera keringkan tubuh bayi setelah dimandikan, kenakan pakaian yang lembut, bersih dan kering, topi, kaus tangan, kaus kaki atau selimut jika perlu.
- d. Mandikan bayi 2 kali sehari (tidak boleh lebih), jika tidak ada tanda-tanda hipotermi. Pada bayi usia < 2 bulan cukup mandikan bayi 1 kali sehari.
- e. Sebelum tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan di lap, sedangkan setelah tali pusat lepas bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air
- f. Bungkus bayi dengan kain yang bersih dan kering, beri pakaian dan selimut setiap saat
- g. Pakaikan topi, kaos kaki dan kaos tangan jika dirasa cuaca dingin
- h. Baringkan bayi di tempat yang hangat, jangan tidurkan bayi ditempat yang dingin atau banyak angin, misalnya di dekat jendela atau pintu
- i. Jaga ruangan tetap hangat, dengan suhu 22-28 °C
- j. Letakkan bayi ke dada ibu sesering mungkin
- k. Bayi harus rawat gabung dengan ibu (tidur bersama ibu), sehingga ibu lebih mudah untuk menjangkau bayi
- l. Jika telapak kaki bayi terasa dingin, bayi dapat di letakkan di dada ibu (kontak kulit ibu dengan kulit bayi) atau di tambah dengan selimut
- m. Jika bayi < 2500 gram atau suhu < 36,5 °C, hangatkan bayi dengan perawatan metode kanguru atau dengan lampu 60 watt dengan jarak minimal 60 cm dari bayi

- n. Usahakan bayi berada dalam lingkungan yang sejuk, jika menggunakan kipas angin usahakan arah angin tidak langsung mengenai bayi dan jika menggunakan AC, aturlah pada suhu 25-26 °C, serta hindarkan bayi dari jendela yang terbuka dan alat-alat yang terbuat dari besi. <sup>1,2,3,4,5,6</sup>

## **2. PERAWATAN METODE KANGURU (PMK)**

Perawatan metode kanguru (PMK) adalah cara merawat bayi dalam keadaan telanjang (hanya memakai popok dan topi) diletakkan secara tegak/vertikal ke dada, diantara kedua payudara ibu (ibu telanjang dada) sehingga terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi. PMK merupakan kontak kulit ke kulit secara dini, berkepanjangan dan berkesinambungan antara ibu (pengganti ibu) dan bayi, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun setelah pulang.

Adapun beberapa manfaat PMK adalah :

- a. Menjamin kehangatan dan mencegah hipotermi
- b. Menjamin kebutuhan nutrisi bayi dengan mendorong ibu menyusui bayinya sesering mungkin
- c. Mencegah infeksi selama perawatan
- d. Mempercepat pemulangan bayi


Waktu untuk memulai PMK menyesuaikan kondisi bayi dan ibunya. Setelah kondisi bayi stabil, ibu bersedia dan telah memahami tentang PMK, maka PMK dapat segera dilaksanakan. Pada bayi dengan

berat > 1800 gram (usia kehamilan 32-34 minggu) tanpa masalah kesehatan, PMK dapat segera dilakukan, namun pada bayi dengan berat < 1800 gram biasanya mengalami permasalahan kesehatan, sehingga PMK tidak dapat segera dilakukan. PMK dapat dilakukan minimal 1 jam atau sepanjang hari siang dan malam.

Adapun langkah-langkah PMK meliputi :

- a. Cuci tangan
- b. Ukur suhu bayi
- c. Pakaikan topi dan popok pada bayi
- d. Pakaikan baju kanguru pada ibu
- e. Bayi diposisikan tegak di dada ibu (kontak kulit) seperti kanguru :
  - 1) Bayi berada di antara payudara ibu dalam posisi tegak
  - 2) Kepala bayi menghadap ke salah satu sisi dan agak menengadah untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka
  - 3) Pinggul dan kaki bayi dalam posisi tertekuk seperti “katak”
  - 4) Lengan bayi juga menekuk
  - 5) Dada bayi sejajar dengan dada ibu
  - 6) Menopang bokong bayi dengan kain gendongan

- f. Setelah posisi bayi baik, baju kanguru diikat untuk menyangga bayi. Selanjutnya ibu dapat beraktifitas seperti biasa sambil membawa bayinya. <sup>4</sup>



Gambar 1. Posisi Bayi dalam Perawatan Metode Kanguru<sup>4</sup>

## B. MENJAGA KEBERSIHAN DIRI BAYI

### 1. CARA MENGGANTI POPOK

Ibu dapat menggunakan popok berbahan dasar kain atau popok sekali pakai untuk dikenakan pada bayi. Ibu membutuhkan latihan untuk dapat melipat dan memasang popok dengan mahir. Ketika memasang popok, pastikan bagian atas popok terletak di bawah tali pusat, sampai tali pusat kering dan lepas.<sup>7</sup>



Gambar 2. Melipat Popok di Bawah Tali Pusat

Setelah BAB atau BAK, bersihkan bagian anus dan kemaluan bayi dengan menggunakan kapas basah, kemudian dikeringkan untuk mencegah terjadinya

ruam atau lecet. Air yang digunakan untuk membuat kapas basah adalah air hangat, untuk mencegah terjadinya hipotermi. Hindari penggunaan bedak pada bagian bokong dan selangkangan, karena bedak yang menempel dan kelembapan akibat air seni bayi dapat menyebabkan lecet.<sup>1</sup>

## **2. CARA MERAWAT TALI PUSAT**

Perawatan tali pusat bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat dan agar tali pusat cepat puput/lepas.<sup>2</sup>

Beberapa prinsip-prinsip dalam merawat tali pusat bayi :

- a. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat.
- b. Jangan membungkus tali pusat atau memberikan apapun pada tali pusat (mengoleskan cairan atau bahan apapun).
- c. Mengoleskan alkohol atau povidon yodium masih diperbolehkan apabila terdapat tanda infeksi seperti kemerahan atau mengeluarkan cairan berbau tidak sedap, tetapi tidak boleh dikompreskan karena dapat menyebabkan tali pusat basah atau lembab.
- d. Lipat popok di bawah puntung tali pusat.
- e. Luka tali pusat harus dijaga tetap terbuka, kering dan bersih, sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri.

- f. Jika tali pusat kotor, bersihkan (hati-hati) dengan air bersih dan sabun dan segera keringkan dengan menggunakan kain bersih.
- g. Perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat: kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tampak nanah atau berbau. Jika terdapat tanda infeksi, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan.<sup>5,8</sup>
- h. Jika tali pusat bayi telah lepas, jaga kebersihannya dengan membersihkan pusat saat mandi dan keringkan.<sup>1</sup>



Gambar 3. Cuci Tangan yang Benar<sup>9</sup>

### 3. CARA MENCEGAH INFEKSI

Beberapa cara untuk mencegah infeksi pada bayi baru lahir meliputi :

- a. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi
- b. Menjaga tali pusat tetap bersih dan kering. Jika tali pusat kotor bersihkan dengan air matang, kemudian keringkan dengan kain yang bersih dan kering
- c. Jaga kebersihan tubuh bayi dengan memandikannya setelah suhu stabil. Gunakan sabun dan air hangat, bersihkan seluruh tubuh dengan hati-hati
- d. Memastikan bahwa semua pakaian, handuk, selimut serta kain yang digunakan untuk bayi dalam kondisi bersih
- e. Ibu menjaga kebersihan diri, terutama payudara dengan mandi setiap hari
- f. Hindarkan bayi baru lahir kontak dengan orang sakit, karena sangat rentan tertular penyakit
- g. Memastikan orang yang akan memegang bayi sudah cuci tangan terlebih dahulu
- h. Minta ibu memberikan kolostrum karena mengandung zat kekebalan tubuh
- i. Anjurkan ibu menyusui sesering mungkin hanya ASI saja sampai 6 bulan. Bila bayi tidak bisa menyusu, berikan ASI perah dengan menggunakan cangkir/sendok. Hindari pemakaian botol dan dot karena dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran cerna.<sup>4,10</sup>

#### 4. CARA MEMANDIKAN BAYI

- a. Suhu ruangan saat memandikan bayi harus hangat ( $> 25^{\circ}\text{C}$ )
- b. Suhu air yang optimal adalah  $40^{\circ}\text{C}$  untuk bayi  $< 2$  bulan, dapat berangsur turun sampai  $30^{\circ}\text{C}$  untuk bayi di atas 2 bulan.<sup>11</sup>
- c. Mandikan bayi 2 kali sehari, pagi dan sore, serta bersihkan kepala bayi (keramas) 2-3 kali dalam seminggu
- d. Produk kebersihan yang di gunakan untuk bayi (sabun dan shampo) harus diperhatikan, pilihlah produk yang aman untuk bayi dan tidak menimbulkan alergi, karena bayi memiliki kulit yang sensitif.<sup>1</sup>
- e. Bayi dapat dimandikan dengan mandi rendam atau dibasuh dengan waslap, namun biasanya bayi merasa lebih nyaman jika dimandikan dalam bak rendam berisi air hangat, bayi akan menjadi lebih hangat dan tenang. Mandi rendam tidak menyebabkan peningkatan infeksi tali pusat dan sunat,<sup>7</sup> sehingga aman untuk diterapkan pada bayi baru lahir.
- f. Langkah-langkah dalam memandikan bayi :
  - 1) Menyiapkan perlengkapan mandi meliputi bak mandi bayi, handuk 2 buah, sabun dan shampo bayi, popok dan pakaian bayi, kain bedong, air hangat, waslap 2 buah, kapas basah untuk cebok, minyak telon dan bedak bayi.<sup>7,12</sup>




Gambar 4. Perlengkapan Mandi Bayi

- 2) Mempersiapkan ruangan dalam keadaan hangat
- 3) Memeriksa air hangat (hangat-hangat kuku) dalam bak mandi, diperiksa dengan punggung tangan
- 4) Melepas pakaian bayi
- 5) Membersihkan tinja dari daerah bokong sebelum dimandikan agar air mandi tetap bersih (bila ada)




Gambar 5. Cara Membersihkan Tinja Bayi

- 6) Meletakkan bayi pada selembur handuk
- 7) Membersihkan mata, hidung, telinga dapat menggunakan waslap
- 8) Menyangga kepala bayi sambil mengusapkan air ke muka, tali pusat dan tubuh bayi (dada, tangan dan kaki) dengan waslap yang telah direndam dengan air hangat




Gambar 6. Membersihkan Mata, Hidung, Telinga Bayi dan Mengusap Muka Bayi

- 9) Menyabuni seluruh badan bayi, dada, tangan, kaki termasuk lipatan tubuh bayi dengan waslap yang diberi sabun



Gambar 7. Menyabuni Seluruh Badan Bayi, Membersihkan Tali Pusat dan Genitalia

- 10) Mencuci tali pusat dengan waslap dan sabun, bersihkan dan keringkan seluruhnya
- 11) Membersihkan alat genitalia (tarik katup ke belakang kemudian dibersihkan)
- 12) Masukkan bayi ke dalam bak air hangat, tangan kiri ibu menyangga kepala bayi dan memegang erat ketiak bayi, tangan kanan ibu membersihkan sabun di tubuh bayi menggunakan waslap kedua, lakukan dengan cepat
- 13) Balikkan bayi perlahan untuk membersihkan punggung bayi, tangan kanan menopang badan bayi dan memegang erat ketiak nya




Gambar 8. Membilas Bayi ke dalam Air Hangat Dalam Bak Mandi

- 14)Pencucian rambut dilakukan jika rambut kelihatan kotor
- 15)Segera bungkus bayi dengan handuk kering (handuk kedua) dan letakkan di atas handuk kering.





Gambar 9. Bungkus Bayi Dengan Handuk Kering

- 16)Hindari penggunaan bedak pada bagian bokong dan selangkangan.
- 17) Mengenakan popok, baju bayi dan diselimuti dengan kain bersih dan kering. Pakaian yang digunakan bayi sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat, untuk menghindari terjadinya ruam atau lecet pada kulit bayi, serta gunakan pakaian yang menjaga kehangatan bayi dan mencegah hipotermi.<sup>1,11,12</sup>



Gambar 10. Cara Memasang Baju Bayi (baju, popok, kaos kaki, kaos tangan)





Gambar 11. Cara Memasangkan Bedong

## 5. KEPERLUAN BAYI

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk bayi baru lahir meliputi :

- a. Tempat tidur : set seprei, selimut bayi dan perlak kedap air
- b. Perlengkapan ganti popok : popok kain atau popok sekali pakai, lap kain atau waslap atau kapas basah, tempat penampung popok, salep untuk ruam popok
- c. Pakaian bayi : baju atau setelan kaos berkaki, kaus tangan kaki, kaos dalam, topi
- d. Perlengkapan mandi : handuk yang lembut, waslap, sabun dan shampoo bayi, bak mandi bayi, minyak telon dan bedak bayi
- e. Perlengkapan bayi : gendongan bayi, kereta bayi, termometer dan gunting kuku berujung tumpul.<sup>7,12</sup>

## **C. MENYUSUI BAYI**


### **1. DEFINISI ASI EKSKLUSIF**

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).<sup>13</sup>

### **2. PAYUDARA**

Bagian luar payudara terdiri dari tiga bagian yaitu :

- a. Korpus mammae (badan payudara)  
Bagian yang membesar, teraba halus dan lunak mengelilingi areola mammae (kalang payudara)
- b. Areola mammae (kalang payudara), yaitu bagian yang memiliki warna lebih gelap, melingkari puting susu
- c. Puting susu  
Bagian yang menonjol di puncak payudara. Bentuk puting ada empat yaitu bentuk normal, Panjang, pendek atau datar dan inverted (terbenam).<sup>14,1</sup>



Gambar 12. Bagian Luar Payudara

### 3. INISIASI MENYUSU DINI (IMD)


Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah bayi disusui sesegera mungkin setelah bayi lahir.<sup>2</sup> IMD dilakukan paling singkat selama 1 (satu) jam.<sup>15</sup> Dalam beberapa jam pertama setelah lahir, reflek menghisap awal bayi paling kuat, sehingga upaya untuk menyusui dalam satu jam pertama kelahiran sangat penting untuk keberhasilan proses menyusui selanjutnya. Menyusui dalam satu jam pertama kelahiran akan merangsang produksi ASI dan memperkuat reflek menghisap bayi.<sup>2</sup>

a. Cara melaksanakan IMD :

- 1) Seluruh kepala dan badan bayi di keringkan secepatnya, kecuali kedua tangan, tanpa menghilangkan lemak putih, karena dapat

menyamankan kulit bayi (menjaga kehangatan bayi)

- 2) Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu, keduanya diselimuti dan bayi dapat di beri topi
- 3) Bayi dibiarkan untuk mencari puting susu sendiri. Ibu dapat merangsang bayi dengan sentuhan lembut tapi tidak memaksakan bayi ke puting susu.



Gambar 13. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)<sup>5</sup>

b. Tahapan IMD

- 1) Dalam 30 menit pertama, bayi dalam keadaan istirahat siaga, sekali-kali melihat ibunya, menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
- 2) Antara menit ke 30 - 40 bayi mengeluarkan suara, melakukan gerakan menghisap, memasukkan tangan ke mulut.
- 3) Kaki bayi menekan-nekan perut ibu untuk bergerak ke arah payudara, menjilat-jilat kulit ibu, menyentuh puting susu ibu dengan

tangannya, menghentakkan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri.

- 4) Secara naluriah bayi akan mengeluarkan air liur
- 5) Bayi menemukan puting susu, menjilat, mengulum puting susu, membuka mulut lebar, dan melekat dengan baik ke payudara ibu.<sup>2</sup>

#### **4. MANFAAT ASI**

##### **a. Manfaat ASI bagi bayi**

- 1) Nutrisi yang sesuai untuk bayi<sup>16</sup> dan terbaik untuk bayi<sup>2</sup>
- 2) Mudah di cerna
- 3) Membantu pertumbuhan yang baik bagi bayi
- 4) Mengurangi kejadian gigi berlubang<sup>16</sup>
- 5) Mengandung antibody,<sup>16</sup> sehingga melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi<sup>2</sup>
- 6) ASI yang diproduksi berubah sesuai dengan perkembangan bayi
- 7) Bayi merasa aman, nyaman dan terlindungi
- 8) Meningkatkan kecerdasan
- 9) Koordinasi saraf menghisap, menelan dan bernafas lebih sempurna
- 10) Asupan nutrisi yang bersih, sehat dan suhu tepat<sup>1</sup>
- 11) Kalori yang terkandung dalam ASI dapat memenuhi kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan
- 12) Perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat
- 13) Menunjang perkembangan penglihatan bayi<sup>17</sup>

- b. Manfaat ASI bagi ibu
- 1) Membantu pengembalian ukuran rahim
  - 2) Mencegah terjadinya perdarahan paska bersalin
  - 3) Mengurangi kejadian anemia
  - 4) Menjarangkan kehamilan
  - 5) Ibu merasa bangga dan merasa dibutuhkan
  - 6) Biaya lebih murah <sup>16</sup>
  - 7) Tersedia kapan saja dan dimana saja<sup>1</sup>
  - 8) Menimbulkan rasa kasih sayang <sup>16</sup> sehingga mengeratkan hubungan psikologis ibu dan anak <sup>2</sup>
  - 9) Mempercepat penurunan berat badan seperti sebelum hamil
  - 10) Mengurangi risiko kanker payudara dan kanker ovarium<sup>17</sup>

## 5. TAHAPAN-TAHAPAN ASI

a. Kolostrum

Kolostrum mulai diproduksi dalam satu bulan terakhir kehamilan dan di keluarkan pada hari pertama setelah bersalin sampai hari ke 3 atau ke 5. Kolostrum berwarna kuning keemasan, kental dan kadar protein tinggi. Manfaat kolostrum yaitu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, melapisi usus bayi dan melindungi usus bayi dari bakteri sehingga kolostrum harus diberikan. Produksi kolostrum pada hari pertama hanya satu sendok teh.

b. ASI transisi atau ASI peralihan

ASI yang keluar pada hari ke 3 atau hari ke 5 sampai hari ke 10. Ada yang menyatakan ASI peralihan bertahan sampai 2 minggu. ASI peralihan mengandung kalori yang lebih tinggi di bandingkan kolostrum

c. ASI matur

ASI matur adalah ASI terakhir yang dihasilkan oleh payudara ibu. Terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Foremilk

ASI yang dihasilkan pada awal menyusui, warna lebih jernih dan encer, banyak mengandung air vitamin dan protein sehingga mirip seperti minuman segar untuk menghilangkan haus.

2) Hindmilk

Hindmilk keluar setelah foremilk keluar, warna lebih putih dan lebih kental. Kadar lemak tinggi yang diperlukan untuk penambahan berat badan bayi. Hindmilk cenderung mengenyangkan dan diibaratkan sebagai hidangan utama. Oleh karena itu hendaknya ibu menyusui bayi sampai payudara kosong (mendapatkan foremilk dan hindmilk) sehingga bayi merasa puas dan tidak mudah rewel.<sup>14,1</sup>

## 6. POSISI MENYUSUI

Menyusui dapat dilakukan dengan duduk atau tidur miring<sup>8</sup>. Tidak ada satu posisi yang paling benar untuk menyusui. Yang terpenting adalah posisi ibu saat menyusui harus mantap dan nyaman baik di atas kursi maupun di tempat tidur.<sup>18</sup> Adapun beberapa posisi menyusui diantaranya posisi menggendong, posisi menggendong menyilang, posisi pegangan bola dan posisi berbaring miring kiri.<sup>18</sup>

### 1. Posisi menggendong (*Cradle hold*)

Posisi menyusui dengan payudara kanan, bayi berbaring miring menghadap ke ibu, tangan kanan ibu (lengan bawah sebelah kanan) menyangga kepala, leher, punggung dan bokong bayi, atau sebaliknya. Posisi ini paling mudah dipelajari, paling sering digunakan dan cocok untuk menyusui bayi baru lahir.<sup>14, 7, 18</sup>



Gambar 14. Posisi Menggendong (*Cradle Hold*)

2. Posisi menggendong-menyilang (*Cross cradle hold*)  
Posisi menyusui dengan payudara kanan, bayi berbaring miring menghadap ibu, tangan kiri ibu (lengan bawah sebelah kiri) menyangga kepala, leher, punggung dan bokong bayi, atau sebaliknya. Posisi ini cocok untuk menyusui bayi bertubuh kecil, bayi prematur atau bayi yang sulit menempelkan mulutnya ke payudara.<sup>14,7,18</sup>



Gambar 15. Posisi Menggendong-Menyilang (*Cross Cradle Hold*)

3. Posisi pegangan bola (*Football hold*)  
Bayi berada di bawah lengan, kepala bayi berada di telapak tangan ibu, tubuh bayi di topang oleh lengan bawah ibu. Posisi pegangan bola memudahkan ibu untuk melihat bagaimana perlekatan mulut bayi ke payudara ibu. Posisi ini cocok untuk menyusui bayi kembar, ibu dengan payudara besar karena dada bayi membantu menyangga berat payudara, ibu dengan puting susu datar, ibu yang bersalin secara operasi sesar karena menjauhi daerah sayatan dan

ibu dengan payudara penuh karena akan lebih mudah ditekan pada posisi ini.<sup>14,7</sup>



Gambar 16. Posisi Pegangan Bola  
(*Football Hold*)

#### 4. Posisi berbaring miring (Lying down)


Ibu menghadap ke samping (tidur miring) dengan bayi menghadap ke arah ibu. Posisi ini cocok untuk ibu menyusui yang bersalin secara operasi sesar atau setelah melewati persalinan yang sulit, namun posisi ini tidak cocok untuk ibu dengan payudara besar. Salah satu keuntungan posisi ini adalah ibu mudah beristirahat selama menyusui. Ibu harus berhati-hati, karena jika ibu tertidur payudara dapat menutup jalan pernafasan bayi yang akan membahayakan bayi. Oleh karena itu ibu harus tetap terjaga selama menyusui atau ada orang lain yang mengawasi, misalnya suami dan keluarga.<sup>14,7</sup>



Gambar 17. Posisi Berbaring Miring (*Lying Down*)

## 7. TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR

- a. Posisi badan ibu dan bayi
  - 1) Ibu duduk atau berbaring dengan santai
  - 2) Pegang bayi pada belakang bahunya, tidak pada dasar kepala
  - 3) Badan bayi menghadap ke badan ibu
  - 4) Rapatkan dada bayi dengan dada ibu, atau bagian bawah payudara ibu
  - 5) Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu
  - 6) Dengan posisi seperti ini, maka telinga bayi akan berada dalam satu garis dengan leher dan lengan bayi



Gambar 18. Posisi Telinga dan Bahu Bayi Tegak Lurus, Bayi Berbaring Miring Menghadap ke Ibu

7) Jauhkan hidung bayi dari payudara ibu dengan menyokong bokong bayi dengan lengan ibu<sup>2</sup>

b. Perlekatan mulut bayi ke payudara

1) Payudara di pegang dengan ibu jari di atas, dan jari yang lain menopang di bagian bawah payudara (membentuk huruf C)



Gambar 19. Posisi Memegang Payudara (Membentuk Huruf C)

- 2) Bayi diberi rangsangan agar membuka mulut dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi dengan puting susu
- 3) Tunggu sampai bayi bereaksi dengan membuka lebar mulutnya dan menjulurkan lidahnya
- 4) Dengan cepat dekatkan mulut bayi ke payudara ibu dengan menggerakkan bahu belakang bayi
- 5) Posisi puting susu di atas bibir atas bayi dan berhadapan dengan hidung bayi. Usahakan sebagian kalang payudara (bagian payudara yang berwarna gelap) masuk ke mulut bayi
- 6) Setelah bayi menghisap dengan baik, payudara tidak perlu disangga lagi<sup>2</sup>



Gambar 20. Perlekatan Mulut Bayi<sup>2</sup>

c. Cara melepaskan hisapan bayi

Masukan jari kelingking ke mulut bayi dari sudut mulut atau tekan dagu bayi ke bawah.<sup>16</sup> Jangan menarik paksa ketika melepaskan puting susu, karena dapat menyebabkan perlukaan.<sup>14</sup>

d. Cara menyendawakan bayi

Manfaat menyendawakan bayi adalah untuk mengeluarkan udara yang terisap pada waktu menyusui, dengan cara :

1) Duduk dan diayun

Dudukan bayi dengan posisi menyamping di pangkuan ibu, bayi bertumpu pada salah satu tangan ibu, tangan yang satunya di punggung bayi kemudian tepuk-tepuk atau usap perlahan punggung bayi hingga mengeluarkan sendawa.

2) Menaruh bayi di pundak

Gendong bayi dengan posisi tegak, sandarkan pada pundak ibu, topang bagian punggung dan bokong bayi, kemudian tepuk-tepuk atau usap perlahan punggung bayi hingga mengeluarkan sendawa.

3) Menaruh bayi di pangkuan

Bayi ditidurkan tengkurap di pangkuan ibu, kemudian di tepuk-tepuk atau usap perlahan punggung bayi hingga mengeluarkan sendawa  
14,16,7,17




Gambar 21. Posisi Menyendawakan Bayi

## 8. LAMA DAN FREKUENSI MENYUSUI

- a. Menyusui tidak terjadwal
  - b. Kedua payudara disusukan secara bergantian
  - c. Lama menyusui tergantung masing-masing bayi, normalnya bayi menyusu antara 5-30 menit
  - d. Tidak ada aturan ketat mengenai frekuensi bayi menyusu. Biasanya bayi menyusu tiap 2-3 jam sekali, minimal 8 kali/24 jam pada minggu ke 2-3, selanjutnya sebanyak 10-12 kali/24 jam
  - e. Usahakan setiap menyusui sampai payudara kosong, kemudian pindah ke payudara sebelahnya
- 16,5, 1,8

## 9. TANDA BAYI MENDAPATKAN ASI YANG CUKUP

- a. Buang air kecil bayi 6-8 kali/24 jam<sup>1</sup>
- b. Buang air besar bayi bewarna kekuningan “berbiji”, frekuensi sering dan warna menjadi lebih muda pada hari ke lima setelah kelahiran<sup>1,8</sup>
- c. Bayi tampak puas setelah minum ASI<sup>8</sup>
- d. Payudara terasa lembut dan kosong setelah menyusui
- e. Motorik bayi berkembang dengan baik, ditandai dengan gerakan bayi aktif dan perkembangan motoriknya sesuai dengan usianya
- f. Warna kulit bayi merah, tidak kuning dan kulit terasa kenyal
- g. Berat badan bayi dan tinggi badan bayi bertambah sesuai dengan grafik pertumbuhan
- h. Bayi terlihat puas dan tidur cukup<sup>1</sup>



Gambar 22. BAB Bayi pada Minggu Pertama Kelahiran<sup>4</sup>

## 10. CARA MEMPERBANYAK ASI

- a. Bayi disusui oleh ibunya
- b. Jangan memberikan makanan atau minuman selain ASI
- c. Susui bayi sesering mungkin
- d. Jangan memberikan kempeng atau dot
- e. Mengikuti kegiatan kelompok pendukung ASI
- f. Ibu harus yakin bahwa ASI yang terbaik untuk bayi<sup>16</sup>
- g. Menyusui dengan cara yang benar
- h. Menyusui di tempat yang tenang dan nyaman
- i. Minum setiap kali menyusu
- j. Tidur bersebelahan dengan bayi<sup>8</sup>
- k. Kondisi kejiwaan dan pikiran harus tenang, hindari tekanan psikologis
- l. Melakukan perawatan payudara
- m. Istirahat yang cukup, hindari kondisi terlalu Lelah
- n. Hindari konsumsi rokok dan alkohol<sup>1</sup>

## 11. MASALAH DALAM MENYUSUI

### a. Puting susu lecet

Masalah puting susu lecet dapat sembuh dengan sendirinya jika ibu merawat payudara dengan baik dan teratur.

#### 1) Penyebab puting susu lecet

- a) Posisi dan perlekatan bayi yang buruk terhadap payudara
- b) Ada pembengkakan sehingga perlekatan bayi tidak sempurna
- c) Bayi dengan lidah pendek, bibir sumbing
- d) Melepaskan puting dari mulut bayi dengan cara menariknya
- e) Penggunaan sabun, alkohol atau obat-obatan yang dapat memicu reaksi pada kulit
- f) Sariawan pada mulut bayi
- g) Memompa payudara dengan pompa terlalu kuat<sup>17</sup>

#### 2) Cara menangani puting susu lecet :

- a) Oleskan ASI pada puting setelah selesai menyusui pada puting susu yang lecet
- b) Ibu tetap menyusui dengan mendahulukan payudara dengan puting yang tidak lecet<sup>17</sup>
- c) Jika lecet pada puting susu sangat berat, ASI terlebih dahulu di keluarkan dan di

tampung<sup>8</sup> kemudian puting di istirahatkan selama 24 jam<sup>17</sup>

- d) Tarik nafas dalam dan berusaha tenang saat mulai menyusui, sampai ASI mengalir keluar dan rasa perih berkurang<sup>17</sup>
  - e) Minum obat anti nyeri (parasetamol 500 mg) untuk mengurangi rasa nyeri dan dapat diulang setiap 6 jam<sup>8</sup>
- b. Pembengkakan payudara (bendungan payudara)  
Terlebih dahulu kita harus membedakan payudara penuh dengan ASI dan payudara bengkak. Ibu dengan payudara penuh ASI, gejala yang dirasakan adalah payudara membesar, terasa berat, panas, keras namun tidak disertai demam pada tubuh dan ASI bisa keluar. Sedangkan ibu dengan payudara bengkak, gejala yang dirasakan adalah payudara membesar, panas, keras, disertai dengan rasa sakit, puting tegang, ASI belum keluar dan terkadang disertai badan demam.<sup>17</sup> Pembengkakan pada payudara biasanya terjadi pada hari ke 3-4 setelah melahirkan,<sup>1</sup> dan terjadi karena adanya peningkatan aliran darah ke payudara dalam rangka mempersiapkan payudara untuk menyusui.<sup>19</sup>

Penanganan untuk bendungan payudara meliputi:

- 1) Susukan payudara sesering mungkin
- 2) Susukan kedua payudara

- 3) Sebelum disusukan, kompres hangat payudara
- 4) Untuk permulaan menyusui, bantu dengan memijat payudara terlebih dahulu
- 5) Menggunakan bra yang menyangga
- 6) Diantara waktu menyusui bisa dilakukan kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri
- 7) Bila perlu minum obat pereda nyeri (parasetamol 500 mg).<sup>19</sup>

## **12. MENYUSUI BAGI IBU BEKERJA**

- a. Prinsip-prinsip menyusui bagi ibu bekerja
  - 1) Siapkan pengasuh bayi sebelum ibu kembali bekerja
  - 2) Latihlah pengasuh untuk menghangatkan ASI perah (ASIP) dan terampil memberikan ASIP pada bayi dengan sendok atau gelas
  - 3) Berlatih pemerah ASI sebelum ibu kembali bekerja<sup>17</sup>
  - 4) Susui bayi sampai kenyang sebelum ibu berangkat bekerja. Perah ASI untuk payudara yang belum di hisap bayi sampai kosong
  - 5) Perahlah ASI 3-4 jam sekali selama di kantor<sup>14</sup>
  - 6) Susuilah bayi sepulang bekerja dan dilanjutkan malam hari
  - 7) Menjaga pola makan yang bergizi
  - 8) Olahraga teratur<sup>17</sup>

b. Cara memerah ASI

Memerah ASI dapat dilakukan dengan menggunakan tangan, dengan pompa secara manual atau pompa elektrik. Memerah ASI dapat dilakukan setiap 3-4 jam sekali untuk menjaga produksi ASI tetap baik.


Secara umum langkah-langkah dalam memerah ASI sebagai berikut:

- 1) Semua peralatan di sterilkan
- 2) Pilih tempat yang tenang dan nyaman
- 3) Cuci tangan dengan sabun, payudara dibersihkan dengan air
- 4) Minum segelas air sebelum memerah ASI
- 5) Lakukan pemijatan payudara
- 6) Mulai memerah ASI menggunakan alat yang sesuai<sup>1</sup>

7) Memerah ASI dengan tangan :

- a) Condongkan badan ke depan dan sangga payudara dengan satu tangan, dan tangan yang lain memegang cangkir
- b) Letakkan ibu jari di atas kalang payudara dan jari telunjuk di bawah kalang payudara membentuk seperti huruf C
- c) Tekan kedua jari ke dalam kemudian pijat ke depan sehingga kedua jari memerah dan mengeluarkan ASI, dan lepaskan
- d) Ulangi gerakan tekan-pijat-lepas beberapa kali pada tempat atau posisi yang sama

- e) Setelah pancaran ASI berkurang, pindahkan posisi ibu jari dan jari telunjuk pada sisi yang lainnya pada sekeliling payudara
- f) Lakukan gerakan tersebut pada kedua payudara
- g) Tidak boleh menekan, memijat dan menarik daerah puting susu<sup>2</sup>



Gambar 23. Memerah ASI dengan Tangan<sup>5</sup>

- 8) Jaga kondisi tubuh rileks saat memerah ASI<sup>1</sup>
- 9) Segera simpan ASI pada lemari es atau freezer atau *cooler bag*<sup>1,5</sup>



Gambar 24. Contoh Pompa ASI Elektrik

c. Cara menyimpan ASI

- 1) Simpan ASI pada botol kaca yang telah di sterilkan atau plastik steril khusus ASI
- 2) Tuliskan jam dan tanggal pemerahan ASI pada label dan tempelkan pada botol ASI, atau tuliskan pada label yang sudah tersedia di plastik ASI<sup>1</sup>
- 3) Simpan ASI perah sebanyak 15-60 ml per wadah untuk menghindari ASI perah yang terbuang karena tidak di habiskan oleh bayi<sup>5</sup>

Tabel 1. penyimpanan ASI perah (ASIP)<sup>5</sup>

<b>Tempat penyimpanan</b>	<b>Suhu</b>	<b>Lama penyimpanan</b>
ASI baru diperah yang disimpan dalam <i>cooler bag</i>	15 °C	24 jam
Dalam ruangan (ASIP segar)	27 °C s/d 32 °C < 25 °C	4 jam 6-8 jam
Kulkas <sup>2</sup>	< 4 °C	48-72 jam (2-3 hari)
Freezer pada lemari es 1 pintu	-15 °C s/d 0 °C	2 minggu
Freezer pada lemari es 2 pintu	-20 °C s/d 18 °C	3-6 bulan



Gambar 25. Pemerahan, Penyimpanan dan Pemberian ASI Perah<sup>5</sup>

d. Cara pemberian ASI perah

Sebelum memberikan ASI kepada bayi, terlebih dulu ASI beku di cairkan dengan cara ASI yang masih di dalam botol kaca atau plastik ASI di rendam ke dalam mangkok atau wadah yang berisi air hangat,<sup>2</sup> atau menghangatkan ASI dengan membiarkan botol dialiri air hangat.<sup>1</sup> Perlu diingat, ASI tidak di campur dengan air hangat tersebut. Setelah mencair seluruhnya, ASI perah dapat diberikan dengan gelas atau sendok.<sup>2</sup>

ASI yang telah dihangatkan harus segera di habiskan dalam satu jam dan tidak boleh di simpan ke dalam freezer atau lemari es lagi. Oleh karena itu ketika menghangatkan ASI secukupnya saja, sesuai kebutuhan bayi. ASI tidak boleh

dipanaskan secara langsung di atas api, di rendam dengan air panas<sup>14</sup> mendidih, memanaskan dengan microwave atau alat pemanas lain,<sup>1</sup> karena dapat merusak beberapa kandungan ASI.<sup>14</sup>



Gambar 26. Cara Menghangatkan ASI Perah<sup>5</sup>

## **D. MENGENAL TANDA BAHAYA BAYI BARU LAHIR**

### **1. TANDA BAYI BARU LAHIR SEHAT**

Beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bayi baru lahir dalam kondisi sehat meliputi :

- a. Bayi lahir segera menangis  
Normalnya, segera setelah lahir bayi akan menangis kuat untuk mengembangkan paru-paru dan melakukan pernafasan pertama kali.
- b. Bayi bergerak aktif
- c. Seluruh tubuh bayi kemerahan  
Warna kulit bayi menggambarkan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh bayi. Jika aliran darah dan oksigen cukup maka kulit bayi akan berwarna kemerahan, sebaliknya jika aliran darah dan oksigen kurang maka kulit bayi akan berwarna kebiruan.
- d. Bayi dapat menghisap puting susu dengan kuat
- e. Berat lahir antara 2500 – 4000 gram, bayi dengan berat lahir < 2500 gram rentan mengalami hipotermi (keedinginan) dan infeksi.<sup>2</sup>

### **2. TANDA BAHAYA BAYI BARU LAHIR**

Tanda bahaya bayi baru lahir adalah tanda-tanda peringatan pada bayi baru lahir, yang dapat memberikan informasi kapan waktu untuk meminta bantuan medis. Jika menemukan tanda-tanda bahaya tersebut harus segera menghubungi tenaga kesehatan atau membawa bayi ke fasilitas kesehatan.

Adapun tanda bahaya pada bayi baru lahir meliputi :

a. Suhu tubuh teraba demam atau teraba dingin

Suhu tubuh bayi baru lahir normalnya adalah  $36,5^{\circ}\text{C}$  –  $37,5^{\circ}\text{C}$ . Suhu tubuh bayi (suhu ketiak)  $< 36,5^{\circ}\text{C}$  adalah salah satu tanda bahaya bagi bayi baru lahir yang disebut hipotermi atau badan bayi teraba dingin. Bayi dengan suhu rendah (hipotermi) dapat mengakibatkan kondisi henti nafas, kadar gula darah dalam tubuh rendah dan infeksi. Suhu tubuh bayi (suhu ketiak)  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  juga termasuk salah satu tanda bahaya bagi bayi baru lahir, yang disebut hipertermi atau badan bayi teraba demam.<sup>1,8</sup>

b. Nafas cepat, nafas lambat atau tarikan dinding dada kedalam yang sangat kuat

Nafas bayi normalnya adalah 30 – 60 kali/menit, bayi tampak kemerahan, bernafas dengan mudah, tanpa bunyi mengorok, tanpa pelebaran lubang hidung dan tanpa menarik dada di bawah tulang iga. Nafas cepat jika frekuensi nafas  $\geq 60$  kali/menit dan nafas lambat jika frekuensi nafas  $< 30$  kali/menit.<sup>7,8</sup> Ketika terjadi permasalahan dalam pernafasan, dapat dijumpai tanda-tanda seperti bibir biru, sulit bernafas, lubang hidung melebar atau dada tampak masuk ke dalam saat menghirup udara.<sup>7</sup>

c. Infeksi tali pusat

Infeksi pada tali pusat ditandai dengan pusar kemerahan meluas ke dinding perut, bau tidak enak atau ada cairan seperti nanah.<sup>7,8</sup>

d. Perdarahan

Salah satunya perdarahan pada tali pusat, yang ditandai dengan adanya perdarahan berwarna

merah terang yang meninggalkan bercak lebih besar dari seperempat bagian pada popok.<sup>7,8</sup>

e. Diare

Tinja yang encer dan sering adalah hal yang umum pada bayi baru lahir yang di beri ASI saja. Diare pada bayi dapat ditandai dengan tinja berlendir, berbau tidak enak, lebih cair dan lebih sering dari biasanya, bernoda darah, bayi kelihatan sakit atau pendiam atau gelisah/rewel. Diare adalah salah satu kondisi yang serius pada bayi baru lahir dan harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Jika ditemukan tanda bayi hanya bergerak jika di rangsang atau tidak bergerak sama sekali, mata cekung serta ketika kulit perut di cubit kembalinya lama, merupakan gejala bayi mengalami diare dengan dehidrasi (kekurangan cairan) berat.<sup>7,3,6</sup>

f. Tampak kuning pada telapak tangan dan kaki

Warna kuning pada kulit bayi atau bagian putih mata disebut sebagai ikterus. Ikterus ada yang normal dan ada yang tidak normal. Jika warna kulit wajah dan leher bayi sedikit kekuningan pada hari ke dua sampai empat belas (2-14) kehidupannya, tergolong dalam ikterus yang normal dan tidak berbahaya. Namun kadang-kadang dapat menimbulkan kekhawatiran jika area semakin luas. Ikterus yang terjadi < 24 jam atau > 14 hari atau kuning sampai telapak kaki dan tangan adalah kondisi serius yang membutuhkan perawatan intensif.<sup>7,8,6</sup>

g. Kejang

Bayi yang mengalami kejang bisa ditandai dengan bayi melakukan gerakan yang tidak biasa, tremor

(gemetar), tiba-tiba menangis melengking, gerakan yang tidak terkendali, mulut bayi mecucu atau seluruh tubuh bayi kaku.<sup>3</sup>

- h. Tidak mau minum atau memuntahkan semua  
Bayi tidak bisa menghisap atau menelan ketika di beri minum atau disusui, dan semua cairan yang masuk akan keluar lagi.<sup>3</sup>
- i. Bayi lemas atau gerakan bayi berkurang, bergerak hanya jika dirangsang, merintih.<sup>8,3</sup>
- j. Nanah yang banyak di mata<sup>8</sup> (infeksi)
- k. Perubahan warna kulit menjadi kebiruan, kuning atau pucat<sup>3</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bidan dan Dosen Kebidanan Indonesia. Kebidanan, Teori Dan Asuhan : Volume I. Jakarta: EGC, 2020.
2. KEMENKES RI. Pegangan Fasilitator Kelas Ibu Hamil. Jakarta: KEMENKES RI, 2014.
3. KEMENKES RI. Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial, Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 2019; 202.
4. KEMENKES RI. Panduan Pelayanan Paska Persalinan Bagi Ibu Dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: KEMENKES RI, 2019.
5. KEMENKES RI. BUKU KIA KESEHATAN IBU DAN ANAK. Banyumas: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020.
6. Kementerian Kesehatan RI. Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Jakarta: KEMENKES RI, [http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/BUKU BAGAN MTBS 2019.pdf](http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/BUKU_BAGAN_MTBS_2019.pdf) (2019).
7. Simkin P, Whalley J, Keppler A. Panduan Lengkap Kehamilan, Melahirkan Dan Bayi: Edisi Revisi. Jakarta: Arcan, 2008.
8. KEMENKES RI, WHO. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar Dan Kesehatan Rujukan. Jakarta: Kemenkes RI, WHO, 2013.
9. Direktorat Kesehatan Keluarga. Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19, [http://www.kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Pedoman bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan BBL di Era Pandemi COVID 19.pdf](http://www.kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Pedoman%20bagi%20Ibu%20Hamil,%20Bersalin,%20Nifas%20dan%20BBL%20di%20Era%20Pandemi%20COVID%2019.pdf) (2020).
10. Setiyani A, Sukesu, Esyuananik. Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan : Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. Jakarta: Pusdiknakes,

- Badan PPSDM, KEMENKES, 2016.
11. Wiknjosastro GH. Ilmu kebidanan sarwono prawirohardjo. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
  12. Tim Pengampu Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita. Buku Panduan Praktik Laboratorium Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita. Banyumas: Prodi D III Kebidanan Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang, 2020.
  13. KEMENKES RI. Profil Kesehatan Indonesia 2018 Kemenkes RI. Jakarta: Kemnenkes RI, [http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-dan-Informasi\\_Profil-Kesehatan-Indonesia-2018.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-dan-Informasi_Profil-Kesehatan-Indonesia-2018.pdf) (2019).
  14. Nisman WA, Mera E M, Sandi A, et al. Panduan Pintar Ibu Menyusui. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011.
  15. Presiden RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Indonesia, 2012.
  16. KEMENKES RI. Pegangan Fasilitator Kelas Ibu Balita. Jakarta: KEMENKES RI, 2019.
  17. Astutik RY. Payudara Dan Laktasi. Jakarta: Penerbit Salemba Medika, 2017.
  18. Varney H, Kriebs JM, Gegor CL. Buku Ajar Asuhan Kebidanan (Varney's Midwifery): Volume 2, Edisi 4. Jakarta: EGC, 2007.
  19. Saifuddin AB, Adriaansz G, Wiknjosastro GH, et al. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal. Jakarta: PT BPSP, 2009.

## LAMPIRAN KUESIONER

### PENGETAHUAN TENTANG PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI

Nama ibu :  
Usia :  
Alamat :

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar!

1. Bayi baru lahir belum mampu mengatur suhu tubuh dan rentan mengalami...
  - a. Hipertermi
  - b. Hipotermi
  - c. Hipoglikemi
2. Bayi baru lahir boleh dimandikan setelah usia...
  - a. 2 jam
  - b. 6 jam
  - c. 12 jam
3. Suhu normal bayi baru lahir adalah...
  - a. 35,5 – 36,5 °C
  - b. 36,5 – 37,5 °C
  - c. 37,5 – 38,5 °C
4. Perawatan metode kanguru dilakukan pada...
  - a. Bayi kecil dengan berat < 2500 gram
  - b. Bayi besar dengan berat > 4000 gram
  - c. Bayi dengan cacat bawaan
5. Pada saat melaksanakan perawatan metode kanguru, bayi memakai...
  - a. Baju lengkap dengan topi
  - b. Tidak memakai baju
  - c. Popok dan topi
6. Posisi yang benar saat memasang popok bayi adalah...
  - a. Bagian atas popok terletak di atas tali pusat
  - b. Bagian atas popok terletak di bawah tali pusat

- c. Bagian atas popok terletak tepat pada tali pusat
7. Prinsip merawat tali pusat adalah...
- Bersih dan kering
  - Dibungkus dengan kassa
  - Menggunakan betadin atau alkohol
8. Apa yang dapat dilakukan jika menjumpai tali pusat bayi kotor...
- Cuci bersih dengan air dan sabun, lalu keringkan
  - Bersihkan dengan alkohol lalu keringkan
  - Bersihkan dengan betadin lalu keringkan
9. ASI eksklusif adalah memberikan ASI kepada bayi tanpa menambahkan makanan atau minuman lainnya selama...
- 4 bulan
  - 6 bulan
  - 2 tahun
10. Bagian payudara yang berwarna gelap melingkar disekitar puting susu disebut sebagai...
- Kalang payudara
  - Kalang puting susu
  - Saluran air susu
11. Salah satu manfaat ASI bagi bayi adalah...
- Mengurangi risiko kanker usus
  - Meningkatkan kecerdasan
  - Mempercepat penurunan berat badan
12. Salah satu manfaat ASI bagi ibu adalah...
- Mengurangi risiko kanker usus
  - Meningkatkan kecerdasan
  - Mempercepat penurunan berat badan
13. ASI yang mengandung banyak antibodi adalah...
- Kolostrum
  - ASI peralihan
  - ASI transisi
14. Posisi menyusui yang paling sering digunakan untuk menyusui bayi baru lahir adalah...

- a. Posisi berbaring miring
  - b. Posisi menggendong
  - c. Posisi menggendong menyilang
15. Bagian payudara yang harus masuk ke mulut bayi saat menyusui adalah
- a. Puting susu
  - b. Seluruh kalang payudara
  - c. Sebagian kalang payudara dan puting susu
16. Salah satu cara menyendawakan bayi adalah...
- a. Bayi di tidurkan terlentang di atas pangkuan ibu
  - b. Bayi di tidurkan tengkurap di atas pangkuan ibu
  - c. Bayi di gendong dengan kain
17. Frekuensi menyusui bayi yang benar adalah...
- a. Bayi harus disusui sesuai jadwal, yaitu setiap 2 jam
  - b. Bayi harus disusui sesuai jadwal, yaitu setiap 3 jam
  - c. Susui bayi tanpa jadwal
18. Salah satu tanda bayi mendapatkan cukup ASI adalah...
- a. Air kencing berwarna kuning pekat
  - b. Tinja masih encer
  - c. Warna kulit bayi kemerahan dan terasa kenyal
19. Salah satu cara memperbanyak ASI adalah..
- a. Susui bayi sesering mungkin
  - b. Pada awal setelah bersalin, jika ASI belum keluar dapat dibantu dengan memberikan susu formula dulu
  - c. Tidur di tempat terpisah dengan bayi
20. Salah satu cara mencegah terjadinya puting susu lecet adalah...
- a. Setiap mandi, cuci bersih payudara

- dengan sabun mandi
- b. Oleskan ASI pada puting susu sebelum dan setelah menyusui
  - c. Gunakan bra yang ketat
21. ASI perah dapat disimpan di freezer kulkas dua pintu, dan bertahan sampai...
- a. 2 bulan
  - b. 6 bulan
  - c. 9 bulan
22. Salah satu tanda bayi baru lahir sehat adalah...
- a. Menangis kuat dan kulit kebiruan
  - b. Menangis kuat dan kulit kekuningan
  - c. Menangis kuat dan kulit kemerahan
23. Berat normal bayi ketika lahir adalah...
- a. 2000 – 4000 gram
  - b. 2500 – 4000 gram
  - c. 3000 – 4000 gram
24. Bayi dikatakan hipertemi atau demam jika suhu tubuh...
- a.  $> 36,5^{\circ}\text{C}$
  - b.  $> 37,5^{\circ}\text{C}$
  - c.  $> 38,5^{\circ}\text{C}$
25. Salah satu tanda bahaya pada bayi adalah...
- a. Nafas cepat atau lambat
  - b. Warna kulit kemerahan
  - c. Posisi kaki dan tangan bayi menekuk

## KUNCI JAWABAN

- |       |       |
|-------|-------|
| 1. B  | 14. B |
| 2. B  | 15. C |
| 3. B  | 16. B |
| 4. A  | 17. C |
| 5. C  | 18. C |
| 6. B  | 19. A |
| 7. A  | 20. B |
| 8. A  | 21. B |
| 9. B  | 22. C |
| 10. A | 23. B |
| 11. B | 24. B |
| 12. C | 25. A |
| 13. A |       |

## LAMPIRAN BREASTFEEDING SELF EFFICACY SHORT FORM BSE-SF

Isilah tanda check (v) pada kolom yang sesuai dengan pernyataan yang tertulis!

No	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		Sangat tidak percaya diri	Tidak percaya diri	Netral	Percaya diri	Selalu percaya diri
1	Saya akan selalu bisa menemukan bahwa bayi saya mendapatkan cukup ASI					
2	Saya akan selalu berhasil dalam menyusui seperti halnya saya melaksanakan tugas-tugas menantang lainnya					
3	Saya akan selalu bisa menyusui bayi saya tanpa menggunakan susu formula sebagai tambahan					

No	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		Sangat tidak percaya diri	Tidak percaya diri	Netral	Percaya diri	Selalu percaya diri
4	Saya akan selalu bisa memastikan bahwa bayi saya melekat dengan benar pada payudara selama menyusui					
5	Saya akan selalu bisa mengelola situasi menyusui untuk kepuasan diri saya					
6	Saya akan selalu berhasil menyusui bahkan ketika bayi saya sedang menangis					
7	Saya akan selalu ingin untuk terus menyusui					
8	Saya akan selalu bisa menyusui dengan nyaman, dengan adanya anggota keluarga yang bersama saya					
9	Saya akan selalu puas dengan pengalaman menyusui saya					

No	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		Sangat tidak percaya diri	Tidak percaya diri	Netral	Percaya diri	Selalu percaya diri
10	Saya akan selalu bisa menerima fakta bahwa menyusui memakan waktu					
11	Saat menyusui, saya akan selalu mengosongkan satu payudara terlebih dahulu, sebelum beralih ke payudara lainnya					
12	Saya akan selalu bisa menyusui bayi saya setiap waktunya menyusui, secara berkelanjutan					
13	Saya akan selalu berhasil menyusui bayi saya setiap kali bayi saya ingin menyusui					
14	Saya akan selalu bisa memberitahu kapan bayi saya selesai menyusui					



Diterbitkan oleh:  
Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang  
Telp. 0247477208  
perustakaanpoltekkessmg@yahoo.com  
Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Jawa Tengah 50268

ISBN 978-623-6730-89-8



9 786236 730898