

Revizijska rinoplastika: izazov za kirurga, katastrofa za bolesnika

Marko Velimir Grgić, Mislav Knežević

Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milosrdnice

Adresa za dopisivanje: Marko Velimir Grgić, marko_grgic@yahoo.com

Uvod: Svaki bolesnik koji ide na operaciju nosa, upoznat je s mogućnošću potrebe sekundarnog zahvata, a vjerojatnost kojega prema literaturi iznosi između 5 i 15%. Planirane rekonstrukcije nosa u dva ili više akta su rijetke, tako da sekundarna rinoplastika najčešće upućuje na neuspjeh primarne operacije.

Bolesnici i metode: Analizirali smo vlastite rinoplastike u razdoblju od srpnja 2020. do siječnja 2021., kao i noviju literaturu vezanu uz učestalost i razloge za reviziju.

Rezultati: U promatranom razdoblju uočili smo porast udjela revizijskih rinoplastika među ukupnim operacijama nosa. Razlozi za reviziju u skladu su s razlozima opisanim u literaturi, a dijele se na funkcionalne i estetske.

Zaključak: Neovisno o uzrocima sekundarne rinoplastike, porast udjela sekundarne unutar svih rinoplastika predstavlja negativan trend. Smatramo da je bolje postavljanje indikacija i bolja informiranost bolesnika u pogledu očekivanja jedini način za smanjenje udjela revizijskih rinoplastika.

Ključne riječi: rinoplastika, revizija, indikacija