

*De plantis legionensibus. Notula XIV**

CARMEN PEREZ MORALES; LUIS HERRERO CEMBRANOS; MARTA E. GARCIA GONZALEZ; EMILIO PUENTE GARCIA & ANGEL PENAS MERINO

Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad de León

In Memoriam ad Amicus Andrés Molina

Resumen

PEREZ MORALES, C., HERRERO CEMBRANOS, L., GARCIA GONZALEZ, M.E., PUENTE GARCIA, E. & PENAS MERINO, A. 1993. De plantis Legionensibus. Notula XIV. *Bot. Complutensis* 18: 259-262

Se citan por primera vez para la flora leonesa los siguientes táxones: *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr., *Astragalus cymbicarpos* Brot., *Cistus crispus* L., *Diplotaxis muralis* (L.) DC., *Paronychia echinulata* Chater, *Ferula communis* L. subsp. *communis*, *Hypericum tomentosum* L., *Orlaya kochii* Heywood, *Orabanche sanguinea* C. Presl., *Trifolium suffocatum* L. y *Orchis papilionacea* L. Así mismo, se aportan datos corológicos de algunos otros táxones.

Palabras clave: Corología, León, España.

Summary

PEREZ MORALES, C., HERRERO CEMBRANOS, L., GARCIA GONZALEZ, M.E., PUENTE GARCIA, E. & PENAS MERINO, A. 1993. De plantis Legionensibus. Notula XIV. *Bot. Complutensis* 18: 259-262

The following taxa *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr., *Astragalus cymbicarpos* Brot., *Cistus crispus* L., *Diplotaxis muralis* (L.) DC., *Paronychia echinulata* Chater, *Ferula communis* L. subsp. *communis*, *Hypericum tomentosum* L., *Orlaya kochii* Heywood, *Orabanche sanguinea* C. Presl., *Trifolium suffocatum* L. and *Orchis papilionacea* L., are quoted for the first time for Leon's flora. So some another taxa corological data are given.

Key words: Chorology, León, Spain.

* Trabajo realizado con cargo al Proyecto de la CICYT NAT 90-0871-C03-01.

Esta nota florística aporta nuevos datos sobre la corología de algunos táxones que resultan de interés, bien por su rareza o bien por constituir novedad para la flora leonesa.

De cada uno de los táxones se indica, además de la localidad donde fue recolectado, la cuadrícula UTM de 10 x 10 y el número de pliego correspondiente al herbario LEB, así como el hábitat donde fue herborizado.

Chaetonychia cymosa (L.) Sweet, *Hort. Brit.* ed. 3: 263 (1839)

LEON: Marrablanca (Felechares de la Valdería) (29TQG47), 23-VI-1987, 860 m, en pastizales terofíticos agostantes de la clase *Isoeto-Nanojuncetea*, (LEB-34745), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

Del presente taxon, conocemos una única mención provincial (cf. PENAS, A., M.E. GARCÍA, L. HERRERO, M. GARZON & I. JIMÉNEZ *Anales Jard. Bot. Madrid* 43 (2): 437-439. 1987).

Paronychia echinulata A.O. Chater, *Feddes Repert. spec. nov. Regni Veg.* 69: 52 (1964)

LEON: Marrablanca (Felechares de la Valdería) (29TQG47), 23-VI-1987, 860 m, en pastizales terofíticos agostantes de la clase *Isoeto-Nanojuncetea* (LEB-39264), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero; MONTE DEL DUQUE (Valderas) (30TTM96), 22-VI-1988, 780 m, en claro de encinar de la *Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae* (LEB-44565). Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

S. CASTROVIEJO & al. (edit.), *Flora Ibérica* II: 108-109 (1990), no mencionan para la provincia de León este taxon que resulta ser novedad provincial en base a la bibliografía consultada.

Diplotaxis muralis (L.) DC., *Reg. Veg. Syst. Nat.* 2: 631 (1821)

LEON: Matallana de Valmadrigal (30TUM09), 2-VI-1983, 815 m, en comunidades nitrófilas de la clase *Ruderali-Secalietae*, (LEB-44563); Castrovega de Valmadrigal (30TUM18), 2-VI-1983, a 800 m, en idéntico hábitat al indicado anteriormente (LEB-44562), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

No se conocen menciones del presente taxon a nivel provincial según la bibliografía consultada.

Sedum telephium L. subsp. **fabaria** (Koch) Firschleger, *Fl. Alsace* 1: 284 (1852)

LEON: Vega de Almanza (30TUN33), 5-VIII-1989, 950 m, en borde de carretera, (LEB-44559), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

Taxon de carácter eminentemente ruderal del que se conoce otra mención provincial de Puebla de Lillo (cf. HERNANDEZ HERNANDEZ, E., *Acta Bot. Malac.*, 10: 46. 1985).

Astragalus cymbicarpos Brot., *Phyt. Lusit.* 63 (1800)

LEON: La Nora (30TTM67), 14-V-1987, 760 m, en pastizales terofíticos de la clase *Tube-rarietea guttatae*, desarrollados en claros de un encinar de la *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae* (LEB-34712), Leg.: A. Penas, E. Puente, M.E. García & L. Herrero.

Este taxon se conocía de algunas provincias próximas como Avila y Salamanca (cf. SANCHEZ SANCHEZ, J. *Trab. Dep. Bot. Salamanca* 9: 50-62. 1980 y RICO HERNANDEZ, E., *Anales Jard. Bot. Madrid* 41 (2): 407-423. 1985). Nuestra aportación constituye novedad provincial.

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. **longiestipulatus** Laínz, *Bol. Inst. Est. Ast., Ser C.*, 3: 166 (1961)

LEON: La Mata del Moral (Villalquite) (30TUN11), 7-VII-1988, 850 m, en comunidades pertenecientes a la clase *Molinio-Arrhenatheretea*, (LEB-44573). Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

Del presente taxon se conocía una única mención hasta el momento (cf. LLAMAS F. & J. ANDRES, *Studia Bot.* 4: 143-146. 1985).

Trifolium suffocatum L., *Mantissa Alt.* 276 (1771)

LEON: Dehesa de Mayorga (30TUM08), 7-VI-1988, 820 m, en comunidades terofíticas de la clase *Tuberarietea guttatae*, (LEB-44576), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

Nuestra cita es la primera a nivel provincial de este taxon, que convivía con *Trifolium squamosum* L., *Amen. Acad.* 4: 105 (1759), que fue recolectado en la misma fecha y lugar (LEB-44574). De este último sólo se conocía hasta el momento una única localidad para la provincia (cf. A. PENAS, *Lagascalia* 13 (1): 3-16. 1984).

Hypericum tomentosum, L. *Sp. Pl.* 786 (1753)

LEON: La Mata del Moral (Villalquite) (30TUNI1), 7-VII-1988, 850m, en praderas pertenecientes a la clase *Molinio-Arrhenatheretea*, (LEB-44577), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

Nuestra cita supone una novedad provincial para el presente taxon, del que conocemos menciones para las provincias de Valladolid y Palencia (cf. FERNANDEZ DIEZ, *Studia Bot.* 3: 255-262. 1984 y LAINZ M., *Collect. Bot.* 4 (1): 82-123. 1954).

Cistus crispus L., *Sp. Pl.* 524 (1753)

LEON: Estébanez de la Calzada (30TTN50), 6-VI-1987, 860 m, en cantueso-aulagares del *Lavandulo-Genistetum hystricis*, (LEB-34885), Leg.: A. Penas, M.J. López, M.E. García & L. Herrero.

Especie de distribución meridional ibérica, que supone novedad para la flora leonesa y ampliación de su área conocida, constituyendo nuestra mención la más noroccidental de la Península Ibérica.

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr., *Bull. Soc. Sci. Dauph.* 61: 628 (1947)

LEON: Dehesa de Mayorga (30TUM08), 7-VI-1988, 820 m, en comunidades de *Geranio-Anthriscion* (LEB-44564), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

Nuestra cita constituye novedad provincial, siendo conocido este taxon de las vecinas provincias de Palencia (cf. LEROY, E. & M. LAINZ, *Collet. Bot.* 4 (1): 82-123. 1954), Valladolid (cf. FERNANDEZ DIEZ, F.J., *Studia Bot.* 3: 255-262. 1984), Zamora (cf. GIRALDEZ, X., *Collect. Bot.* 17 (1): 107-111. 1987) y Burgos (cf. LOSA, M., *I. Congres. Hisp. -Port. Farm. Madrid:* 557-561. 1950).

Ferula communis L., *Sp. Pl.* 246 (1753) subsp. **communis**

LEON: Presa del Pantano de Bárcena (29TQH01), 14-VI-1991, 650 m, formando parte de comunidades ruderal-viarias incluíbles en la clase *Ruderali-Secalietae*, (LEB-44570), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero y Presa del Pantano de Peñarrubia (29TPH70), 18-VII-1989 en idénticas condiciones ecológicas, (LEB-44566), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

Hasta el momento no había sido citado este taxon de la provincia de León, por lo que resulta ser novedad para el catálogo florístico provincial.

Orlaya kochii Heywood, *Agron. Lusit.* 22: 13 (1961)

LEON: Peñarrubia (29TPH70), 15-V-1988, 400 m, en pastizales terofíticos de la clase *Tuberarietea guttatae*, (LEB-44567), Leg.: A. Penas, E. Puente, M.E. García & L. Herrero.

Este taxon no había sido citado hasta la actualidad por lo que constituye novedad para el catálogo florístico provincial.

Orbanche sanguinea C. Presl., *Del. Prag.* 71 (1822)

LEON: Peñarrubia (29TPH70), 15-V-1988, (LEB-44581), 410 m, Leg.: A. Penas, E. Puente, M.E. García & L. Herrero.

Es novedad provincial teniendo en cuenta la bibliografía consultada.

Crepis foetida L., *Sp. Pl.* 807 (1753) subsp. **foetida**

LEON: Campus Universitario de Vegazana (30TTN81), 8-VII-1983, 841 m, en comunidades ruderal-viarias de la clase *Ruderali-Secalietae*, (LEB-44579), Leg.: A. Penas.

Este taxon ha sido citado de la provincia de León con anterioridad por LANGE (cf. WILLKOMM & LANGE, *Prodromus Florae Hispanicae* II: 246. 1870), en Villafranca del Bierzo, y por el mismo autor de la vecina provincia de Zamora. Se conoce también de las provincias de Palencia y Burgos.

Orchis papilionacea L., *Syst. Nat.* ed. 10,2: 1242 (1759)

LEON: Mellanzos (30TUN01), 12-V-1987, 900 m, en comunidades de *Molinio-Arrhenatheretea*, (LEB-39267), Leg.: E. Puente; La Mata del Moral (Villalquite) (30TUN11), 3-VI-1988, 850 m, en idénticas condiciones a las indicadas anteriormente, (LEB-44569), Leg.: A. Penas, M.E. García & L. Herrero.

No se conocen menciones provinciales del presente taxon, si bien ha sido citado de la comarca de La Liébana (Santander) (cf. AMO Y MORA, *Flora fanerogámica de la Península Ibérica* 1: 440. 1871).

Recibido 20 de enero de 1992

Aceptado 7 de abril de 1992