

УДК 511

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕТНЫХ ЧИСЕЛ ФОРМАМИ ВАТСОНА¹

канд. физ.-мат. наук **Н.В. БУДАРИНА**,
(Владимирский государственный педагогический университет, Россия);
канд. физ.-мат. наук **О.С. КУКСО**
(Институт математики НАН Беларуси, Минск)

В 1916 году Рамануджан обобщил результат Лагранжа, доказав, что существует 54 положительно определенных кватернарных диагональных квадратичных форм, которые представляют все положительные числа. Диксон назвал такие формы универсальными и далее обобщил результат для недиагонального случая. Позднее Вилердинг в 1948 году доказала существование 168 классически целочисленных универсальных кватернарных форм. Этот список форм был откорректирован и дополнен до 204 таких форм в 2000 году Конвеем, Шнебергером и Бхаргава [1]. Ватсон нашел все четные одно-классные кватернарные квадратичные формы Q с ограничением: если p^2 делит определитель $|Q|$ и если $p^{-2}|Q| \equiv 0$ или $p^{-2}|Q| \equiv 1 \pmod{4}$, Q эквивалентна над \mathbf{Z}_p прямой сумме $Q_1 \oplus pQ_p$ бинарных форм Q_1 и Q_p . Список Ватсона содержит 27 таких форм Q . В данной работе найдены четные примитивно универсальные формы и почти универсальные формы из списка Ватсона.

Введение. Вопрос о представимости одной квадратичной формы другой формой возвращает нас к началу современной теории чисел: например, теорема Лагранжа о сумме четырех квадратов утверждает, что квадратичная форма $x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ представляет все положительные числа.

На сегодня можем обозначить как минимум 5 направлений, в которых развивается задача универсальности:

- 1) примитивная универсальность;
- 2) m -универсальные формы;
- 3) универсальность над вещественными числовыми полями;
- 4) почти универсальность;
- 5) четная/нечетная/.../ универсальность.

Положительно определенная целочисленная форма Q называется (примитивно) m -универсальной, если она (примитивно) представляет все целочисленные формы ранга m . Если форма Q (примитивно) представляет все целочисленные формы ранга m за исключением конечного числа форм, то такая форма называется (примитивно) почти m -универсальной.

С универсальными формами тесно связаны так называемые регулярные формы. Квадратичная форма Q называется m -регулярной, если она представляет над \mathbf{Z} каждую форму ранга m , которая представляется ею над всеми кольцами \mathbf{Z}_p . Каждая m -универсальная форма является m -регулярной формой.

Каждая квадратичная форма удовлетворяет локально-глобальному принципу над \mathbf{Z} с некоторыми условиями. В 2008 году Елленберг и Венкатеш в [2] доказали что, если минимальное положительное целое число, которое представляется формой A , является достаточно большим и $\text{rank}(Q) \geq \text{rank}(A) + 7$, то A представляется Q над \mathbf{Z} тогда и только тогда, когда A представляется Q над \mathbf{Z}_p для каждого простого p .

В работе [3] Ох доказал, что каждая (четная) n -регулярная форма является (четной) m -универсальной для каждого целого $m \geq 27$, т.е. представляет все (четные, соответственно) формы ранга m .

Ватсон нашел все четные одноклассные $h(Q) = 1$ кватернарные квадратичные формы Q с ограничением [4]: если p^2 делит определитель $|Q|$ и если $p^{-2}|Q| \equiv 0$ или $p^{-2}|Q| \equiv 1 \pmod{4}$, то Q эквивалентна над \mathbf{Z}_p прямой сумме $Q_1 \oplus pQ_p$ бинарных форм Q_1 и Q_p . Список Ватсона содержит 27 таких форм Q (таблица).

Список Ватсона

$Q_4: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	$2_{Q_4} = 1_{II,0}^2 2_{II,0}^2,$	$Q_5: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	$2_{Q_5} = 1_{II,0}^4, \quad 5_{Q_5} = 1^{+3} 5^{+1},$
$Q_8: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	$2_{Q_8} = 1_{II,0}^2 2_{I,1}^1 4_{I,3}^{-1},$	$Q_9: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	$2_{Q_9} = 1_{II,0}^4, \quad 3_{Q_9} = 1^{+2} 3^{+2},$

¹ При поддержке исследовательского проекта ИНТАС 03-51-5070.

$Q_{12}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{12}^1} = 1_{II,0}^{-2} 2_{I,2}^{+2}, \quad 3_{Q_{12}^1} = 1^{+3} 3^{+1},$	$Q_{12}^2: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{12}^2} = 1_{II,0}^{-2} 2_{I,2}^{+2}, \quad 3_{Q_{12}^2} = 1^{-3} 3^{-1},$
$Q_{13}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{13}^1} = 1_{II,0}^{-4}, \quad 13_{Q_{13}^1} = 1^{+3} 13^{+1},$	$Q_{17}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{17}^1} = 1_{II,0}^{+4}, \quad 17_{Q_{17}^1} = 1^{-3} 17^{-1},$
$Q_{20}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{20}^1} = 1_{II,0}^{-2} 2_{II,0}^{+2}, \quad 5_{Q_{20}^1} = 1^{+3} 5^{+1},$	$Q_{20}^2: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{20}^2} = 1_{II,0}^{+2} 2_{II,0}^{-2}, \quad 5_{Q_{20}^2} = 1^{-3} 5^{-1},$
$Q_{21}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{21}^1} = 1_{II,0}^{-4}, \quad 3_{Q_{21}^1} = 1^{+3} 3^{+1}, \quad 7_{Q_{21}^1} = 1^{+3} 7^{-1},$	$Q_{21}^2: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{21}^2} = 1_{II,0}^{-4}, \quad 3_{Q_{21}^2} = 1^{-3} 3^{-1}, \quad 7_{Q_{21}^2} = 1^{-3} 7^{+1},$
$Q_{24}^1: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{24}^1} = 1_{II,0}^{+2} 2_{I,1}^{+1} 4_{I,5}^{-1}, \quad 3_{Q_{24}^1} = 1^{-3} 3^{+1},$	$Q_{25}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{25}^1} = 1_{II,0}^{+4}, \quad 5_{Q_{25}^1} = 1^{-2} 5^{-2},$
$Q_{28}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{28}^1} = 1_{II,0}^{-2} 2_{I,2}^{-2}, \quad 7_{Q_{28}^1} = 1^{-3} 7^{-1},$	$Q_{33}^1: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{33}^1} = 1_{II,0}^{+4}, \quad 3_{Q_{33}^1} = 1^{-3} 3^{+1}, \quad 11_{Q_{33}^1} = 1^{+3} 11^{+1},$
$Q_{36}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{36}^1} = 1_{II,0}^{-2} 2_{II,0}^{+2}, \quad 3_{Q_{36}^1} = 1^{-2} 3^{-2},$	$Q_{36}^2: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{36}^2} = 1_{II,0}^{+2} 2_{II,0}^{+2}, \quad 3_{Q_{36}^2} = 1^{+2} 3^{+2},$
$Q_{45}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{45}^1} = 1_{II,0}^{-4}, \quad 3_{Q_{45}^1} = 1^{+2} 3^{-2}, \quad 5_{Q_{45}^1} = 1^{+3} 5^{+1},$	$Q_{45}^2: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{45}^2} = 1_{II,0}^{-4}, \quad 3_{Q_{45}^2} = 1^{-2} 3^{+2}, \quad 5_{Q_{45}^2} = 1^{-3} 5^{-1},$
$Q_{49}^1: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{49}^1} = 1_{II,0}^{+4}, \quad 7_{Q_{49}^1} = 1^{+2} 7^{+2},$	$Q_{60}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{60}^1} = 1_{II,0}^{+2} 2_{I,6}^{+2}, \quad 3_{Q_{60}^1} = 1^{-3} 3^{+1}, \quad 5_{Q_{60}^1} = 1^{+3} 5^{-1},$
$Q_{69}^1: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{69}^1} = 1_{II,0}^{-4}, \quad 3_{Q_{69}^1} = 1^{-3} 3^{+1}, \quad 23_{Q_{69}^1} = 1^{-3} 23^{-1},$	
$Q_{100}^1: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{100}^1} = 1_{II,0}^{-2} 2_{II,0}^{-2}, \quad 5_{Q_{100}^1} = 1^{+2} 5^{+2},$	$Q_{100}^2: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{100}^2} = 1_{II,0}^{+2} 2_{II,0}^{+2}, \quad 5_{Q_{100}^2} = 1^{-2} 5^{-2},$
$Q_{169}^1: \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{169}^1} = 1_{II,0}^{+4}, \quad 13_{Q_{169}^1} = 1^{-2} 13^{-2},$	$Q_{484}^1: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 12 \end{pmatrix} \quad 2_{Q_{484}^1} = 1_{II,0}^{-2} 2_{II,0}^{-2}, \quad 11_{Q_{484}^1} = 1^{-2} 11^{-2}$

ТЕОРЕМА 1. *Формы $Q_5, Q_{13}, Q_{17}, Q_{20}^1, Q_{20}^2, Q_{21}^1, Q_{21}^2, Q_{24}, Q_{33}, Q_{45}^1, Q_{45}^2, Q_{60}, Q_{69}$ из списка Ватсона являются четными примитивно универсальными формами. Формы $Q_9, Q_{25}, Q_{36}^2, Q_{49}, Q_{100}^2, Q_{169}$ не являются четными примитивно почти универсальными формами.*

Относительно форм $Q_4, Q_8, Q_{12}^1, Q_{12}^2, Q_{28}, Q_{36}, Q_{100}^1, Q_{484}$ можно только сказать, что они примитивно представляют все положительные числа над нечетными кольцами Z_p , и вопрос об их четной (примитивной) универсальности сводится к рассмотрению над кольцом Z_2 .

Задача о представлениях квадратичными формами над кольцом целых чисел Z сводится к локальным задачам над кольцами целых p -адических чисел Z_p . В силу того, что формы Ватсона одноклассные, то локально-глобальный принцип дает следующий результат: представление формы A формой Q над Z существует тогда и только тогда, когда существуют представления формы A над всеми Z_p и R .

Условие представимости положительно определенной формой Q над R означает, что представляемая форма A должна быть положительно определенной.

Следует различать случаи нечетного p и $p = 2$. Квадратичные формы над Z_2 имеют дополнительные локальные инварианты (см. [5]), и это одна из причин существенно более сложного поведения таких форм. Предложения 1 – 2 и предложение 3 посвящены представимости форм над нечетным кольцом Z_p и Z_2 соответственно.

Если не существует представления формы A формой Q хотя бы над одним кольцом Z_p , то этого достаточно, чтобы утверждать, что форма Q не является почти универсальной (предложение 1).

Формы Ватсона и их локальные инварианты см. таблицу.

Докажем следующие предложения, из которых вытекает теорема.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. *Пусть форма Q имеет над нечетным кольцом Z_p жорданово разложение*

$$Q = Q_1 \oplus pQ_q, \tag{1}$$

с невырожденными блоками $|Q_1|, |Q_p| \not\equiv 0 \pmod{p}$, размерностей $\dim Q_1 = \dim Q_p = 2$.

Если выполняются следующие условия для знаков блоков Q_1 и Q_p

$$\varepsilon_1 Q = \begin{pmatrix} -1 \\ p \end{pmatrix} \text{ или } \varepsilon_p Q = \begin{pmatrix} -1 \\ p \end{pmatrix}, \tag{2}$$

то Q примитивно представляет все положительные числа над всеми нечетными кольцами Z_p .

Если

$$\varepsilon_1 Q = \varepsilon_p Q = -\begin{pmatrix} -1 \\ p \end{pmatrix}, \tag{3}$$

то форма Q представляет примитивно над Z числа вида $A = p^v A_p, v \geq 2$.

Доказательство. Будем рассматривать кольцо целых p -адических чисел Z_p . Пусть Q и A – целые симметрические невырожденные матрицы размеров $v > m \geq 1$ $|Q| = \det Q$ и $|A| = \det A$. Отождествим матрицы Q, A с определяемыми ими квадратичными формами. Форма A примитивно представима формой Q , если существует целая $(n \times m)$ -матрица X с условием:

$$Q X = {}^t X Q X = A,$$

при этом X примитивна, т.е. наибольший общий делитель ее миноров порядка m равен единице кольца Z_p . Существование примитивного представления равносильно эквивалентности формы Q относительно унимодулярной группы $GL_n(Z_p)$ целой форме:

$$Q_G^A C = \begin{pmatrix} A & C \\ {}^t C & \frac{1}{a} E C + G \end{pmatrix}, \tag{4}$$

где G – целая симметрическая невырожденная матрица порядка $n - m > 0$ и определителя $|G| = a^{n-m} |Q|/|A|$. Здесь a – степень формы A , т.е. ненулевое целое число, для которого целой будет матрица $E = aA^{-1}$. Сцепляющая матрица $C \in M_{m, n-m}(Z_p)$ содержится во множестве решения сравнения:

$$E C \equiv -G \pmod{a}. \tag{5}$$

I. Далее пусть p – простое нечетное число. Рассмотрим представления одномерных форм $A = p^v A_{p^v}$, $v \geq 0$, формами Q .

Вначале исследуем случаи, когда $v \geq 1$. Пусть $G = \bigoplus_{\alpha} G_{\alpha}$ с блоками $G_{\alpha} = p^{\alpha} G_{p^{\alpha}}$ размеров $k_{\alpha} = \dim G_{\alpha}$, $\alpha = 0, 1, 2, \dots$, и с определителями $|G_{p^{\alpha}}|$ из группы единиц \mathbf{Z}_p^{\times} . Разобьем сцепляющие векторы $C = (C_0 | \dots | C_{\alpha} | \dots)$ соответственно на блоки C_{α} длины k_{α} .

Согласно (5) имеем $E C_0 \equiv -G_0 \pmod{p^v}$ для $v \geq 1$. Поэтому можем взять $k_0 = 0$ или $k_0 = 1$ и $E \sim_p -G_0$, где \sim_p обозначает эквивалентность по модулю квадратов единиц $(\mathbf{Z}_p^{\times})^2$.

Если $k_0 = 0$, то можем взять $C = (0 | \dots | 0)$ и согласно (4) получим:

$$Q_G^A C = A \oplus \frac{1}{p^v} G, \quad G = \bigoplus_{\alpha \geq v} G_{\alpha}. \quad (6)$$

В случае $k_0 = 0$ и $v > 1$ существуют и другие ненулевые сцепляющие векторы C (см. [6]), но мы здесь ограничимся рассмотрением только тех сцепляющих векторов C , которые являются общими для всех показателей $v \geq 1$.

Если же $k_0 = 1$, то в силу (5) получим, что $k_1 = \dots = k_{v-1} = 0$. Согласно (4) сцепляющий вектор $C = (C_0 | 0 | \dots | 0)$ дает форму:

$$Q_G^A C = \begin{pmatrix} A & C_0 \\ C_0 & 0 \end{pmatrix} \oplus \frac{1}{p^v} G_{\neq 0} \sim_p J A \oplus \frac{1}{p^v} G_{\neq 0}, \quad (7)$$

где в $G_{\neq 0}$ исключен блок G_0 и $J A = \begin{pmatrix} A & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ – гиперболическая форма размерности 2.

Таким образом, существует два типа так называемых минимальных неразложимых представлении формы A формой Q :

$$p^v \cdot \varepsilon \rightarrow p^v \cdot \varepsilon, \quad (8)$$

$$p^v \cdot \varepsilon \rightarrow J p^v \cdot \varepsilon = \begin{pmatrix} p^v \cdot \varepsilon & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (9)$$

размерностей 1 и 2 соответственно. Здесь ε – единица кольца \mathbf{Z}_p и $v \geq 1$.

Рассмотрим оставшийся случай, когда $A = A_1$, $|A_1| \not\equiv 0 \pmod{p}$, $\dim A = 1$. В этом случае форма $A \in GL_1(\mathbf{Z}_p)$ отщепляется от формы $Q_G^A C \sim_p A \oplus G$. Поэтому получаем следующее минимальное неразложимое представление формы A формой Q :

$$\varepsilon \rightarrow \varepsilon, \quad \varepsilon \in \mathbf{Z}_p^{\times}, \quad (10)$$

размерности 1.

II. Рассмотрим формы со следующим жордановым разложением над нечетным кольцом \mathbf{Z}_p :

$$Q = Q_1 \oplus p Q_2, \quad \dim Q_1 = \dim Q_2 = 2. \quad (11)$$

Пусть p – нечетное простое число, не делящее $|Q|$. Тогда существуют представления (9) и (10), и форма $A = p^v A_{p^v}$, $v \geq 0$, примитивно представима над \mathbf{Z}_p формой Q только в том случае, если выполняется не-

равенство $J_A \leq Q$. Здесь $J_A = \begin{cases} A, & \text{если } v = 0, \\ J(A), & \text{если } v \geq 1 \end{cases}$. Квадратичные формы X и Y удовлетворяют неравенству Y

$\leq X$, если $X \sim_p Y \oplus Z$ для некоторой формы Z . Поэтому условие $Y \leq X$ равносильно существованию разности форм $X(-) - Y$. В данном случае вычисление форм $Q(-) - J_A$ сводится к следующим формулам вычитания p -адических символов:

$$I^{\varepsilon_1 Q^4}(-) I^{\varepsilon_1 A^1} = I^{\varepsilon_1 Q^4 \varepsilon_1 A^3}, \quad \text{если } v = 0,$$

$$I^{\varepsilon_1 Q^4}(-) I^{\frac{-1}{3} \cdot 2} = I^{\varepsilon_1 Q^4 \frac{-1}{3} \cdot 2}, \quad \text{если } v \geq 1.$$

Соответствующие p -адические символы справа всегда существуют (см. [5]). Следовательно, квадратичная форма Q примитивно представляет все числа над нечетными кольцами \mathbf{Z}_p , $p \nmid |Q|$.

Пусть p – нечетное простое число, делящее $|Q|$. Тогда существуют все три типа представления (8) – (10). Минимальные представления форм $A = p^v A_{p^v}$, $v \geq 1$, дает возможность построить два вида форм Q с заданным Жордановым разложением (11):

$$Q' = \begin{pmatrix} p^v A_{p^v} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \oplus pQ_p = J \begin{pmatrix} p^v A_{p^v} & \\ & pQ_p \end{pmatrix} \oplus pQ_p, \tag{12}$$

$$Q'' = \begin{cases} Q_1 \oplus p \begin{pmatrix} p^{v-1} A_{p^v} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = Q_1 \oplus pJ \begin{pmatrix} p^{v-1} A_{p^v} & \\ & pQ_p \end{pmatrix}, v \geq 2, \\ Q_1 \oplus pA_p \oplus p \begin{pmatrix} Q_p & \\ & (-)A_p \end{pmatrix}, v = 1. \end{cases}$$

Форма Q' существует, если $\varepsilon_1 Q' = \begin{pmatrix} -1 \\ p \end{pmatrix}$, где $\frac{*}{p}$ – символ Лежандра. Форма Q'' для $v \geq 2$ существует при условии, что $\varepsilon_p Q'' = \begin{pmatrix} -1 \\ p \end{pmatrix}$, а для $v = 1$ существует всегда.

Используя минимальное представление (10) получаем, что форма $A=A_1$ примитивно представляется обеими формами Q' и Q'' .

Если знаки блоков формы Q (11) соответствуют условию (2), т.е. p -адические символы формы Q равны $1 \frac{-1}{p} p^{\varepsilon_p Q^2}$ или $1 \frac{-1}{p} p^{\varepsilon_p Q^2}$ (см. [5]), то Q примитивно представляет все числа над всеми нечетными кольцами \mathbf{Z}_p .

Форма Q (11), у которой знаки блоков Q_1 и Q_p удовлетворяют условию (3) (т.е. $p_Q = 1 \frac{(-1)}{p} p^{-\frac{1}{p} Q^2}$) не могут примитивно представлять одномерные формы $A = p^v A_{p^v}$, $v \geq 2$, над нечетным кольцом \mathbf{Z}_p , $p \mid |Q|$, а следовательно, и над \mathbf{Z} .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. Пусть положительно определенная кватернарная квадратичная форма Q имеет жорданово разложение

$$Q = Q_1 \oplus Q_p, \dim Q_1 \geq 3, \tag{13}$$

над нечетным кольцом \mathbf{Z}_p , ($p \mid |Q|$). Тогда форма Q примитивно представляет все положительные числа A над всеми нечетными кольцами \mathbf{Z}_p .

Доказательство этого предложения можно найти в [7].

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. Положительно определенная кватернарная квадратичная форма Q , имеющая следующий 2-адический символ:

$$1_{II}^{+4}, 1_{II}^{-4} \text{ или } 2^{\beta} \prod_{g}^{+2} g_{\xi_g Q^2}^{\varepsilon_g Q^2} \text{ для } \beta \geq 0, g = 2^{\gamma}, \gamma = 0, 1, 2, \dots,$$

примитивно представляет все четные числа над кольцом \mathbf{Z}_2 .

Доказательство. Рассмотрим представление формы A формой Q над четным кольцом \mathbf{Z}_2 .

Формы Ватсона являются четными (т.е. имеют четную диагональ), поэтому они могут представлять только четные числа над \mathbf{Z} .

Вначале, пусть определитель формы Q будет нечетным и $a = 2^{\alpha}$ – степень формы A . Для четных форм Q с точностью до эквивалентности над $GL(\mathbf{Z}_2)$ имеет место матричное сравнение (5) с дополнительным условием сравнимости диагоналей форм по mod $2a$.

Рассмотрим нетривиальный одномерный случай $A = qA_q$, $\dim A_q = 1$, со степенью $a = q = 2^{\alpha}$, $\alpha \geq 1$ [8]. Сравнения (5) налагают на форму G следующие ограничения:

$$G = G_1 \oplus qG_q, \dim G_1 = 1, G_1 \equiv -A_q \pmod{q}. \tag{14}$$

В качестве сцепляющих векторов C можно выбрать следующие $C = (C_1|0\dots|0)$, где C_1 удовлетворяет условию $C_1^2 \equiv 1 \pmod{q}$ и

$$C_1 = \begin{cases} 1, \text{ если } \alpha = 1, \\ \pm 1, \text{ если } \alpha = 2, \\ \pm 1, \pm(1+2^{\alpha-1}), \text{ если } \alpha \geq 3. \end{cases}$$

В силу (4) имеем разложение

$$Q = J(qA_q) \oplus G_q, \quad (15)$$

где с точностью до эквивалентности

$$J(qA_q) = \begin{cases} \left(\begin{array}{cc} qA_q & 1 \\ 1 & (A_q + G_1)/q \end{array} \right) \text{ для } \alpha = 1, 2, \\ \left(\begin{array}{cc} qA_q & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \right)_I, \left(\begin{array}{cc} qA_q & 1+q/2 \\ 1+q/2 & A_q(1+q/4) \end{array} \right)_I \text{ для } \alpha \geq 3. \end{cases} \quad (16)$$

Следовательно, $J(qA_q)$ задают минимальные неразложимые представления одномерных форм $A = qA_q$. Прямым вычислением можно найти все инварианты форм $J = J(qA_q)$, используя локальные инварианты форм A и G_1 . Учитывая условия существования 2-адических символов (см. [5]), получим:

$$2_J = \begin{cases} 1_{II}^{+2}, 1_{II}^{-2} \text{ для } \alpha = 1; \\ 1_{II}^{+2}, 1_{I,4}^{-2} \text{ для } \alpha = 2; \\ 1_{II}^{+2}, 1_{I,0}^{-2} \text{ для } \alpha \geq 3. \end{cases} \quad (17)$$

Для форм Q со следующими 2-инвариантами 1_{II}^{+4} или 1_{II}^{-4} в работе [7] было доказано, что они представляют все четные числа над \mathbf{Z}_2 .

Если определители форм A и Q – четные, то ситуация усложняется.

Но минимальные представления (16) в случае нечетного определителя $|Q|$, дают возможность построить некоторые формы четного определителя, которые представляют все четные числа над \mathbf{Z}_2 . Из (17) следует, что форма J_1 с 2-адическим символом 1_{II}^{+2} представляет все одномерные формы $A = qA_q$, $q = 2^\alpha$, $\alpha \geq 1$, над \mathbf{Z}_2 . Следовательно, формы Q с жордановым разложением над \mathbf{Z}_2 :

$$Q^{III} = J_1 \oplus \sum_g g Q_g,$$

$$Q^{IV} = 2^\beta J_1 \oplus \sum_g g Q_g, \beta \geq 1, g = 2^\gamma, \gamma = 0, 1, 2, \dots,$$

содержащие блок J_1 , будут представлять все четные числа над \mathbf{Z}_2 .

ЛИТЕРАТУРА

1. Bhargava, M. On the Conway-Schneeberger Fifteen Theorem / M. Bhargava // Contemp. Math., amer. Math. Soc. Providence, RI, 2000. – № 272. – P. 27 – 37.
2. Ellenberg, J. Local-global principles for representations of quadratic forms / J. Ellenberg, A. Venkatesh // Invent. math. – 2008. – N. 171. – P. 257 – 279.
3. Oh, В.-К. Positive definite n -regular quadratic forms / В.-К. Oh // Invent. math. – 2007. – № 170. – P. 421 – 453.
4. Watson, G. One-class genera of positive quaternary quadratic forms / G. Watson // Acta Arithmetica. – 1974. – Vol. 24. – P. 461 – 475.
5. Конвей, Д. Упаковки шаров, решетки и группы / Д. Конвей, Н. Цлоен. – М.: Мир, 1982.
6. Журавлев, В.Г. Орбиты представления чисел локальными квадратичными формами / В.Г. Журавлев // Тр. МИРАН. – 1997. – Т. 218. – С. 151 – 164.
7. Budarina, N.V. On primitive universal quadratic forms / N.V. Budarina (submitted).
8. Журавлев, В.Г. Деформации квадратичных диофантовых систем / В.Г. Журавлев // Изв. РАН. Сер. матем. – 2001. – Т. 65, № 6. – С. 15 – 56.

Поступила 24.09.2008