

Descriptions d'Elaterides nouveaux des Iles Philippines, provenant des collections de la "Experiment Station of the Hawaiian Sugar Planters' Association"

PAR E. FLEUTIAUX.

(Presented by R. H. Van Zwaluwenburg at the meeting of Sept. 3, 1931)

Anchastus philippinensis nov. sp.

Long. 8 m/m $\frac{1}{2}$ —Allongé, elliptique, convexe; testacé brillant; pubescence jaune. Tête régulièrement convexe, ponctuée; bord antérieur arrondi. Antennes testacées, ne dépassant pas la base du prothorax; 3e article plus long que le 4e. Pronotum aussi long que large, arrondi latéralement et rétréci en avant, convexe; ponctuation peu serrée; angles postérieurs fortement et obliquement carénés. Elytres arrondis et atténués, finement pointillés, légèrement striés-ponctués; interstries plans. Dessous et pattes plus pâles.

Iles Philippines: Mont Makiling, Laguna, avril 1931 (F. C. Hadden).

Plus grand et plus étroit que *A. nitidus* Candèze; ponctuation du pronotum plus forte et plus dense; stries des élytres moins marquées; 3e article des antennes plus long que le 4e.

Megapenthes frontalis nov. sp.

Long. 6 m/m.—Allongé, peu convexe; pubescence jaune très légère. Tête noire, jaunâtre en avant, déprimée, carénée au milieu; bord antérieur arrondi et rebordé; ponctuation ombiliquée et rugueuse. Antennes dépassant la base du prothorax, serriformes, avec les 2e et 3e articles courts, globuleux; noires, les trois premiers articles jaunes. Pronotum noir, jaune à la base, plus long que large, graduellement rétréci en avant, peu convexe, ponctuation ombiliquée, serrée; angles postérieures grands, aigus, dirigés en arrière, bicarénés, la carène externe longue. Ecusson noir, triangulaire, fortement ponctué. Elytres noirs, jaunes à la base, entiers au sommet, rugueux, fortement striés-ponctués. Dessous jaune. Pattes plus claires.

Iles Philippines: Mont Makiling, Laguna, avril 1931 (F. C. Hadden).

Voisin de *M. inconditus* Candèze, mais de taille beaucoup plus petite; ponctuation plus forte, plus serrée et rugueuse. Se rapproche également de *M. curtus* Candèze; plus étroit, aspect moins brillant; plus noir, avec des taches jaune pâle; pronotum moins arrondi latéralement et graduellement rétréci; ponctuation plus

serrée; élytres plus rugueux et plus fortement ponctués-striés.

Megapenthes philippinensis nov. sp.

Long. 9 à 11 m/m $\frac{1}{2}$ —Oblong, atténué en arrière, convexe; brun clair brillant, parfois plus ou moins noirâtre sur le pronotum; pubescence jaune. Tête convexe, densément ponctuée; bord antérieur arrondi et rebordé. Antennes brun clair, fines, courtes; 3e article insensiblement plus court que le 4e. Pronotum à peu près aussi long que large, sinué sur les côtés, rétréci seulement aux angles antérieurs, convexe; ponctuation fine et peu serrée; angles postérieurs divergents, aigus, bicarénés. Elytres de la largeur du pronotum, graduellement atténués, finement pointillés, légèrement ponctués-striés. Dessous de même couleur, parfois noirâtre. Hanches postérieures peu élargies en dedans, anguleuses en arrière. Pattes jaunes.

Iles Philippines: Mont Makiling, Laguna, avril 1931 (F. C. Hadden).

Voisin de *M. inconditus* Candèze, forme plus atténuée; couleur plus claire; front non caréné; ponctuation beaucoup plus légère; antennes moins longues et plus fines; hanches postérieures moins élargies en dedans.

Megapenthes angustus nov. sp.

Long. 7 à 9 m/m—Allongé, filiforme; brun noirâtre, base des élytres parfois jaune; pubescence jaune. Tête convexe et densément ponctuée, arrondie en avant. Antennes fines, ne dépassant pas la base du prothorax; noires, premiers articles ferrugineux; 3e plus long que le 2e et moins que le 4e. Pronotum beaucoup plus long que large, parallèle, ponctué comme la tête; angles postérieurs aigus, bicarénés. Elytres de la même largeur que le pronotum, graduellement atténués, tronqués au sommet, ponctués-striés. Dessous noir. Pattes jaunes.

Iles Philippines: Mont Makiling, Laguna, avril-mai 1931 (F. C. Hadden). Whitehead l'a également pris autrefois à Luzon.

Voisin de *M. maceratus* Candèze, plus petit, plus noirâtre; pronotum plus parallèle; stries des élytres mieux marquées.

Neodiploconus haddeni nov. sp.

Long. 9 à 12 m/m—Allongé, peu convexe; noir brillant, pronotum sanguin, parfois noirâtre sur le bord antérieur et au sommet des angles postérieurs; pubescence jaunâtre. Tête convexe, arrondie et rebordée en avant; ponctuation forte et peu serrée. Antennes ferrugineux; 2e et 3e articles petits. Pronotum plus long que large, légèrement et graduellement rétréci en avant, peu convexe, sillonné au milieu en arrière; ponctuation très fine et écartée, un peu plus forte en avant; angles postérieurs aigus et bicarénés. Ecusson rouge ou noirâtre. Elytres graduellement atténués

(tronqués au sommet chez la ♀), presque lisses, très légèrement ponctués-striés, nullement vers le bout. Dessous et pattes sanguins.

Iles Philippines: Mont Makiling, Laguna, 400 ft, avril 1931 (F. C. Hadden); Baguio, juin 1917 (F. X. Williams); Baguio-Benguet (Baker).

Plus étroit que *N. melanopterus* Candèze, 1864, de Sumatra; front moins fortement ponctué, à peine prolongé en avant; ponctuation du pronotum beaucoup plus fine; élytres indistinctement striés; dessous sanguin.

***Neodiploconus marginatus* nov. sp.**

Long. 11 à 13 m/m—Allongé, peu convexe; rouge ferrugineux brillant, élytres bordés de noirâtre; pubescence jaune. Tête convexe, arrondie et rebordée en avant, fortement et densément ponctuée. Antennes minces, ferrugineuses; 3e article à peine plus long que le 2e, beaucoup plus court que le 4e. Pronotum plus long que large, légèrement et graduellement rétréci en avant; ponctuation un peu moins grosse et moins serrée que sur la tête; angles postérieurs aigus, divergents, bicarénés. Élytres graduellement atténués en arrière, finement pointillés et légèrement ponctués-striés. Dessous ferrugineux. Pattes plus claires.

Baguio, juin 1917 (F. X. Williams); Baguio-Benguet (Baker).

Voisin de *N. ciprinus* Candèze; plus étroit, plus brillant, plus légèrement ponctué; élytres très légèrement striés, bordés de noir.