

## Description d'un Elateride nouveau

BY E. FLEUTIAUX, NOGENT-SUR-MARNE, FRANCE

(Presented by Mr. Van Zwaluwenburg at the meeting of May 4, 1933)

**Symphostethus pacificus** nov. sp.

15 m/m.—Allongé, subparallèle. Tête noire, aplatie en avant, finement et densément ponctuée; pubescence rousse en avant, noire en arrière. Antennes noires, ne dépassant pas les angles postérieurs du pronotum; 2e article petit, suivants beaucoup plus longs, subégaux, comprimés, serriformes. Pronotum aussi long que large à la base; rétréci en avant, finement limité latéralement, déprimé sur le dos, caréné au milieu à la base, finement et densément ponctué; rouge avec une tache noire au milieu en avant, une plus petite sur les bords externes au tiers antérieur et une autre à la base, en avant de l'écusson; pubescence rousse, noire sur les taches; angles postérieurs aigus, non divergents, bicarénés. Elytres de la largeur du pronotum, subparallèles, rétrécies dans le dernier quart, tronquées au sommet, peu convexes, ponctuées-striées; interstries plans, très finement en densément ponctués, 3e costiforme à la base; noirs; pubescence noire. Propectus jaune, ponctuation fine, peu serrée; sutures obscures. Epipleures des élytres parallèles, noirs, jaunes en avant. Méta sternum proéminent en avant, noir, jaune au milieu; bords de la fossette perpendiculaires et tranchants; ponctuation fine et serrée. Episternes métathoraciques rétrécis en arrière. Hanches postérieures légèrement et graduellement élargies en dedans. Abdomen noir, finement et densément ponctué. Fémurs et moitié antérieure des tibias jaunes, reste des pattes noir.

Iles Salomon: Bougainville, un exemplaire, ma collection; Guadalcanar, un exemplaire, collection Giffard, B. P. Bishop Museum de Honolulu.

Différent de *S. collaris* Schwarz par sa forme moins étroite, moins parallèle; tête noire; pronotum plus grand, moins inégal, légèrement arrondi sur les côtés et régulièrement rétréci en avant, maculé au milieu du bord antérieur et sur les bords latéraux, caréné en arrière et obscurci devant l'écusson, angles postérieurs non divergents; élytres moins longs, moins parallèles, tronquées au sommet au sommet; fémurs et moitié antérieure des tibias jaunes.