

## Elaterides nouveaux des Iles Philippines

BY E. FLEUTIAUX, NOGENT-SUR-MARNE, FRANCE

(Presented by Mr. Van Zwaluwenburg at the meeting of September 7, 1933)

### *Agrypnus lopezi* n. sp.

Mindanao: Bukidnon, Diklom. 2000 pieds, mars (F. C. Hadden). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

33 m/m.—Allongé; brun; pubescence rousse. Tête creusée au milieu, densément ponctuée. Antennes brun clair, comprimées et serriformes. Pronotum un peu plus long que large, sinué en avant et latéralement, déprimé de chaque côté, fortement et densément ponctué; angles postérieurs divergents, longuement carénés. Elytres atténués, entiers au sommet, très finement chagrinés, striés-ponctués. Dessous de même couleur. Pattes brun clair.

Ressemble à *A. luridus* Fabricius; moins convexe; pronotum non rétréci en avant, très largement déprimé de chaque côté de la ligne médiane, comme chez *A. ereptus* Candèze, duquel il diffère par la ponctuation du pronotum plus forte et les angles postérieurs longuement carénés.

### *Adelocera* (ex *Lacon*) *lopezi* n. sp.

Negros occ.: La Carlota, juin (Al. Lopez). Ma collection et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

15 m/m.—Oblong, peu convexe; brun; pubescence blanchâtre courte, très rare. Tête peu convexe, légèrement biimpressionnée au milieu, fortement et densément ponctuée. Antennes brunes, courtes, serriformes à partir du 4e article, 2e et 3e subglobuleux, égaux. Pronotum à peine plus long que large, arqué sur les côtés, rétréci en avant et en arrière, peu convexe; bord antérieur échancré en cercle; surface traversée par une crête longue, au milieu et en arrière de la moitié; ponctuation forte et assez dense, avec des points plus petits dans les intervalles; angles antérieurs prolongés en avant et arrondis; postérieurs peu divergents et tronqués, très longuement carénés près du bord externe jusque près des angles antérieurs. Elytres légèrement arqués sur les côtés, rétrécis dans le dernier tiers, conjointement arrondis au sommet; faiblement ponctués-striés; interstries plans, finement et densément pointillés. Dessous de même couleur, densément ponctué. Pattes brunes.

Voisin de *A. cervina* Erichson; plus allongé; pubescence courte, rare, ne formant pas de taches; pronotum plus long à peu près également rétréci en avant et en arrière, avec une carène transversale au delà de la moitié et de petits points serrés dans l'interv-

alle de la grosse ponctuation; élytres rétrécis seulement dans le dernier tiers.

**Lacon (*Adelocera*) philippinus** n. sp.

Mindanao: Zamboanga, Kabasalan, avril (H. C. Muzzall). Un exemplaire, ma collection.

11 m/m.—Allongé; brun clair; squamules jaunes. Tête impressionnée en avant, fortement ponctuée. Antennes brunes, courtes, très faiblement comprimées, à peine dentées. Pronotum aussi long que large, arrondi latéralement, rétréci en avant et en arrière, convexe, brusquement déclive dans la partie postérieure, impressionné au milieu à la base; ponctuation grosse et serrée; angles postérieurs petits, aigus, divergents. Elytres arrondis sur les côtés et atténués, non striés, couverts d'une ponctuation assez grosse disposée en lignes très rapprochées. Dessous de même couleur, ponctuation dense, plus grosse en avant. Hanches postérieures élargies en dedans, très étroites en dehors. Pattes brunes.

Taille beaucoup moindre que *L. luzonicus* Candèze; de couleur moins foncée; pronotum non sillonné au milieu, simplement impressionné au milieu à la base.

**Alaus farinulentus** n. sp.

Luzon, Mt. Province: St. Thomas—Mt. Data; 5000 pieds, mai (F. C. Hadden). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

25 m/m.—Large; noir; vestiture blanche serrée, pronotum dénudé sur la ligne médiane, élytres avec des taches noires au delà de la moitié; une petite sur le bord externe, une plus grande au milieu et quelques petites hachures vers le bout. Tête creusée; ponctuation peu serrée. Antennes noires, courtes, serriformes. Pronotum penché, plus long que large, graduellement rétréci en avant; bord antérieur sinué, en bourrelet sur le milieu; surface déprimée latéralement; ponctuation espacée, presque nulle au milieu; angles postérieurs divergents carénés. Ecusson oblong, incliné en avant. Elytres légèrement arrondis, atténués en arrière carrément tronqués au sommet; striés; interstries convexes, le 3e costiforme à la base; calus huméral saillant. Dessous également noir, tapissé de poils blancs, dénudé sur le milieu; ponctuation légère. Pattes noires, couvertes des mêmes poils blancs.

Voisin de *A. appendiculatus* Herbst; de forme plus large; pronotum rétréci en avant.

**Heteroderes pallidus** n. sp.

Luzon: Los Baños, octobre-novembre (F. Muir). Un exemplaire, ma collection.

6 m/m.  $\frac{1}{2}$ .—Oblong, large, déprimé; jaune pâle; pubescence de même couleur. Tête convexe, densément ponctuée. Antennes jaune pâle, n'atteignant pas tout à fait l'extrémité des angles postérieurs du pronotum, subfiliformes; 3e article légèrement plus long que le 2e et de même forme; suivants plus longs, très faiblement épaissis au sommet. Pronotum à peu près aussi long que large, peu convexe, brusquement déclive près de la base; ponctuation grosse sur un fond alutacé; angles postérieurs relevés, non divergents, unicarénés. Elytres courts, arrondis sur les côtés, rétrécis en arrière, à peine convexes, striés-ponctués. Dessous de même couleur. Hanches postérieures brusquement rétrécies en dehors. Pattes jaune pâle.

Voisin de *H. oblitus* Candèze; beaucoup plus court, entièrement jaune.

**Melanoxanthus longicollis** n. sp.

Mindanao: Bukidnon, Diklom, 2000 pieds, mars (F. C. Hadden). Un exemplaire, ma collection.

7 m/m  $\frac{1}{2}$ .—Allongé, convexe; noir brillant, élytres jaune pâle sauf à l'extrémité; pubescence courte, de la couleur du fond. Tête convexe, légèrement carénée au milieu, très densément ponctuée. Antennes noires, comprimées et élargies vers le bout, ne dépassant pas les angles postérieurs du pronotum. Pronotum notablement plus long que large, élargi en avant, sinué latéralement, très convexe, déprimé à la base, sillonné au milieu en arrière; ponctuation fine, peu serrée; angles postérieurs à peine divergents, carénés. Ecusson triangulaire, plan, densément ponctué. Elytres atténués, tronqués au sommet, finement ponctués, indistinctement striés. Dessous noir, très finement ponctué. Fémurs noirs; tibias et tarses jaune pâle.

Se rapproche de *M. subcylindricus* Candèze; forme plus longue, plus atténuée en arrière; aspect plus lisse, plus brillant; élytres presque entièrement jaunes.

**Melanoxanthus basalis** n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, mai (F. C. Hadden). Un exemplaire ma collection.

6 m/m.—Allongé; noir peu brillant, tache rousse aux épaules; pubescence de la couleur du fond. Tête convexe, densément ponctuée. Antennes noires, 1er, 2e et 3e articles testacés. Pronotum plus long que large, parallèle en arrière, arrondi en avant, convexe; ponctuation dense, fine en avant, grosse en arrière; angles postérieurs non divergents, carénés. Elytres de la largeur du pronotum, graduellement atténués, convexes, fortement ponctués-striés, très légèrement vers le bout; grande tache rousse à la base, plus étendue à l'épaule; interstries faiblement ponctués. Dessous entièrement noir. Pattes testacées.

Voisin de *M. dorsatus* Candèze; plus atténué; ponctuation plus grosse; tache des élytres humérale et plus rousse.

**Melanoxanthus bilineatus** n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, mars, juin (F. C. Hadden).  
Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

5 m/m.—Allongé, subparallèle, peu convexe; jaune, avec le tête obscure en arrière, deux bandes longitudinales noirâtres sur le milieu du pronotum et trois taches dans le sens de la longueur sur chaque élytre; celle de la moitié plus grande; pubescence jaune légère. Tête peu convexe, densément ponctuée, bord antérieur arrondi et rebordé. Antennes jaune pâle, subfiliformes, atteignant le sommet des angles postérieurs du pronotum. Pronotum plus long que large, graduellement et faiblement rétréci en avant, peu convexe, densément ponctué; angles postérieurs longs, aigus, non divergents, fortement et longuement carénés. Élytres très légèrement rétrécis en arrière, conjointement arrondis au sommet; striés-ponctués; stries effacées à la base. Dessous noirâtre; prosternum jaune. Pattes jaune pâle.

Forme allongée de *M. festucalis* Candèze; couleur jaune dominante. Pronotum avec deux bandes noirâtres; élytres avec trois taches mal définies s'échelonnant du premier quart à l'extrémité, stries moins marquées.

**Melanoxanthus acutifrons** n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, mars (G. C. Ladrera). Un exemplaire, ma collection.

4 m/m  $\frac{1}{2}$ .—Allongé, subparallèle, peu convexe; jaune avec une étroite bande noire sur le milieu du pronotum et une autre sur la suture des élytres, abrégée près du sommet; pubescence jaune légère. Tête peu convexe, densément ponctuée; bord antérieur en pointe obtuse. Antennes jaunes, subfiliformes, dépassant les angles postérieurs du pronotum. Pronotum beaucoup plus long que large, parallèle, densément ponctué; angles postérieurs aigus, non divergents, brièvement et finement carénés. Élytres très faiblement rétrécis en arrière, conjointement arrondis à l'extrémité, striés-ponctués. Dessous jaune. Pattes plus claires.

Très voisin de *M. bilineatus*; simplement orné d'une étroite bande noire au milieu dans la longueur du pronotum et jusque près du sommet de la suture des élytres. Pronotum long, parallèle; angles postérieurs courts, plus finement carénés.

**Melanoxanthus parvulus** n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, avril (F. C. Hadden). Plusieurs exemplaires.

2 m/m  $\frac{1}{2}$  à 2 m/m  $\frac{3}{4}$ .—Allongé; jaune mat, tête et pronotum, sauf sur les bords, noirâtres; pubescence jaune. Tête convexe, densément ponctuée. Antennes testacé pâle, obscures vers le bout, légèrement épaissies au sommet. Pronotum à peu près aussi long que large, faiblement rétréci en avant, con-

vexe, densément ponctué; angles postérieures à peine divergents, carénés. Elytres convexes, striés-ponctués; interstries pointillés. Dessous noirâtre. Femurs obscurs; tibias et tarsi testacés pâles.

Ressemble à *M. fusus* Candèze; beaucoup plus petit, plus finement ponctué.

**Megapenthes ornatocollis** n. sp.

Mindanao: Bukidnon, Diklom, 3000 pieds (F. C. Hadden).  
Un exemplaire, ma collection.

14 m/m  $\frac{1}{2}$ .—Allongé; pubescence jaune. Tête jaune, noire en arrière, convexe, densément ponctué; bord arrondi. Antennes filiformes testacées, n'atteignant pas les angles postérieurs du pronotum; 3e article plus long que le 2e. Pronotum noir avec le milieu brun et de chaque côté, une bande longitudinale jaune en dedans du bord externe; plus long que large, parallèle, arrondi en avant, convexe, brusquement déprimé à la base et impressionné au milieu en arrière; ponctuation serrée, un peu plus grosse sur les flancs; angles postérieurs longs, aigus, peu divergents, fortement bicarénés. Elytres jaunâtres, largement bordés de noir sur les côtés, convexes, échancrés au sommet, légèrement striés-ponctués; interstries plans, finement et densément ponctués. Propleures jaunes avec une bande longitudinale au milieu et l'extrême bord externe noirs. Prosternum noir. Arrière-corps obscur. Pattes testacées.

Voisin de *M. junceus* Candèze: prosternum orné de bandes; élytres bordés latéralement.

**Megapenthes haddeni** n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, avril (F. C. Hadden). Un exemplaire, ma collection.

13 m/m.—Allongé; jaune, avec la tête, une large bande sur le milieu du pronotum et l'extrémité des élytres noirs; pubescence de la couleur du fond. Tête convexe, densément ponctué. Antennes atteignant les angles postérieurs du pronotum, noires, serriformes à partir du 4e article; 3e deux fois plus long que le 2e, élargi au sommet, mais beaucoup moins que les suivants. Pronotum à peu près aussi large que long, rétréci en avant, peu convexe, brusquement décline en arrière, brièvement impressionné au milieu en face de l'écusson. Écusson creusé, ponctué densément en avant, moins en arrière. Elytres graduellement rétrécis, conjointement subtronqués au sommet, profondément striés-ponctués; interstries convexes, finement et densément ponctués. Propectus jaune. Prosternum bordé de noir en arrière. Arrière-corps noir, légèrement ponctué. Hanches postérieures faiblement élargies en dedans; bord inférieur sinué. Pattes noires, tarsi moins foncés.

Très jolie espèce, distincte de toutes les autres par sa coloration spéciale.

**Megapenthes magnus** n. sp.

N. Luzon: Mt. Province, Camp 82, 6000 pieds, mai (F. C. Hadden). Un exemplaire, ma collection.

18 m/m.—Allongé; épais; brun noirâtre; pubescence obscure, clairsemée. Tête convexe, grossièrement et rugueusement ponctuée; bord antérieur arrondi et rebordé. Antennes brunes, ne dépassant pas les angles postérieurs du pronotum; 2e et 3e articles étroits, 3e un peu plus long que le 2e; suivants plus grands et plus larges au sommet. Pronotum sensiblement aussi large que long, arrondi sur les côtés, légèrement rétréci en avant, convexe, déclive en arrière, impressionné à la base, sillonné au milieu; ponctuation grosse et serrée en avant, moins forte en arrière; angles postérieurs aigus, faiblement divergents, bicarénés, carène externe très près du bord latéral. Ecusson quadriforme, ponctué. Elytres convexes, subdilates en arrière, arrondis au sommet, fortement striés-ponctués; interstries convexes, finement et espacement ponctués. Dessous de même couleur; ponctuation plus forte sur le propectus que sur l'arrière-corps. Pattes brunes; 4e article petit et moins gros que les précédents.

Voisin de *M. inconditus* Candèze; plus brillant. Tête non carénée plus fortement ponctuée. Pronotum moins long; ponctuation plus grosse et moins serrée; carène externe des angles postérieurs plus rapprochée du bord latéral. Stries des élytres plus fortement ponctuées; interstries convexes et espacement pointillés. Hanches postérieurs moins anguleuses. 4e article des tarsi également court et plus mince que les précédents.

**Anchastus williamsi** n. sp.

Negros, septembre (F. X. Williams). Un exemplaire, ma collection.

6 m/m  $\frac{1}{2}$ .—Oblong, peu convexe; brun opaque; pubescence jaune. Tête peu convexe; ponctuation dense, ombiliquée. Antennes testacées filiformes; 3e article égal au 4e. Pronotum à peu près aussi long que large à la base, très faiblement courbe latéralement, légèrement rétréci en avant, peu convexe; ponctuation dense, ombiliquée; angles postérieurs robustes, non divergents, carénés en diagonale. Elytres subparallèles, arrondis et rétrécis dans le dernier tiers, fortement ponctués-striés; interstries finement rugueux. Dessous de même couleur. Pattes testacées.

Plus grand que *A. zvaluwenburgi* Fleutiaux; brun terne; antennes filiformes, 3e article égal au 4e et de même forme; ponctuation dense et ombiliquée.

**Anchastus haddeni** n. sp.

Luzon: Mt. Province, Mt. Saint Thomas; 6000 pieds, mars (F. C. Hadden). Un exemplaire, ma collection.

6 m/m  $\frac{3}{4}$ .—Oblong; brun, élytres plus clairs; pubescence jaune. Tête convexe; ponctuation ombiliquée grosse, large, superficielle et serrée. Antennes filiformes, atteignant la moitié du corps, brunes, deux premiers articles testacés; 3e égal au 4e. Pronotum à peu près aussi long que large à la base, trapézoïdal, peu convexe; ponctuation ombiliquée large, superficielle, assez serrée, effacée à la base; angles postérieurs aplatis et relevés, divergents, carénés. Elytres plus larges que le pronotum, arrondis et rétrécis seulement au delà de la moitié, peu convexes, striés-punctués; interstries légèrement rugueux. Dessous de même couleur. Pattes longues, testacé pâle.

Plus étroit et moins convexe que *A. williamsi*; pronotum trapézoïdal, ponctuation moins serrée et moins profonde; élytres plus larges que le pronotum. Pattes plus longues.

**Quasimus haddeni** n. sp.

Luzon: Mt. Province, Baguio, 5000 pieds, mars (F. C. Hadden)—Baguio, juin (F. X. Williams)—Baguio (Baker) Mt. Saint-Thomas. Mindanao: Dapitan, Basilan. Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

2 m/m  $\frac{3}{4}$  à 2 m/m  $\frac{1}{2}$ .—Oblong; noir brillant; pubescence grise très fine. Tête peu convexe; ponctuation fine, peu serrée. Antennes noires, épaisses, ne dépassant pas les angles du pronotum, hérissées de poils gris. Pronotum aussi long que large, peu rétréci en avant, peu convexe; ponctuation fine et peu serrée; carène des angles postérieurs prolongée jusqu'au bord antérieur. Elytres de la largeur du pronotum, subparallèles, arrondis au sommet, sans stries; ponctuation plus grosse que sur le pronotum, peu serrée, sans ordre. Dessous de même couleur. Sutures prosternales arquées et sillonnées, plus faiblement en arrière. Pattes noires.

Voisin de *Q. misellus* Boheman; moins large; aspect plus brillant; ponctuation beaucoup plus légère et moins dense.

**Odontocardus rufus** n. sp.

Mindanao: Dapitan; Surigao; Illigan; Bukidnon, Diklom, 2000 pieds, mars (F. C. Hadden). Ile Basilan; Negros: Monts Cuernos (Baker). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

$7\frac{1}{2}$  à 10 m/m.—Oblong, subparallèle; testacé; pubescence jaune légère. Tête peu convexe; ponctuation légère; bord antérieur arrondi et rebordé. Antennes testacées, dépassant à peine les angles postérieurs du pronotum, subfiliformes; 2e article presque aussi long que le suivant. Pronotum aussi long que large, légèrement arrondi sur les côtés, à peu près également rétréci en avant et en arrière, peu convexe, brusquement déclive à la base; ponctuation fine et serrée; angles postérieurs aplatis, courts, arrondis au sommet, carénés latéralement; sillons basilaires courts, bien marqués; limites latérales inférieures, fines, effacées en avant. Elytres fortement ponctués-striés;

interstries plans, très finement et légèrement pointillés. Dessous de même couleur. Pattes plus claires.

Plus petit que *O. vitalisi* Fleutiaux; de forme plus parallèle, de couleur testacée; ponctuation du pronotum plus régulière et plus serrée.

**Neodiploconus surdus** n. sp.

Mindanao: Bukidnon, Tangcolan (Baker)—Bukidnon, Diklom, 2000 pieds, mars (F. C. Hadden). Ma collection, et H.S. P.A. Experiment Station de Honolulu.

12 à 13 m/m.—Allongé, atténué en avant et en arrière; brun mat; pubescence rousse. Tête impressionnée en avant, fortement et densément ponctuée. Antennes brunes, ne dépassant pas les angles postérieurs du pronotum, légèrement comprimés, faiblement serriformes à partir du 4e article; 2e et 3e petits, globuleux. Pronotum plus long que large, graduellement rétréci en avant, peu convexe, faiblement déprimé à la base, impressionné au milieu en arrière, densément et fortement ponctué; angles postérieurs longs, aigus, divergents, bicarénés. Elytres graduellement rétrécis en arrière, subtronqués au sommet, légèrement striés; interstries plans, finement et densément ponctués. Dessous de même couleur; ponctuation serrée. Pattes testacées.

Plus large que *N. umbilicatus* Candèze; moins convexe, atténué en avant et en arrière, aspect terne; tête largement impressionné en avant.

**Neodiploconus nitens** n. sp.

N. Luzon: Mt. Province, Camp 82, 6000 pieds, mai (F. C. Hadden). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

12 à 13 m/m.—Allongé; noirâtre, brillant, élytres brunâtres; pubescence jaune assez longue, peu serrée. Tête fortement impressionnée en avant; bord antérieur avancé en bec arrondi; ponctuation grosse, peu profonde, très serrée. Antennes brunes, atteignant la moitié du corps, comprimées à partir du 4e article; 2e et 3e petits, globuleux. Pronotum un peu plus long que large, faiblement et graduellement rétréci en avant, déprimé; ponctuation forte et peu serrée; angles postérieurs relevés, aigus, divergents, brièvement carénés. Elytres plus larges que le pronotum à la base, graduellement atténués, subtronqués au sommet, peu convexes, très légèrement striés; interstries espacement pointillés. Dessous noir, finement et densément ponctué. Pattes brunes.

Très distinct par la tête avancée en bec arrondi; les antennes longues; les angles postérieurs du pronotum grêles; les élytres plus larges à la base que le pronotum.

**Neodiploconus angustus** n. sp.

Luzon: Mt. Province, Mt. Data; 5000 pieds, mars (F. C. Hadden). Un exemplaire, ma collection.

9 m/m.—Étroit; brun noirâtre brillant, plus clair aux angles postérieurs du pronotum et sur la suture des élytres; pubescence obscure, plus longue sur le pronotum. Tête arrondie et rebordée en avant, peu convexe, déprimée le long du bord antérieur, marquée d'une fossette au milieu; ponctuation assez grosse, peu serrée. Antennes brun clair, subfiliformes, atteignant la moitié du corps; 2e et 3e article petits, égaux. Pronotum plus long que large à la base, rétréci en avant, droit sur les côtés, peu convexe; assez fortement ponctué sur le bord antérieur, presque lisse sur le dos; angles postérieurs très déprimés, relevés et fortement ponctués, minces aigus, divergents, carénés tout près du bord externe. Elytres plus larges que le pronotum, atténués à partir de la base, conjointement terminés en pointe obtuse au sommet, légèrement striés. Dessous de même couleur. Pattes testacées.

Voisin de *N. nitens* Fleutiaux; plus étroit; bord antérieur de la tête plus arrondi; pronotum à ponctuation moins grosse, très espacée dans sa partie moyenne.

**Agonischius praeustus** n. sp.

Luzon: Laguna, Mt. Makiling, juin (F. C. Hadden). Un exemplaire, ma collection.

8 m/m  $\frac{1}{2}$ .—Allongé; brillant; jaune, tête, une tache sur le milieu du pronotum en avant, écusson, premier et dernier interstries et extrémité des élytres noirs; pubescence noire dressée, peu serrée. Tête convexe, densément ponctué. Antennes noires, serriformes, comprimées et élargies vers le bout; 3e article plus long que le 2e et de même forme. Pronotum aussi long que large à la base, rétréci en avant convexe; ponctuation peu serrée, forte en avant, légère sur les côtés et en arrière. Elytres atténués, légèrement ponctué-striés, plus distinctement vers l'extrémité; interstries plans et rarement pointillés. Propectus jaune; arrière-corps noir; pubescence grise. Pattes noires.

Appartient au groupe *A. pectoralis*, *A. sanguinipennis* Candèze.

**Agonischius muzzalli** n. sp.

Mindanao: Zamboanga, Kabasalan, mars (H. C. Muzzall).—Bukidnon, Tangcolan, Dapitan; Butuan; Basilan (Baker). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

6 m/m.—Oblong, convexe; jaune, élytres bordés de noir latéralement dès le dessous de l'épaule, tête et milieu du pronotum parfois noirâtres sur la plus grande partie de la surface. Tête densément ponctué. Antennes noires, premiers articles testacés. Pronotum aussi long que large, parallèle, arrondi en avant près des angles antérieurs, convexe, brusquement déclive à la base,

sillonné au milieu en arrière; angles postérieurs aigus, non divergents, carénés. Elytres arrondis sur les côtés et atténués, ponctués-striés. Dessous plus ou moins noirâtre, propectus parfois jaune. Pattes testacées.

Ressemble à *A. cardiorhinulus* Candèze; forme plus courte, pronotum plus convexe.

***Silesis castaneus* n. sp.**

Mindanao: Zamboanga, Kabasalan, mars (H. C. Muzzall); Bukidnon, Diklom, 3000 pieds (F. C. Hadden). Ma collection, et H.S.P.A. Experiment Station de Honolulu.

9½ à 10 m/m.—Allongé; brun; pubescence jaune légère. Tête convexe, assez fortement et densément ponctuée. Antennes brunes, ne dépassant pas les angles postérieurs du pronotum, faiblement serriformes; 2e article court, globuleux. Pronotum plus long que large, parallèle, arrondi en avant, convexe, brusquement déclive à la base; ponctuation forte et assez serrée; angles postérieurs non divergents, carénés près du bord externe; sillons basilaire bien marqués. Elytres faiblement atténués, légèrement ponctués-striés; interstries plans, presque lisses. Dessous plus foncé; même pubescence légère. Pattes ferrugineuses.

Même forme que *S. cambodiensis* Fleutiaux; couleur moins foncée; hanches postérieures brusquement rétrécies en dehors.