

## University of Groningen

### Maligne tumoren van de neus en neusbijholten

Wykerd, Hermanus Claassens

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1937

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Wykerd, H. C. (1937). *Maligne tumoren van de neus en neusbijholten*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.]

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN.

### I.

Het caverneuse angoom van het gelaat behandelde men bij voorkeur met intratumorale radium applicatie.

### II.

Atheromatosis scroti ontstaat in vele gevallen door vorming van cysten uit de uitvoergangen der zweetklieren.

### III.

Periarteriitis nodosa is een ziekte sui generis vermoedelijk veroorzaakt door een invisibel virus.

### IV.

Bij microscopisch onderzoek van preparaten van patiënten lijdende aan vulvo-vaginitis gonorrhoeica geeft de *Gram* kleuring volgens VAN LOGHEM de meest betrouwbare resultaten.

### V.

Bij endocarditis lenta neme men splenectomie in ernstige overweging.

### VI.

Terwijl in landen als Zuid-Afrika uit een oogpunt van ziekenverzorging een groot aantal kleine ziekenhuizen gewenscht is, geldt voor Nederland juist het tegenovergestelde: grote centrale ziekenhuizen naast een goed georganiseerd ziekenvervoer.