

University of Groningen

Cerebrospinale rhinorrhoe

Defesche, Hubert François Henri Gerard

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1973

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Defesche, H. F. H. G. (1973). *Cerebrospinale rhinorrhoe.* [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

I.

Iedere operatie ter sluiting van een liquorfistel, dient gevolgd te worden door een RIHSA onderzoek.

II.

Recidiverende meningitiden wijzen op het bestaan van een liquorfistel, tenzij het tegendeel bewezen wordt.

III.

De uitdrukking „niet traumatische rhinorrhoe” verdient voorkeur boven „spontane rhinorrhoe”.

IV.

Het niet kunnen aantonen van een liquorfistel door middel van een RIHSA onderzoek sluit het bestaan hiervan niet uit.

V.

Morbus Crohn kan zich manifesteren als een solitaire ontsteking van de maagwand.

VI.

Bij oudere mensen, die verdacht zijn op een subduraal hematoom, verdient het maken van een of meer boorgaten voorkeur boven een carotisangiographie.

VII.

Gliaweefsel op het peritoneum wijst op het bestaan van een (ovarium)teratoom.

VIII.

Bij het ontbreken van tactile gnosis aan de volaire zijde van de vingers treedt een aanzienlijke vermindering van de gebruikswaarde van de hand op, omdat de precisiegrep vermindert en de vingers niet meer zonder hulp van de ogen „zien”.

IX.

De toepassing bij de uitvoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van artikel 21 sub 2a:

"bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt zoveel doende rekening gehouden met: a. door deze arbeidsongeschiktheid veroorzaakte verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid als bedoeld in artikel 18, eerste of tweede lid"

heeft ertoe geleid, dat de restvaliditeit te weinig productief gemaakt wordt.

Deze toepassing is niet in overeenstemming met de bedoelingen van de wetgever; bovendien zijn hierdoor de gepubliceerde cijfers van de werkloosheid in gunstige zin beïnvloed.

X.

Zoals de meerderheid van de chirurgen blij zijn dat zij op bereikbare afstand een ziekenhuis hebben waar zware schedelletsels verzorgd worden, zo zullen zij het ook als een zegen ondervinden, wanneer zij een ziekenhuis binnen hun bereik hebben waar goede handchirurgie beoefend wordt.

XI.

Wanneer een land in een economische crisis is gekomen, verdient het vaak de voorkeur om de noodsituatie af te kondigen in plaats van de belasting te verhogen.

XII.

Een extra stimulans voor de promovendus is het feit, dat er nog geen enkele studie is verricht naar de verhouding tussen het aantal verstuurde en het aantal gelezen proefschriften.

XIII.

Een dolle Mina gedraagt zich als een man, totdat er een in de buurt komt.

H. F. H. G. Defesche.

26 september 1973.