

University of Groningen

Geriatrische chirurgie

Oldhoff, Jan

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1961

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Oldhoff, J. (1961). *Geriatrische chirurgie: Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van 1422 patienten van 70 jaar en ouder in de periode 1950-1960.* [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

I

Het is niet waarschijnlijk, dat Lewy-lichaampjes, die in vele delen van het zenuwstelsel bij idiopathische paralysis agitans gevonden zijn, ook bij de verschillende vormen van Parkinsonisme voorkomen

II

Ook op hoge leeftijd is operatieve therapie van het galsteenlijden te verkiezen boven conservatieve behandeling.

III

Het familie-onderzoek bij lupus erythematodes disseminatus dient, naast het onderzoek naar antilichamen tegen kernen, ook een onderzoek naar antilichamen tegen andere lichaams-eigen antigenen te omvatten.

IV

Bij de behandeling van hypospadie is chordectomie en urethra-reconstructie in één tempo af te raden.

V

Bij de behandeling van nierinsufficiënties met de kunstnier is nauwlettende zorg voor de longen vereist; indien longcomplicaties dreigen of optreden aarzele men niet zonodig tracheotomie te verrichten en eventueel kunstmatige beademing toe te passen.

VI

Op hoge leeftijd is de indicatie tot operatie van een lies- of dijbreuk dringender dan op jonge leeftijd, daar complicaties niet alleen frequenter optreden, maar ook ernstiger zijn.

VII

Het is onjuist de bestraling volgens McWhirter, na ablatio mammae wegens carcinoom, altijd als een minder ingrijpende behandeling dan de radicale mamma-amputatie te beschouwen.

VIII

Bij chronische diarree zonder bekende oorzaak dient een onderzoek naar de werkzaamheid van de fermenten lactase en saccharase te worden ingesteld.

IX

Voor een osteosynthese bij epiphysiolyse capitis femoris is fixatie met Knowle-pennen te verkiezen boven fixatie met een driebladige spijker volgens Smith-Petersen.

X

Het is te betwijfelen, of er voldoende indicatie bestaat voor het als routine toedienen van kleine doses vitamine K aan praemature pasgeborenen.