

## University of Groningen

### Het stompe buiktrauma : Een klinische studie betreffende 631 patienten met een stomp buikletsel uit de periode 1909-1960.

Brinkhorst, Andries Paul

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1964

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Brinkhorst, A. P. (1964). *Het stompe buiktrauma : Een klinische studie betreffende 631 patienten met een stomp buikletsel uit de periode 1909-1960.* [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## stellingen

- I De abdominale paracentesis, een belangrijk diagnostisch hulpmiddel bij het stompe buiktrauma, mag echter nimmer als substituut van de klassieke onderzoek-methoden dienen.
- II Het geringste vermoeden van een retroperitoneale duodenum-verwonding maakt een mobilisatie van het duodenum volgens Kocher noodzakelijk.
- III Bij de traumatische luxatie van de galblaas verrichte men een cholecystectomie.
- IV In een ziekenhuis, waar een groot aantal ongevalspatienten wordt behandeld, mag een „operatie-brancard” niet ontbreken.
- V De traumatologie kan slechts in teamverband in al zijn facetten worden beoefend. De algemene chirurg zal de leiding van het team moeten hebben.
- VI Calcaneusfracturen dienen conservatief behandeld te worden.
- VII Voordat men bij de narcose curare als spierverslappend middel gebruikt, blijft het aangewezen eerst de reactie van de nog niet „slapende” patient op een intraveneus toegediende proefdosis curare (maximaal 5 mg.) af te wachten.
- VIII De verschijnselen van „maternal deprivation” en „hospitalisme”, zoals die door Bowlby bij jonge kinderen zijn be-

schreven, komen in de kindergeneeskunde zeer veelvuldig voor, echter in hoofdzaak in het normale gezin en slechts bij uitzondering in ziekenhuizen en inrichtingen, mits deze laatsten goed geleid zijn.

- IX Het onlangs aangetoond calcium-mobiliserend effect van parathormoon op gekookt botweefsel is het eerste voorbeeld van hormonale beïnvloeding van een dood substraat.  
(Gordon, G.S., *Acta endocrin.*, 44:481; 1963)
- X Polikliniek en kliniek dienen als evenwaardige onderdelen van het ziekenhuis beschouwd te worden.
- XI De kosteloze behandeling van patienten in Universiteits-poliklinieken is een zinloos overblijfsel uit een tijdperk, waarin te weinig sociale zekerheid bestond.
- XII Een Universiteitskliniek behoort te beschikken over een modern en snel toegankelijk systematisch archief van diagnose, therapie en complicaties.
- XIII Bij de huidige ontwikkeling in de roeiwereld zal gestreden moeten worden tegen aantasting van het specifieke karakter van de Varsity en haar datum.

Stellingen behorende bij A. P. Brinkhorst  
Het stompe buiktrauma  
Groningen 1964