

University of Groningen

Epilepsie en Sport

van der Woude, L. H. V.; Kuyer, Anneke; Rozendal, Rients H

Published in:
Epilepsie Bulletin

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version
Version created as part of publication process; publisher's layout; not normally made publicly available

Publication date:
1985

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):
van der Woude, L. H. V., Kuyer, A., & Rozendal, R. H. (1985). Epilepsie en Sport: Een aanzet tot enkele richtlijnen. *Epilepsie Bulletin*, 13(4), 3-10.

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Dit geldt echter ook voor vele andere situaties, zoals lopen in het verkeer, fietsen, trappen lopen, strijken, koken, enzovoort. Wil men echter een volwaardig leven leiden, dan moet men onvermijdelijk meer risico's nemen dan een ander. Bij de beslissing of een sport wel of niet beoefend kan worden, moet men drie stappen nemen:

- a. het risico onderkennen;
- b. het risico meten en
- c. bepalen hoeveel risico men wil nemen.

De grootte van het risico is moeilijk te bepalen. Er is geen registratie van ongelukken bij sport en epilepsie. Uit een onderzoek van Aisenso (1948) bleek dat in een kindertehuis in een periode van 16 jaar observatie bij de kinderen met epilepsie niet meer ongelukken waren voorgekomen dan bij de andere kinderen (resp. 2,8 en 2,9%). Toch werden de kinderen aangemoedigd aan alle sporten deel te nemen, zoals zwemmen en boomklimmen.

Uit een eigen onderzoek, gepubliceerd in de brochure *Epilepsie & risico*, blijkt evenzeer dat sport zelden tot een ongeluk heeft geleid (Sonnen 1984). Om een zekere uitspraak te kunnen doen, moet men echter beschikken over een grote groep patiënten met een

controlegroep met vergelijkbare gegevens over hun sportactiviteit.

Het hanteren van lijsten met sporten die bij epilepsie wel of niet zijn toegestaan is onjuist. Hoewel een dergelijke lijst gebruikt zou kunnen worden om de beoordelende arts of sportleider attent te maken op mogelijke gevaren die de sport voor iemand met epilepsie zou kunnen hebben, dreigt al spoedig het gevaar dat er automatisch generalisatie ontstaat en alle patiënten met epilepsie over één kam geschoren worden. De slechte ervaringen met deze lijsten kennen wij maar al te goed uit de keuring voor bepaalde beroepen.

In de literatuur vindt men nogal eens van dergelijke opsommingen, waarbij de verschillende auteurs het overigens niet met elkaar eens zijn.

De verschillende soorten sportbeoefening worden nader bekeken met een genuanceerd advies over deelname daaraan. Het overzichtsartikel wordt afgesloten met adviezen over sportbeoefening zoals deze voorkomen in de folder serie Aspecten van Epilepsie: Sport & Zwemmen.*

* Verkrijgbaar bij het Bureau Epilepsievoorlichting.



Dr. B. v. Zijl

Dr. C.H.W. van Zijl, sinds 1966 hoofd van de Psychologische Dienst van het Instituut voor Epilepsiebestrijding te Heemstede, neemt op 17 juni 1985 afscheid. Ter gelegenheid van dit afscheid wordt op deze dag een minisymposium georganiseerd in het gebouw 'Irene' van 'Meer & Bosch', Heemstede. Het programma ziet er als volgt uit:

'Gedragwetenschappen en Gezondheidszorg'

- | | |
|-----------------|---|
| 13.00 uur | Ontvangst |
| 13.30 uur | Opening door drs. <i>Fr.H.J. Knaven</i> |
| 13.30-14.00 uur | Prof. dr. <i>W.A. Wagenaar</i> : 'Hoeveel kost een mensenleven?' |
| 14.00-14.15 uur | Dr. <i>A.P. Aldenkamp</i> : 'Neuropsychologische diagnostiek, een modeverschijnsel?' |
| 14.15-14.30 uur | Drs. <i>T. Baart van der Geer</i> : 'Psychotherapie bij neurotische epilepsiepatiënten' |
| 14.30-14.45 uur | Drs. <i>Scheeper-Bij 't Vuur</i> : 'Langdurig verblijf in "De Cruquishoeve", de hulpvraag nader bezien.' |
| 14.45-15.15 uur | PAUZE. Tijdens de pauze presentatie van videobanden, gemaakt door <i>M. Narold</i> en <i>E. Wesselink</i> . |
| 15.15-15.45 uur | Prof. dr. <i>R. Diekstra</i> : 'Gedragwetenschappen en gezondheidszorg: toekomstperspectieven.' |
| | Sluiting. |
| 16.15 uur | Receptie. |

Anmelding: 023 - 33 90 60, toestel 2122/2255.

Voor u gelezen

Epilepsie en sport

(Samenvatting van het artikel van A.E.H. Sonnen door C. Peper* in het Bondsrugaan nr. 1 van de Nederlandse Sportbond voor Geestelijk Gehandicap-ten.)

Na een korte inleiding over de oorzaken van epilepsie en omschrijving van de drie bekendste aanvalsvormen worden de voor- en nadelen van sportbeoefening bij epilepsie tegenover elkaar gezet. Sonnen komt dan tot een aantal aanbevelingen. Het vrije en onbelemmerde aantal lichaamsomsporingen kan soms alleen al een bevrijding betekenen waardoor grote spanningen wegvallen. Dit is onder meer een reden om sport bij epilepsie extra aan te bevelen:

1. afwijken van het lichaam, onvoldoende leven in het lichaam;
2. onvermogen om naar de taal van het lichaam te luisteren en deze te verstaan;
3. onvermogen om geestelijke spanningen via het lichaam af te laten vloeien;
4. beperkingen elders maken dat alle mogelijkheden tot ontspanning en vrolijkheid moeten worden uitgebuit. Uitsluiting van sport geeft sociale verarming en minderwaardigheidsgevoel;
5. een betere lichamelijke conditie verslechtert het zelfvertrouwen, de schoonheid en de weersand van activiteit onderdrukt aanvallen.

Ad. I. Bij epilepsie wordt tijdens het EEG-onderzoek aan de patiënt gevraagd drie minuten geforceerd diep te zuchten (hyperventilatie), waardoor de kans op het vinden van een afwijking toeneemt. Hierdoor is de misvatting ontstaan dat lichamelijke inspanning, bijvoorbeeld hardlopen, die ook met een versnelde ademhaling gepaard gaat, een aanval zou kunnen opwekken. Götze meent echter dat de bij hyperventilatie versterkte afgifte van koolzuur, daling van het koolzuurgehalte in het bloed en stijging van de zuurgraad (alcalose) ertoe leidt dat het GABA-gehalte (GABA wordt gezien als een stof die aanvallen onderdrukt) waardoor de kans op een aanval toeneemt. De afwijkingen in het EEG nemen dan ook bij hyperventilatie toe. Bij inspanning vond hij wel een versterkte ademha-

* C. Peper is lid van de kernredactie.

ling, maar geen daling van het koolzuurgehalte, omdat de versterkte ademhaling een compensatie is van een verhoogde behoefte. De spierarbeid en de soms optredende lichte stijging van het koolzuurgehalte leiden tot een daling van de zuurgraad (acidose), waardoor het GABA-gehalte in het bloed toeneemt en de aanvallen worden onderdrukt (vergelijk het ketogene dieet dat vroeger gegeven werd bij epilepsie Bij inspanning zag hij dan ook de afwijkingen in het EEG verminderen. Deze onderzoeken zijn ook door anderen bevestigd (Kuyser 1978, Takada 1981). Een eigen onderzoek naar deze relatie is afgebeeld in tabel I. Het aantal bladzijden van het EEG waarop epileptische afwijkingen voorkomen, wordt geturfd voorafgaande, tijdens en na lichamelijke inspanning op een homeërainer. Soms is er geen invloed van de inspanning, meestal worden de afwijkingen door de inspanning onderdrukt en treden ze na de inspanning verslechtert op. Zoals uit deze tabel blijkt komen er ook enkele gevallen voor waarin de afwijkingen tijdens de inspanning verslechtert worden. Bij deze zeldzame gevallen zou men dus een toename van de aanvallen tijdens de inspanning kunnen verwachten.

Tabel I Invloed van inspanning op de epileptische EEG-afwijkingen

voort	tijdens	na inspanning
1	7 (1/14)	0 (0/88)
2	5 (29/57)	44 (40/90)
3	0 (0/9)	2 (1/47)
4	0 (0/36)	0 (0/112)
5	20 (4/20)	31 (43/137)
6	39 (12/31)	31 (25/81)
7	11 (5/47)	1 (1/97)
8	53 (54/103)	30 (45/150)
9	42 (25/59)	5 (6/123)
10	0 (0/13)	A
11	0 (0/24)	A
12	0 (0/11)	3 (4/123)
13	58 (19/33)	39 (51/146)

Het eerste getal is het % perioden van 10 seconden met afwijkingen (tussen haakjes het aantal perioden met afwijkingen, gedeeld door het totaal aantal geregistreerde perioden).
A = epileptische aanval

Bij patiënt 1/cm 5 probeert rust na inspanning een aanval. Bij patiënt 10 en 11 probeert inspanning zelf een aanval.

Ad II. Natuurlijk kunnen bepaalde sportsituaties, zoals bergbeklimmen, een aanval gevaarlijk maken.

digheid in deze kunnen niet worden geformuleerd. Gezien de variatiebreedte in de vormen en verschijnselen van epilepsie en de variatiebreedte van wensen en mogelijkheden tot sportbeoefening zullen de adviezen steeds een volstrekt geïndividualiseerd karakter moeten dragen. Wel kunnen twee desiderata worden geformuleerd.

Een categoriaal afwijzen van sportbeoefening zal nooit behoeven en moeten plaatsvinden. Veilige condities voor sportbeoefening zijn in overleg altijd te bereiken al zal dit ten koste kunnen gaan van andere aspecten van sportbeoefening.

Overigens dient een advies niet gebiedend geformuleerd te worden. De uiteindelijke keuze en beslissing moet aan de patiënt zijn. Deze moet een zinnige afweging van risico's, voor- en nadelen kunnen maken op grond van het door de arts aangereikte en onderbouwde advies. Dit impliceert dat de keuze van de patiënt een grensoverschrijding van het wenselijke kan inhouden. De patiënt zal dan ook zelf zorg moeten dragen voor de noodzakelijke begeleiding die weet hoe te handelen in nood.⁷⁰

Literatuur

- 1 Magnus O, Lorentz de Haas A. The epilepsies. Handbook of Clinical Neurology, Vol. 15. North Holland Pub Comp, Amsterdam, 1974.
- 2 Matthes A. Epilepsie. Thieme Verlag, Stuttgart, 1977.
- 3 Schmidt D. Behandlung der Epilepsien. Thieme Verlag, Stuttgart, 1981.
- 4 Laidlaw J, Richens A. A textbook of epilepsy. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1982.
- 5 Sytsema W. De gehandicapte en de sportgezondheidszorg. Academisch Proefschrift, Amsterdam, 1981.
- 6 Woude L van der. Epilepsie en sport? Doktoraal-skriften Vakgroep Functionele Anatomie, Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding, Vrije Universiteit, 1982.
- 7 American Medical Association. Convulsive disorders and participation in sports and physical education. JAMA 1968; 206: 1291.
- 8 American Medical Association. Epileptics in contact sports. JAMA 1974; 229: 820-1.
- 9 Livingston S. Should physical activity of the epileptic child be restricted? Pediatrics 1971; 45: 694-6.
- 10 Livingston S, Berman W. Participation of epileptic children in sports. JAMA 1974; 224: 236-8.
- 11 Livingston S, Berman W. Participation of the epileptic child in contact sports. J Sports Med 1974; 2: 170-4.
- 12 McLaurin R. Epilepsy and contact sports. JAMA 1973; 225: 285-7.
- 13 McLaurin R. Epilepsy and contact sports: factors contraindicating participation. In: Harris P, Mawdsley C, eds. Proc of the Hans Berger Centen Symp, Churchill Livingstone, London, 1974.
- 14 Adams R, Daniel A, Rullman L. Games, sports and exercises for the physically handicapped. Lea and Febiger. Philadelphia, 1975.
- 15 Bruens J. Psycho-sociale aspecten van epilepsie. Ciba Geigy, Arnhem, 1978.
- 16 Most P. Epilepsie et sport. Medicine du sport 1981; 55: 46-8.
- 17 Ansink B. Interictale en andere gedragsstoornissen bij kinderen met epilepsie. In: Jenniskens-Schinkel A, Diamant J, Diesfeldt H, Haaxma R, eds. Neurologie in Nederland. Van Loghum Slaterus, Deventer, 1980.
- 18 Ziegler R. Impairments of control and competence in epileptic children and their families. Epilepsia 1981; 22: 339-46.
- 19 Ward F, Bower B. A study of certain social aspects of epilepsy in childhood. Dev Med Child Neurology 1974; 20: (suppl. 39) 1-63.
- 20 Troch C. Van vallende ziekte tot epilepsie. Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, 1975.
- 21 Suurmeyer T. Kinderen met epilepsie. Academisch Proefschrift, Groningen, 1980.
- 22 Gorter K. Het dagelijks leven van mensen met epilepsie. NIMOWA, 1978.
- 23 Gutteling J, Seydel E, Wiegman O. Epilepsie, beeldvorming en beeldverandering. T v Sociale Geneeskunde 1981; 59: 505-12.
- 24 Peper C. Verschillen in opinies over epilepsie bij het grote publiek en bij mensen met epilepsie. Epilepsie Bulletin 1983; 12: 6-8.
- 25 Ryan R, Kempner K, Emlen A. The stigma epilepsy as a self-concept. Epilepsia 1980; 21: 433-45.
- 26 Schneider J, Conrad P. Medical and sociological typologies: the case of epilepsy. Soc Sc Med 1981; 15A: 211-9.
- 27 Stevenson C. Socialization effects of participation in sport: a critical review of the research. Res Quarterly 1975; 46: 287-99.
- 28 Haywood. The functions of games and sport: a review of some theories. Res papers in Phys Ed 1976; 3: 31-6.
- 29 McCloy Layman E. The contribution of play and sport to health. In: Kane J, ed. Psychological aspects of physical education and sport. Routledge Kegan, London, 1972.
- 30 Bladergroen W. De psychologische betekenis van lichamelijke opvoeding; Het belang van senso-motorische training t.b.v. preventie en behandeling van leerstoornissen; Beweging en opvoeding. In: Keuze uit het werk van W. Bladergroen. Vermande en Zonen. IJmuiden, 1978.
- 31 Wilkerson M, Dodder R. A Sociological approach to the functions of sport in modern society. JOPER 1979; 50: 50-1.
- 32 Thomas A. Einführung in die Sportpsychologie. Verlag für Psychologie. Göttingen, 1978.
- 33 Spreitzer E, Schnyder E. The psychosocial function of sport as perceived by the general population. Int Rev Sport Soc 1975; 10: 87-91.
- 34 Grove S, Dodder R. A study of functions of sport: a subsequent test of Spreitzer en Snyder's research. J Sportbehavior 1979; 2: 83-91.
- 35 Albinson J. Sport and physical education participation: a developer of social ideals? Phys Ed Rev 1979; 57-62.
- 36 Verkuijl A. Medische aspecten van gehandicapten-sport. In: De lichamelijke gehandicapte en de sport. De Vrieseborch, Haarlem, 1973.
- 37 Beek A van. Sociale functie van sport voor de gehandicapte. In: Lichamelijke Opvoeding en Sport. De Vrieseborch, Haarlem, 1973.
- 38 Vermeer A. Lichamelijke opvoeding en sport voor lichamelijke gehandicapten. Sportcahier 9, NKS, 1976.
- 39 Price R. Physical education and the physically handicapped children. Lepus Books, London, 1980.
- 40 Soulek M. Look at stigma's and the role of recreators and physical educators. JOPPER 1975; 46: 28-9.
- 41 Blank J, Anderson R. The effects of anti-convulsant drugs on rehabilitation and employment of epileptics. J Rehabilitation 1983; 61-3.
- 42 Boucharlat J, Maitre A, Ledru J. Sport et epilepsie de l'enfant. Annals Medico Psychologique 1973; 131: 392-401.
- 43 Schneider R. Head and neck injuries in football. Williams and Wilkins, Baltimore, 1973.
- 44 Guendal L. Empfehlungen für die Befreiung anfallskranker Kinder vom Schulsport. Deutch Med Wochenschr 1975; 100: 491-4.



sommige onderdelen minder dan wel meer risico's

met zich mee brengen.

Kindereen met een niet voldoende gereguleerde on-

voorspelbare epileptische aandoening kunnen een

verhoogd risico lopen bij oefeningen aan wandrek,

ringen of klimtouw. Het neerleggen van matten kan

volgende bescherming bieden als de toetselhoogte

niet te groot wordt. Athankelijk van de epileptisie-spe-

cifieke gegevens en de individuele overwegingen kan

(als uiterste maatregel) tijdelijke uitsluiting van be-

Tot slot

Naar aanleiding van het voorgaande kan geconclu-

deerd worden, dat sportbeoefening en epilepsie zeker

niet elkanders tegenpolen zijn. In het algemeen ge-

steld is sportbeoefening juist ook voor epilepsiepa-

tiënten gewenst en dient, indien maar enigszins mo-

gelijk, op gevarieerde wijze in de activiteiten van alle

epilepsiepatiënten te zijn opgenomen.

Hoewel preventie van ongevallen en letsel ook ten

aanzien van epilepsiepatiënten nagestreefd moet

worden, mag dit niet tot een van alle redelijkheid

ontdane drang worden. Risico's behoren tot het

dagelijks leven, ook dat van de epilepsiepatiënt. Zo

zullen risico's ten gevolge van verkeerde deelname

aanvalstypen: bewustzijnsdaling, controle-verlies bewe-

ginsapparatuur, prodrom/aurae, valpatroon

aanvalstrequentie

medicamenenteuze bijwerkingen

medicamenenteuze extra-regulatie

temporele karakter aanvalsequentie

nevenaandoeningen

situatieve factoren

SPORT-SPECIFIEK:

- fetteilijke relatie tussen epilepsie en sportbeoefening:
- familiale predispositie (licht) hoofddekkel
- risicoprofiel sportvorm
- beoefeningsniveau
- getraindheid conditioneel en senso-motorisch
- begeleiding
- preventieve maatregelen

Grensbeëpaling van het wenselijke:

- aanvalstypen: bewustzijnsdaling, controle-verlies bewe-
- ginsapparatuur, prodrom/aurae, valpatroon
- aanvalsequentie
- medicamenenteuze bijwerkingen
- medicamenenteuze extra-regulatie
- temporele karakter aanvalsequentie
- nevenaandoeningen
- situatieve factoren

Wenselijkheid sportbeoefening:

INDIVIDU:

- belang/funcie sportbeoefening
- psychosociale problemen
- effecten van ontzegging sportbeoefening
- substitutie-activiteiten

Wenselijkheid sportbeoefening:

Deelnamen aan de lichamelijke opvoeding op school dient overeenkomstig andere sportieve activiteiten te worden. Deelnamen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Echter met dien verstande, dat

Deelnamen aan de lichamelijke opvoeding op school dient overeenkomstig andere sportieve activiteiten te worden. Deelnamen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Echter met dien verstande, dat

Deelnamen aan de lichamelijke opvoeding op school dient overeenkomstig andere sportieve activiteiten te worden. Deelnamen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Echter met dien verstande, dat

Deelnamen aan de lichamelijke opvoeding op school dient overeenkomstig andere sportieve activiteiten te worden. Deelnamen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Echter met dien verstande, dat

Deelnamen aan de lichamelijke opvoeding op school dient overeenkomstig andere sportieve activiteiten te worden. Deelnamen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Echter met dien verstande, dat

Deelnamen aan de lichamelijke opvoeding op school dient overeenkomstig andere sportieve activiteiten te worden. Deelnamen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Echter met dien verstande, dat

- ook bij het ontstaan van PTE zouden erfelijke factoren een rol spelen.⁵⁷ Dit is vooralsnog echter geenszins bewezen.
 - uit enkele epidemiologische studies blijkt dat kinderen, in vergelijking met volwassenen, een iets grotere kans hebben op het ontstaan van vroeg-epileptische symptomen na licht hoofdtrauma.⁵⁸⁻⁶⁰ Echter ten aanzien van laat-epileptische verschijnselen (dit is in tegenstelling tot vroege symptomen een daadwerkelijke vorm van epilepsie) geldt dit niet.
 - ook triviaal/licht hoofdletsel (bijv. een hersenschudding) kan leiden tot microtraumata in het CZS en het (tijdelijk) dysfunctioneren hiervan. Herhaald licht hoofdletsel kan in de effecten cumulatief werken: ernstiger morfologische beschadigingen^{61, 62} en langduriger functieverstoring of -uitval.⁶³⁻⁶⁶
- Op grond van deze gegevens lijkt het raadzaam, dat, indien er evidente aanwijzingen zijn voor een familiale predispositie voor (licht) hoofdletsel (zich uitend in een relatief hoge frequentie van commotio cerebri of PTE in de familie-anamnese) men in het advies-protocol rekening houdt met (sporten met) een hoog risico op hoofdtrauma. Of en in welke sporten een dergelijk risico schuilt is niet eenvoudig aan te geven. Volgens Kraus⁶⁷ is 'sport' in 3-8% (x-gemid.=4,4%) oorzaak van een geregistreerd hoofdletsel. Ter vergelijking: voor 'verkeer' is het gemiddelde percentage 40,6%.

Overigens neemt vrijwel iedereen deel aan het verkeer, terwijl zeker niet iedereen sport beoefent: de 'populations at risk' verschillen.

Tussen verschillende takken van sport varieert de letselfrequentie en daarmee het -risico nogal sterk. Aan de hand van een analyse van een reeks epidemiologische studies omtrent sportletfels en -ongevallen blijkt, dat naast uiteraard boksen, de sporten ijshockey, worstelen en Amerikaans 'football' relatief hoog scoren op 'hoofdletsel'. Daarentegen scoren bijvoorbeeld tennis, atletiek en volleybal laag.⁶ Bij deze analyse werden berg-, vlieg- en gemotoriseerde snelheidssporten buiten beschouwing gelaten.

De grootte van het hoofdletselrisico voor epilepsiepatiënten in overeenkomstige omstandigheden is niet bekend en niet zonder meer uit bovengenoemde cijfers af te leiden. Vermoedelijk echter ligt dit risico hoger gezien de mogelijkheid van epileptische aanvallen.

Ook de sederende werking van sommige anti-epileptica kan risicoverhogend werken.

Slechts eenmaal is daadwerkelijk onderzocht of deze epilepsie-specifieke overwegingen doorwerken op de letselfrequentie in sport- en spelsituaties.⁶⁸ Het letselpercentage onder een groep van 250 kinderen met en 750 kinderen zonder epilepsie, over een intramurale periode van gemiddeld negen maanden met een voor beide groepen identiek activiteitenprogramma, bleek tussen beide groepen niet noemenswaardig te verschillen: 2,8 en 2,7%.

Sport-specifieke overwegingen

Epilepsiepatiënten die niet aanvalsvrij zijn en ook juist tijdens sportieve of fysieke inspanning (risicovolle) aanvallen ervaren, voor zover bekend een zeldzaam verschijnsel, kan men via extra regulatie met anti-convulsiva trachten meer ruimte voor sportbeoefening te bieden. Dit is uiteraard alleen noodzakelijk, indien de combinatie van de sportbeoefening met de specifieke epileptische aandoening te zamen een bedreiging voor de gezondheid vormt.

Aan de hand van een risicoprofiel van een sport en/of sportsituatie, waarbij in het algemeen preventie van ernstig letsel centraal zal staan, moet men trachten zich een beeld te vormen van de gevaren waaraan een patiënt in dergelijke omstandigheden bloot zal staan. Een dergelijk risicoprofiel kan uit de volgende aandachtspunten worden samengesteld:

- de aard/het karakter van de sport zelf:
 - aard en mate van fysiek contact
 - (conditie van) het vloeroppervlak (beton, gras, hout; seizoensinvloeden)
 - afbakening van het speelterrein/-veld (omheining, muren, banken)
 - gebruikte hulpmiddelen en sportattributen (stick, racket, bal, speer, wapens, schoeisel, enz.)
 - gebruikte beschermingsmiddelen (hoofddekkel, been/armstukken, valmatten)
- het niveau en de intensiteit van de sportbeoefening; het is niet zonder meer duidelijk of een hoger niveau van beoefening ook gepaard gaat met een toegenomen letselrisico. Hiertegen pleit in ieder geval het toegenomen vaardigheids- en trainingsniveau, terwijl op lagere niveaus de begeleiding van de sporter in het algemeen minder zal zijn.
- de sportspecifieke getraindheid, zowel conditioneel als senso-motorisch zal dienen aan te sluiten op het niveau van deelname. Een optimale verhouding van belasting en belastbaarheid is ook voor epilepsiepatiënten essentieel. Voor te sterke vermoeidheid en overtraining moet vooralsnog gewaarschuwd worden (zie tabel 1).
- de kwaliteit en mogelijkheid van deskundige begeleiding ten aanzien van zowel de epilepsie als de sport. Deze begeleiding dient zorg te dragen voor het correct hanteren van 'eerste hulp maatregelen' bij optreden van aanvallen. Daarnaast moet men kunnen adviseren over het gebruik van hulp-/beschermingsmiddelen.

Tevens kan de begeleider een katalyserende rol vervullen tussen patiënt en de omgeving, wanneer zich een aanval heeft voorgedaan. In dit opzicht is het raadzaam medespelers op de hoogte te brengen van de belangrijkste aspecten van de epileptische aandoening en zo mogelijk 'eerste hulp maatregelen'. Het vooraf overwegen in welk milieu de sportbeoefening plaatsvindt (bijv. gehandicapten- of validensport) kan in dit kader wenselijk zijn.

Aan sommige sporten kleven, ook voor valide sporters, zonder meer grote risico's. Indien een epilepsiepatiënt regelmatig aanvallen ervaart met bewust-

staen (neuromusculaire functiestoornis, mentale re-

taractie).

Bij intramuraal verzorgde patiënten (10-15% van de

voorgenoemde groep) zullen nevenaandoeningen vaak op de

voorgenoemde staen en (mede) de grenzen bepalen van

wat voor hen in het kader van sport- en spelbeoefe-

ning wenselijk is.

Voor deze groep patiënten geldt overigens wel, dat

men de 'setting', waarbinnen sport bedreven wordt,

over het algemeen goed kan controleren.

Situatieve factoren

De omstandigheden waaronder sport bedreven

wordt kunnen medebepalend zijn voor het inschat-

ten van met epilepsie samenhangende risico's van

sportbeoefening. Een bewustzijnsdaling ten gevolge

van een afwezigheid van bewustzijn kan zondermeer

levensbedreigend zijn als er niet voldoende goed ge-

instrueerde begeleiding aanwezig is. Daarentegen

kan een valpartij op een grasveld tijdens eenzelfde

absentie niet veel kwaad. In het navolgende zal hier

nader op worden ingegaan.

De besproken epilepsie-specifieke overwegingen zijn

in de literatuur niet in relatie gebracht met sport-

specifieke gegevens. In een advies-protocol dienen

elementen zoals de aard van de sport, het niveau van

beoefening en mogelijk tijdens fysieke sportieve in-

spanning optredende risico-afhankelijke mecha-

nismen, in samenhang met de individuele en epilep-

sie-specifieke overwegingen beschouwd te worden.

Risico-problematiek

Enkele auteurs menen dat epilepsiepatiënten in si-

tuaties van sportieve en fysieke inspanning vermin-

derd belastbaar (kunnen) zijn.

Enerzijds, doordat in de uitwendige belasting me-

chanismen werkzaam zouden zijn, die een aanval-

luxerend effect hebben. Een verhoogde aanvals-po-

tenie in sportssituaties zou een toenemend risico op

(hoofd)letsel tot gevolg kunnen hebben. Dit is uiter-

aard mede afhankelijk van de vorm van de aan-

val.^{12, 13, 40, 41}

Anderzijds zou het cerebrum van mensen met epilep-

sie mechanisch-fysisch verminderd belastbaar zijn,

met andere woorden: gevoeliger voor (licht) hoofd-

trauma; een blijvende verslechtering van de epilepti-

sche aandoening zou het gevolg zijn.^{12, 13, 43, 44}

In zijn voorzichtige stellingname ten aanzien van

sportbeoefening door epilepsiepatiënten, beoogt

McLaurin^{12, 13} dat jeugdige epilepsiepatiënten, met

naam diegene met posttraumatische epilepsie (PTE),

niet aan (contact-)sporten zouden moeten deelnemen

in verband met een veronderstelde kans op vererge-

ring van de epilepsie onder invloed van (licht) hoofd-

letsel. Met name zou dit gelden voor kinderen. Deze

stelling wordt ten dele onderschreven door Schnei-

der¹³ en Guendel.⁴⁴

Literatuuronderzoek heeft geen gericht experimenten-

deel onderzoek naar de effecten van herhaald en/of

'licht' hoofdletsel op een bestaande vorm van epilep-

sie naar voren gebracht.⁶ Uit deze zelfde studie blijkt

echter ook, dat de boven omschreven stellingname

niet zonder meer gefalsificeerd kan worden:

Algemeen wordt daarentegen in de epileptologie aan-

genomen, dat een te geringe mentale activiteit wel

kan men het optreden van epileptische symptomen

in met name de herstelfase na de inspanning verkla-

ren. Andere verklaringen zouden voorts kunnen zijn:

hypoglykemie, 'vermoedheid', gedaalde bloedspie-

gel van een anti-epilepticum.

Hoofdletsel

men standpunt.

het door Boucharlat e.a.⁴² en McLaurin^{12, 13} ingeno-

teit tijdens gewone sport- en spellessen onttraakten

Ook de eerder beschreven geringe epileptische activi-

niet in relatie tot denksporten.^{55, 56}

gen aan voor stress-geïnduceerde aanvallen, zelfs

lepsie en sportbeoefening geen duidelijke aanwijzin-

Toch treft men in casusbeschrijvingen omrent epi-

ducerend mechanisme bleek.

sche muizen, waarin 'angst' een werkzaam aanval-in-

yard e.a.⁵⁴ beschrijven een experiment met epilepti-

aanval-provoocerende momenten voorkwam. Swin-

patënten), terwijl stress vrijwel steeds naast andere

dend fenomeen (1% van de totale populatie epilepsie-

leptische aanvallen. Dit is echter een zelden optre-

ven inderdaad een stress-geïnduceerde vorm van epi-

luxerende invloed hebben. Frits en Lund⁵³ beschrij-

charlat e.a.⁴² en McLaurin^{12, 13} eveneens een aanval-

angst om te verliezen, doodsanxiet) zou volgens Bou-

mental stress tijdens sportbeoefening (faalansxiet,

bepalend waren voor de resultaten.

lepsievorm en het gebruikte anti-epilepticum niet

intramurale patiënten) blijkt overigens, dat de epi-

Uit de experimentele gegevens van Kuyser⁴⁶ (n=69

meer gangbare sport- en spellessen.^{46, 50-52}

Deze tendens werd tevens waargenomen gedurende

tot rustcondities kan worden waargenomen.⁴⁶⁻⁵⁰

inspanning een verhoogde activiteit in vergelijking

terwijl daarentegen in de herstelfase na de geleverde

zelden epileptische symptomen naar voren treden,

toond, dat tijdens lichamelijke inspanning slechts

seerde ergonomische onderzoeken hebben aange-

Belangwekkender is echter, dat enkele gestandaard-

mechanismen.⁴⁶

spraak van twee volstrekt onderscheiden metabole

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechanismen.⁴⁶

mechan

Het belang van lichaamsbeweging en sportbeoefening voor mensen met een handicap krijgt een extra dimensie door enerzijds het sedentaire bestaan, dat vele minder-validen leiden: invalidiserende invaliditeit: vetzucht, spierverslapping, ongetraind cardio-respiratoir systeem.³⁶

Ook voor epilepsiepatiënten dreigt bewegingsarmoede door overbescherming, angst voor aanvallen en door de beperkte mobiliteit bij meervoudig gehandicapten.

Anderzijds veronderstelt men, dat sportbeoefening binnen een juist didactisch kader een fysieke en sociaal-maatschappelijke achterstand kan helpen opheffen: bevordering intermenselijk contact, vergroting cognitieve, senso-motorische en emotionele ervaringen, kunnen het zelfbeeld van minder-validen gunstig beïnvloeden.³⁷⁻³⁹

Van Beek³⁷ en Soulek⁴⁰ wijzen echter, evenals Albinson³⁵ op het belang van deskundige begeleiding in een voor de potentiële deelnemers acceptabel didactisch kader. Zowel sportinhoudelijk als ten aanzien van het sportniveau is een gedifferentieerd programma gewenst, waarin het prestatie-motief niet zonder meer centraal staat.

Voor deelnemers die niet aan zekere vormen van inspanning en kwaliteit kunnen of willen voldoen, mag drempelvrees, faalangst en een gevoel van minderwaardigheid hun (verdere) deelname niet blokkeren. De wenselijkheid van sportbeoefening door (jeugdige) epilepsiepatiënten kan, gezien het voorgaande, omschreven worden als het in potentie kunnen bijdragen aan de verbetering van de fysieke, emotionele en psycho-sociale ontwikkeling en/of belastbaarheid, het voorkomen van effecten van bewegingsarmoede en het compenseren van effecten van sociaal-maatschappelijk isolement.

Grenzen van het wenselijke

De wenselijkheid van sportbeoefening, ook voor epilepsiepatiënten, is evident.

Echter op grond van de aard van de epileptische aandoening enerzijds en het karakter van de gewenste sport anderzijds is mogelijk sprake van een ontoelaatbaar risico voor bepaalde mensen met epilepsie. Nader inzicht in de werkelijke risico's en risicobepalende factoren vanuit zowel een epileptologische als een sportgeneeskundige optiek moet leiden tot meer helderheid omtrent de grenzen van wat voor de individuele epilepsiepatiënt aanvaardbaar en wenselijk is. De componenten van een dergelijke risicocalculatie moeten zijn opgenomen in een advies-protocol. Deze componenten zullen in het navolgende nader worden aangegeven.

Epilepsie-specifieke overwegingen

Een aantal medisch-klinische overwegingen dient in een advies-protocol omtrent sportbeoefening door epilepsiepatiënten uitdrukkelijk te worden opgenomen. De volgende factoren zullen bijdragen aan de beeldvorming over de belastbaarheid van epilepsiepatiënten in sportsituaties:

Aanvalstype

Afhankelijk van de vorm van epilepsie kunnen verschillende aanvalsvormen optreden. Sommige componenten van aanvallen zullen risico-verhogend zijn: daling of verlies van bewustzijn; daling of verlies van controle over het bewegingsapparaat.

Andere verschijnselen zullen het risico verminderen: het optreden van voorboden (aurae, prodromi), een waarschuwing van een op handen zijnde aanval.

Hierdoor zal wellicht de mogelijkheid van sportbeoefening vergroot zijn.

Aanvalsfrequentie

In het algemeen is er tijdens de interictale perioden buiten de effecten van medicijngebruik medisch gezien geen sprake van gehandicapt zijn door epilepsie, als men de patiënten met multiple handicaps buiten beschouwing laat. De duur van de aanvalsvrije perioden is dan ook mede indicatief voor de mogelijkheden van sportbeoefening (70-80% van alle mensen met epilepsie is met behulp van anti-convulsiva 'min of meer aanvalsvrij').

Medicamenten

Anti-epileptica nemen in het leven van de meeste epilepsiepatiënten dan ook een centrale plaats in. Hoewel van het grootste belang voor het onderdrukken van aanvallen, heeft het chronisch gebruik van medicijnen helaas ook een keerzijde. Ondanks het streven van de arts naar het minst schadelijke en meest effectieve medicijn voor een bepaalde patiënt, zijn bijwerkingen niet steeds te vermijden. Verminderde alertheid en concentratieverlies zijn frequent beschreven bijwerkingen die een succesvolle sportbeoefening kunnen verstoren.

Volgens Schmidt³ en Blank en Anderson⁴¹ kunnen zowel cognitieve als senso-motorische functies verstoord worden door gebruik van anti-convulsiva. Sportbeoefening van enige betekenis vereist doorgaans een hoge reactiesnelheid en een optimaal concentratievermogen, terwijl bij sommige sporten een verlaagde concentratie of alertheid zelfs levensbedreigend is zoals bij gemotoriseerde snelheidssporten.

Temporeel karakter

Het beeld in de tijd van de aanvalsfrequentie kan belangrijk zijn: sommige patiënten krijgen de aanvallen op bepaalde vaste tijdstippen van de dag, juist in de slaap, kort voor of na het opstaan of anderszins. Door hiermee rekening te houden kunnen mogelijkheden van sportbeoefening vergroot worden.

Nevenaandoeningen

Epilepsie is een symptoom van een cerebrale beschadiging of cerebraal dysfunctioneren. Hierdoor kunnen naast de epileptische manifestaties ook andere symptomen voorkomen of zelfs op de voorgrond

tief komt tot de onderscheiden visies omtrent de vraag wanneer en onder welke condities sport kan worden beoefend.⁷⁻¹³

Sommige auteurs zijn geneigd aan ongevals- en blesurepreventie de hoogste prioriteit te geven. Daarentegen kennen anderen aan de functionaliteit van sportbeoefening en lichaamsbeweging ten aanzien van de fysieke, emotionele en psycho-sociale ontwikkeling van de jeugdige epilepsiepatiënt een groter belang toe.

Hoewel onderkend wordt dat de diversiteit van epilepsievormen en het persoonlijk belevingskarakter van de aandoening een strikt individuele benadering noodzakelijk maken, expliciteert men volstrekt onvoldoende welke sport-specifieke aspecten in relatie tot epilepsie en welke epilepsie-eigen aspecten in relatie tot sportbeoefening in een dergelijk overwegingsproces betrokken dienen te zijn.

Men beperkt zich in het algemeen tot het onderstrepen van aanvalsfrequentie en -type als beslissingsgrond voor sportbeoefening.

In de praktijk dient een gestructureerde en gestandaardiseerde risicocalculatie ten behoeve van het individu uitgevoerd te worden. Hiertoe zijn wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen onontbeerlijk. Op grond van de 'adviesliteratuur' en epilepsiehandboeken zijn deze richtlijnen niet te formuleren.

Aan de hand van een bespreking van enerzijds de wenselijkheid van sportbeoefening door epilepsiepa-

tiënten en anderzijds een grensafbakening van het nog wenselijke zal een aanzet gegeven worden tot meer gefundeerde richtlijnen.

Wenselijkheid sportbeoefening

Door verschillende auteurs wordt de wenselijkheid en functionaliteit van sportbeoefening door epilepsiepatiënten gehanteerd als argument voor het zeer ruim omschrijven van de mogelijkheden in deze.

Dit argument kan inhoud gegeven worden vanuit de patiënt: epilepsie gaat vaak gepaard met psycho-sociale moeilijkheden. Ontzegging van door de patiënt als wenselijk en prettig ervaren sport of lichamelijke inspanning zou, als inperking van de leefruimte, problemen doen ontstaan dan wel versterken. Daarnaast worden door anderen gepostuleerde verhoogde risico's van sportbeoefening als zijnde fictief goedgeels verworpen.^{9-11, 14-16}

Ook kan de wenselijkheid van sportbeoefening vanuit een meer academische sport-pedagogische invalshoek beschouwd worden. Beide aspecten zullen in het kort op hun validiteit beoordeeld worden.

Gedragsproblemen

In de kinderpsychiatrie schat men, dat als gevolg van psychodynamische mechanismen rond het chronisch ziek-zijn, bij 30 tot 40% van de kinderen met

Tabel 1. (Van der Woude, 1982)

AUTEURS:	Kugel, 1968	Bower, 1969	Livingston, 1973	Bouchariat, 1973	McLaurin, 1973	Rohmann, 1973	Adams, 1975	Gündel, 1975	Gebeł, 1978	Korczyń, 1979	Most, 1980
ADVIES: • sportspecifiek	½, &	½, &, %	½, &, %	-	-	+, &	&, %	+, +, &, %	+, &, %	-, &	-, &, %
• contactsport	-	-	++	+	-	-	+	-	-	+	+
• wedstrijdssport		+		-	½	½	+			+	
• epilepsie-specifiek	½	½	½	-	½	½	-	½	-	-	-
RISICO-PROBLEMATIEK: • provocerende momenten	HV, V, SL	V, SL	SL	HV, ST	HV, ST	HV, V		HV	HV, V	HV, ST	SL
• hoofdletsel	½	½	-		+	+		+		-	-
• psycho-sociaal	+		++	+	-/+	-/+	++	-/+		+	++
Beslisingsgrond	AT, AF	AT, IN	IN, AT, AF	AF	AT, AF, SHT	AF	AF	AT, AF, SV	AT, AF, SV		
Leefadviezen	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N
Individueel-gericht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wetenschappelijke basis	KE	KE	KE, AR	KE	KE, AR	KE, AR	AR	AR	AR	KE, AR	AR
Verklaring: AR.....artikelen anderen AF.....aanvalsfrequentie AT.....aanvalstypen/epilepsievorm HV.....hyperventileren IN.....individueel beslist mee	KE.....klinische ervaring/caeus N.....zo normaal mogelijk leven SL.....slaap/rust ST.....stress/emotie SHT.....schedel/hersentrauma SV.....sportvorm/-soort/-niveau	V.....vermoedheid -/+ / + / +.....neen, ja, zeer positief ½.....auteur stipt het aan/werkt het niet uit &.....zwemmen alleen onder toezicht %.....niet klimmen, duiken, paardrijden									

Epilepsie en sport

Een aanzet tot enkele richtlijnen

L.H.V. VAN DER WOUDE, A. KUYER EN R.H. ROZENDAL*

(Overgenomen uit: *Geneeskunde en sport* 1985; 2: 2-9)

Inleiding

In Nederland lijden naar schatting 90.000 mensen aan een of andere vorm van epilepsie. Bij 50% debutert de aandoening voor het twintigste levensjaar. Hoewel juist bij deze jeugdige groep de vraag naar de mogelijkheden van sportbeoefening vaak leeft, blijkt, dat hierover weinig concrete gegevens in de epilepsie-specifieke literatuur beschikbaar zijn.¹⁻⁴ Mogelijk is dit te wijten aan een, vooral in het verleden optredend gebrek aan belangstelling vanuit de medische en paramedische invalshoek voor gehandicapten sport, waardoor weinig gericht onderzoek uitgevoerd is.⁵⁻⁶

Hoewel de medicus over het algemeen de belangrijkste vraagbaak voor de patiënt zal zijn, kan deze niet terugvallen op wetenschappelijk gefundeerde literatuur.

Adviesliteratuur

Kennis over zowel epilepsie als sport is noodzakelijk voor het verantwoord opstellen van adviezen betreffende sportbeoefening door epilepsiepatiënten. Zoals gezegd zijn de probleem-specifieke publicaties schaars en voor zover aanwezig beperkt men zich hierin tot het geven van adviezen. Tabel 1 geeft een kwalitatieve inventarisatie van deze 'adviesliteratuur'. De geuite inzichten en standpunten berusten in het algemeen op praktijkervaring-gegevens. Voorts blijkt, dat men vanuit verschillende medisch-klinisch en paramedisch perspectief

Samenvatting

Sportbeoefening is in het algemeen ook voor epilepsiepatiënten gewenst. De grenzen van wat voor een individu met epilepsie in een sport situatie nog wenselijk is, moeten worden afgeleid van gegevens omtrent de kenmerken van het ziektebeeld, de sportvorm en de (psycho-sociale) gesteldheid van het individu. Richtlijnen en componenten voor een dergelijke risicocalculatie worden beschreven. Adviezen kunnen niet worden opgehangen aan vuistregels met algemene geldigheid, doch dienen sterk geïndividualiseerd te worden opgebouwd. Het is van eminent belang dat de aanvaasden die doorgaans niet vergroot is tijdens sportbeoefening, doch veelmeer in de herselpe-riode na de fysieke inspanning. Het risico op (hoofd)letsel kan voor epilepsiepatiënten in sport situaties verhoogd zijn. Sommige patiënten kunnen een overgevoeligheid voor hoofdletsel hebben. Preventie van hoofdletsel, niet tot iedere prijs, kan dan wenselijk zijn. Dit impliceert niet zonder meer uitsluiting van deelname aan sportieve activiteiten, tenslotte zijn in dit kader de gevaren van verkeersdeelname aanzienlijk groter.

Summary

In general it is desirable that people with epilepsy should do sports. The characteristics of the clinical picture, the kind of sport and the (psychosocial) condition of the individual will provide indications as to the possibilities for a person with epilepsy to do sports. Guidelines and components for a risk calculation are described. Rules of thumb, accepted generally, should not serve as advice. Advice should specifically be aimed at the individual. It is of the utmost importance to realize that in general the seizure proneness will not be increased during sports, but rather in the recovery period after physical exercise. For some patients with epilepsy the risk of (head)injuries when doing sports may be increased. Some patients may be oversensitive to head injuries. Prevention, not at any cost, may be desirable, which does not just imply exclusion from participation in sportive activities. After all within this scope the risks of participating in traffic are considerably higher.

Trefwoorden: gedragsproblematiek

functie van de sport
wenselijkheid sportbeoefening
aanval-luxatie
hoofdletsel

* Drs. L.H.V. van der Woude, wetenschappelijk medewerker Interfacultair lichamelijke opvoeding.

Prof. dr. R.H. Rozendal, hoogleraar functionele morfologie. Mevr. dr. A. Kuyser, arts te Geldrop.